



ผลการวิจัย

การศึกษาความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ครอบคลุมถึงเรื่องดังต่อไปนี้คือ

1. สถานภาพของผู้ป่วยหลังคลอดที่เลือกเป็นตัวอย่าง เสนอเป็นจำนวนและร้อยละ
2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอด ตามสภาพความเป็นอยู่ระหว่างผู้ป่วยและบุตรในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล โดยส่วนรวมเป็นรายหมวดและเป็นรายคาน
3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอด ระหว่างผู้ป่วยครรภ์แรกและผู้ป่วยครรภ์หลัง โดยส่วนรวม เป็นรายหมวด และเป็นรายคาน
4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติ และคลอดผิดปกติโดยส่วนรวมเป็นรายหมวดและเป็นรายคาน
5. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ของครอบครัวแตกต่างกันโดยส่วนรวม เป็นรายหมวดและเป็นรายคาน
6. ลำดับที่ของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตรทั้งหมด

เกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ยรายข้อ ผู้วิจัยได้ตั้ง เกณฑ์การตัดสินค่าคะแนนเฉลี่ยรายข้อขึ้นเอง โดยถือว่าความคิดเห็นของผู้ป่วยแต่ละกลุ่มเป็นดังนี้

- | | | |
|-------------|------|-------------------------------------|
| 1. - 1.50 | เป็น | ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด |
| 1.51 - 2.50 | เป็น | ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับน้อย |
| 2.51 - 3.50 | เป็น | ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับปานกลาง |
| 3.51 - 4.50 | เป็น | ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมาก |
| 4.51 - 5 | เป็น | ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับมากที่สุด |

- เพื่อความสะดวกในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดให้
- ผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 1 หมายถึง ผู้ป่วยหลังคลอดที่มีโอกาสได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเอง
 ตลอดเวลา
- ผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 2 หมายถึง ผู้ป่วยหลังคลอดที่บุตรแยกไปอยู่หอเด็ก (Nursery)
 โดยไม่มีโอกาสได้เห็นหน้า
- ผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 3 หมายถึง ผู้ป่วยหลังคลอดที่มีโอกาสได้เลี้ยงบุตรเอง เป็นครั้งคราว
- หมวด ก. หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับตนเอง
- หมวด ก. คำที่ 1 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับตนเองในด้านการ
 เลี้ยงบุตร
- หมวด ก. คำที่ 2 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับตนเองในด้านการ
 จิตใจ และอารมณ์
- หมวด ข. หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับบุตร
- หมวด ข. คำที่ 1 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับบุตรในด้านการ
 เลี้ยงดู
- หมวด ข. คำที่ 2 หมายถึง ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับบุตรในด้านการ
 จิตใจ และอารมณ์



ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

ก. อายุ

ผู้ปวยส่วนใหญ่ร้อยละ 39.33 มีอายุระหว่าง 19 – 24 ปี ส่วนน้อยร้อยละ 4.67 เท่านั้นที่มีอายุระหว่าง 35 ปีขึ้นไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 อายุของผู้ป่วย

อายุ (ปี)	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 18 ปีลงมา	8	5.33	5	3.33	6	4.00	19	12.67
19 – 24 ปี	18	12.00	21	14.00	20	13.33	59	39.33
25 – 30 ปี	13	8.67	17	11.33	15	10.00	45	30.00
31 – 35 ปี	6	4.00	6	4.00	8	5.33	20	13.33
35 ปีขึ้นไป	5	3.33	1	0.67	1	0.67	7	4.67
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ข. ระยะเวลาของการสมรส

ผู้พลวส่วนใหญ่ร้อยละ 76.66 มีระยะเวลาของการสมรสไม่เกิน 5 ปี มีผู้พลวเพียงร้อยละ 23.33 เท่านั้น ที่มีระยะเวลาของการสมรสเกินกว่า 5 ปี ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ระยะเวลาของการสมรส

ระยะเวลาของการสมรส (ปี)	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 - 2 ปี	16	10.67	9	6.00	19	12.67	44	29.33
2 - 3 ปี	12	8.00	22	14.67	19	11.33	51	34.00
4 - 5 ปี	7	4.67	7	4.67	6	4.00	20	13.33
6 - 7 ปี	3	2.00	8	5.33	6	4.00	17	11.33
8 ปีขึ้นไป	12	8.00	4	2.67	2	1.33	18	12.00
รวม	50	33.34	50	33.33	50	33.34	150	99.99

ก. ระยะเวลาของการตั้งครรภภายหลังจากการสมรส

ผู้มีส่วนใหญ่ร้อยละ 53.33 ตั้งครรภในปีที่ทำการสมรส รองลงมาร้อยละ 38.67 ตั้งครรภในปีที่ 2 มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 1.33 เท่านั้นที่ตั้งครรภหลังสมรสปีที่ 4 ขึ้นไป ตั้งรายละเอียกในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ระยะเวลาของการตั้งครรภภายหลังจากการสมรส

ระยะเวลา (ปี)	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตั้งครรภในปีที่สมรส	27	18.00	27	18.00	26	17.33	80	53.33
ตั้งครรภในปีที่ 2	17	11.33	18	12.00	23	15.33	58	38.67
ตั้งครรภในปีที่ 3	4	2.67	5	3.33	1	0.67	10	6.67
ตั้งครรภหลังปีที่ 4 ขึ้นไป	2	1.33	0	0	0	0	2	1.33
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ง. การคุมกำเนิดภายหลังจากการสมรส

ผู้พบส่วนใหญ่ร้อยละ 60.00 ไม่ได้คุมกำเนิดเลยภายหลังจากการสมรส รองลงมา ร้อยละ 25.33 รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 2.00 เท่านั้น ที่ใช้ระยะปลอดภัย ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การคุมกำเนิดภายหลังจากการสมรส

วิธีการในการคุมกำเนิด	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ใส่ห่วง	3	2.00	5	3.33	7	4.67	15	10.00
รับประทานยาเม็ดคุมกำเนิด	13	8.67	20	13.33	5	3.33	38	25.33
ใช้ระยะปลอดภัย	1	0.67	0	0	2	1.33	3	2.00
ใช้ถุงยางอนามัย	0	0	2	1.33	2	1.33	4	2.66
ไม่ได้คุมกำเนิดเลย	33	22.00	23	15.33	34	22.67	90	60.00
รวม	50	33.34	50	33.32	50	33.33	150	99.99

จ. จำนวนครั้งที่เคยแทง

ผู้ช่วยส่วนใหญ่อยอดละ 86.00 ไม่เคยแทงเลย ที่เคยแทงมากกว่า 3 ครั้ง ไม่มีเลย
ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 6

ตารางที่ 6 จำนวนครั้งที่เคยแทง

จำนวนครั้งที่เคยแทง	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยแทงเลย	41	27.33	41	27.33	47	31.33	129	86.00
แทง 1 ครั้ง	5	3.33	9	6.00	2	1.33	16	10.67
แทง 2 ครั้ง	4	2.67	0	0	1	0.63	5	3.33
แทงมากกว่า 3 ครั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.29	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ. จำนวนครั้งที่ตั้งครรภของผู้ป่วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 47.33 ตั้งครรภเป็นครั้งแรก มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 12.66 เท่านั้น ที่ตั้งครรภมากกว่าครั้งที่ 3 ขึ้นไป ตั้งรายละเอียดในตารางที่ 7

ตารางที่ 7 จำนวนครั้งที่ตั้งครรภของผู้ป่วย

จำนวนครั้งที่ตั้งครรภ	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เป็นครั้งแรก	23	15.33	23	15.33	24	16.00	71	47.33
เป็นครั้งที่ 2	11	7.33	11	7.33	9	6.00	30	20.00
เป็นครั้งที่ 3	10	6.67	8	5.33	12	8.00	30	20.00
มากกว่าครั้งที่ 3 ขึ้นไป	6	4.00	8	5.33	5	3.33	19	12.66
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จ. ลำดับที่ของบุตรคนปัจจุบัน

บุตรของคู่สมรสคนปัจจุบันส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.67 เป็นบุตรคนแรก มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 10.00 เท่านั้น ที่เป็นบุตรคนที่ 3 ขึ้นไป ดังรายละเอียดในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 ลำดับที่ของบุตรคนปัจจุบัน

ลำดับที่ของบุตรคนปัจจุบัน	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บุตรคนแรก	29	19.33	25	16.67	25	16.67	79	52.67
บุตรคนที่ 2	8	5.33	11	7.33	13	8.66	32	21.33
บุตรคนที่ 3	9	6.00	9	6.00	6	4.00	24	16.00
คนที่ 3 ขึ้นไป	4	2.67	5	3.33	6	4.00	15	10.00
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข. จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 38.00 มีสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 17.33 เท่านั้นที่มีสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน ดังรายละเอียดในตารางที่ 9

ตารางที่ 9 จำนวนสมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วย

จำนวนสมาชิก	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
3 - 4 คน	16	10.67	24	16.00	17	11.33	57	38.00
4 - 5 คน	8	5.33	9	6.00	9	6.00	26	17.33
5 - 6 คน	14	9.33	7	4.67	9	6.00	30	20.00
6 คนขึ้นไป	12	8.00	10	6.67	15	10.00	37	24.67
รวม	50	33.33	50	33.34	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗. เงินสะสมในแต่ละเดือน

ผู้ช่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.00 ไม่มีเงินเหลือเก็บสะสมเลย รองลงมา ร้อยละ 35.33 มีเงินเหลือเก็บบ้างเล็กน้อย มีเงินเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 3.33 เท่านั้น ที่มีเงินเหลือมาก ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 10

ตารางที่ 10 เงินสะสมในแต่ละเดือน

เงินเก็บสะสม	กลุ่มที่ 1.		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีเหลือมาก								
(มากกว่า 500 บาท ขึ้นไป)	3	2.00	1	0.67	1	0.67	5	3.33
มีเหลือมากพอควร								
(ประมาณ 300 บาท)	9	6.00	4	2.67	10	6.67	23	15.33
เหลือบ้างเล็กน้อย								
(ประมาณ 50 - 100 บาท)	24	16.00	16	10.67	13	8.67	53	35.33
ไม่มีเหลือเลย	14	9.33	29	19.33	26	17.33	69	46.00
รวม	50	33.33	50	33.34	50	33.34	150	99.99

ญ. รายได้รวมทั้งของสามีและผู้ป่วยตกเดือน
 ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.00 มีรายได้ระหว่าง 500 - 2000 บาท มีผู้ป่วยที่มี
 รายได้เกิน 2001 บาท เพียงร้อยละ 34.00 เท่านั้น ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 รายได้รวมทั้งของสามีและผู้ป่วยตกเดือน

รายได้/เดือน	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
500 - 1000 บาท	12	8.00	12	8.00	15	10.00	39	26.00
1001 - 2000 บาท	19	12.67	21	14.00	20	13.33	60	40.00
2001 - 3000 บาท	8	5.33	16	10.67	4	2.67	28	18.67
3000 บาทขึ้นไป	11	7.33	1	0.67	11	7.33	23	15.33
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉ. สภาพอารมณ์ของผู้ป่วย

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ รอยละ 42.67 มีอารมณ์เยือกเย็น มีเพียงส่วนน้อยรอยละ 7.33 เท่านั้น ที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวและรุนแรง ทั้งรอยละเอียบคี่ในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 สภาพอารมณ์ของผู้ป่วย

อารมณ์	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	รอยละ	จำนวน	รอยละ	จำนวน	รอยละ	จำนวน	รอยละ
โกรธง่าย	17	11.33	13	8.67	11	7.33	41	27.33
หวาดกลัวและตกใจง่าย	10	6.67	15	10.00	9	6.00	34	22.67
เยือกเย็น	21	14.00	20	13.33	23	15.33	64	42.67
อารมณ์ฉุนเฉียวและรุนแรง	2	1.33	2	1.33	7	4.67	11	7.33
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฉ. ความรู้สึกต่อเด็กทั่วไป

ผู้ปวยส่วนใหญ่ร้อยละ 59.33 มีความรู้สึกรักและเอ็นดูเด็กเสมอ มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 1.33 เท่านั้น ที่มีความรู้สึกไม่ชอบเด็ก ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 13

ตารางที่ 13 ความรู้สึกต่อเด็กทั่วไป

ความรู้สึกต่อเด็กทั่วไป	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีความรู้สึกรักและเอ็นดู								
เด็กเสมอ	32	21.33	28	18.67	29	19.33	89	59.33
มีความรู้สึกรักและเอ็นดู								
เด็กบางเวลา	9	6.00	18	12.00	11	7.33	38	25.33
มีความรู้สึกเฉย ๆ ต่อเด็ก	8	5.33	3	2.00	10	6.67	21	14.00
ไม่ชอบเด็ก	1	0.67	1	0.67	0	0	2	1.33
รวม	50	33.33	50	33.34	50	33.33	150	100

๕. สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ร้อยละ 93.33 ไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคจิต โรคประสาท มีเป็นเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 4.00 เท่านั้น ที่มีญาติฝ่ายสามีหรือภรรยา เป็นโรคจิตโรคประสาท ทั้ง รายนละเอียกในตารางที่ 14

ตารางที่ 14 สุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว

การเป็นโรคจิต โรคประสาท	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มี	46	30.66	46	30.67	48	32.00	140	93.33
มีญาติฝ่ายสามี	0	0	2	1.33	2	1.33	4	2.67
มีญาติฝ่ายภรรยา	1	0.67	1	0.67	0	0	2	1.33
ไม่ทราบว่า มีหรือไม่มี	3	2.00	1	0.67	0	0	4	2.67
รวม	50	33.33	50	33.34	50	33.33	150	100

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท. ปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
 สมาชิกในครอบครัวของผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.33 มีปฏิบัตินั้นดี มีเพียง
 ส่วนน้อย ร้อยละ 2.00 เท่านั้น ที่แสดงความไม่พอใจ ดังรายละเอียดในตารางที่ 15

ตารางที่ 15 ปฏิบัติของสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

ปฏิบัติของสมาชิก ในครอบครัว	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รู้สึกดีแน่นอน	36	24.00	37	24.67	37	24.66	110	73.33
แสดงความไม่พอใจ	1	0.67	2	1.33	0	0	3	2.00
แสดงอาการเบื่อหน่าย	2	1.33	2	1.33	3	2.00	7	4.67
ไม่แสดงความรู้สึกใด ๆ	11	7.33	9	6.00	10	6.67	30	20.00
รวม	50	33.33	50	33.33	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๗. วิธีการคัดลอก

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.67 คัดลอกปกติมีแผลที่ฝีเย็บ มีเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 12.67 เท่านั้นที่คัดลอกโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วย ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 16

ตารางที่ 16 วิธีการคัดลอก

วิธีการคัดลอก	กลุ่มที่ 1		กลุ่มที่ 2		กลุ่มที่ 3		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คัดลอกปกติมีแผลที่ฝีเย็บ	32	21.33	19	12.67	22	14.67	73	48.67
คัดลอกปกติไม่มีแผลที่ฝีเย็บ	3	2	20	13.33	10	6.67	33	22.00
คัดลอกโดยใช้เข็มช่วย	7	4.67	7	4.67	11	7.33	25	16.66
คัดลอกโดยใช้เครื่องดูดสุญญากาศช่วย	8	5.33	4	2.67	7	4.66	19	12.67
รวม	50	33.33	50	33.34	50	33.33	150	100

ศูนย์วิทยุทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



2. การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดตามสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยและบุตรในขณะอยู่ในโรงพยาบาล

จากการวิจัยใ้จำแนกผู้ป่วยหลังคลอดออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ

- ก. แยกมารดาและบุตรออกจากกันโดยเด็กขาดโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาในห้องที่จัดไว้โดยเฉพาะตั้งแต่หลังคลอดจนกระทั่งกลับบ้าน
- ข. แยกมารดาและบุตรออกจากกันเป็นบางเวลาโดยเด็กอยู่ในห้องเด็ก (Nursery) นำมาที่เตียงมารดาเมื่อมารดาต้องการให้แม่ด้วยตนเองหรือต้องการดูแลเป็นบางเวลา
- ค. ไม่มีการแยกมารดาและบุตรออกจากกันให้มารดาเป็นผู้ดูแลบุตรเองตั้งแต่แรกคลอดจนกระทั่งกลับบ้าน

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะการแยกบุตรโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of variance one way classification) ซึ่งผลปรากฏดังในตารางที่ 17

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะการแยกบุตรแตกต่างกัน

หมวด	ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	df	S.S	M.S	F
	ส่วนรวม	ระหว่างกลุ่ม	2	160.57	80.26	1.720
		ภายในกลุ่ม	147	6,851.22	46.61	
		รวมทั้งหมด	149	7,011.79		
ก	ผู้ป่วยหลังคลอด ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตนเอง	ระหว่างกลุ่ม	2	1,116.97	558.48	6.822**
		ภายในกลุ่ม	147	12,034.36	81.87	
		รวมทั้งหมด	149	13,151.33		

ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะ
การแยกบุตรแตกต่างกัน

หมวด	ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ก	การเลี้ยงดู	ระหว่างกลุ่ม	2	308.65	154.32	7.528**
		ภายในกลุ่ม	147	3,013.72	20.50	
		รวมทั้งหมด	149	3,322.37		
ก	จิตใจและอารมณ์	ระหว่างกลุ่ม	2	254.41	127.21	3.981*
		ภายในกลุ่ม	147	4,697.16	31.95	
		รวมทั้งหมด	149	4,951.57		
ข	ผู้ป่วยหลังคลอด ในเรื่องที่เกี่ยวกับ บุตร	ระหว่างกลุ่ม	2	851.08	425.54	4.220*
		ภายในกลุ่ม	147	14,822.92	100.84	
		รวมทั้งหมด	149	15,674.00		
ข	การเลี้ยงดู	ระหว่างกลุ่ม	2	341.28	170.64	2.529
		ภายในกลุ่ม	147	9,914.86	67.45	
		รวมทั้งหมด	149	10,256.14		
	จิตใจและอารมณ์	ระหว่างกลุ่ม	2	114.52	57.26	7.791**
		ภายในกลุ่ม	147	1,080.02	7.35	
		รวมทั้งหมด	149	1,194.54		

*P < 0.05 ; $F_{(2,147)} > 3.06$

**P < 0.01 ; $F_{(2,147)} > 4.75$

จากตารางที่ 17 ผลจากการนำคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีภาวะการแยกบุตรแตกต่างกันในขณะอยู่โรงพยาบาลมาทำการเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยแยกวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดโดยส่วนรวมและความคิดเห็นเป็นหมวดคือหมวดความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องเกี่ยวกับบุตร และเป็นรายค้านคือ คำนการเลี้ยงดู และกานจิตใจและอารมณ์ ผลปรากฏว่าความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดโดยส่วนรวมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายหมวด ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง และในเรื่องเกี่ยวกับบุตร พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และระดับ 0.05 ตามลำดับ และเมื่อวิเคราะห์เป็นรายค้านของแต่ละหมวดพบว่าในหมวดความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องเกี่ยวกับตนเองกานการเลี้ยงดูมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ในกานจิตใจและอารมณ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตรในกานการเลี้ยงดูผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับ 0.05 ในกานจิตใจและอารมณ์มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ทำการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดในหมวดและกานที่แตกต่างกันเป็นคู่ ๆ โดยวิธี กันแคนส์ นิว มัลติเปิล เรนจ์ เทสต์ (Duncan's new multiple range test) ซึ่งปรากฏผลดังในตารางที่ 18

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ป่วยในหมวดและค่านที่แตกต่างกันเป็นคู่ ๆ

หมวด	ความคิดเห็น	คู่เปรียบเทียบที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05	
ก	ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง	กลุ่ม	กลุ่ม
		1	กับ 3
		3	กับ 2
ข	ค่านการเลี้ยงดู	1	กับ 3
		3	กับ 2
ก	ค่านจิตใจและอารมณ์	1	กับ 3
		3	กับ 2
ข	ความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับบุตร	3	กับ 1
ข	ค่านจิตใจและอารมณ์	3	กับ 1
		2	กับ 1

กลุ่ม 1 = ผู้ป่วยหลังคลอดที่เลี้ยงบุตรด้วยตนเองตลอดเวลา

กลุ่ม 2 = ผู้ป่วยหลังคลอดที่บุตรแยกไปอยู่หอเด็กโดยไม่มีโอกาสเห็นหน้า

กลุ่ม 3 = ผู้ป่วยหลังคลอดที่มีโอกาสได้เลี้ยงบุตรเอง เป็นครั้งคราว

จากตารางที่ 18 จะเห็นว่า ในหมวดความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับตนเองของผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3

และผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 2

และจากการทำการวิเคราะห์ที่แนบส่งไปอีก ในแต่ละค่านของหมวดความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับตนเองค่านการเลี้ยงดู ผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3

และผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 2

ในหมวดความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับตนเอง กานจิตใจและอารมณ์ ผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3

และผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 2

ส่วนในหมวดความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับบุตร ผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 3 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 1

ในหมวดนี้ กานจิตใจและอารมณ์ผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 1 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 3 และผู้ป่วยหลังคลอดกลุ่มที่ 2 มีความคิดเห็นแตกต่างกับผู้ป่วยหลังคลอดในกลุ่มที่ 1

ส่วนคู่เปรียบเทียบอื่น ๆ ของแต่ละหมวดและแต่ละค่านที่ไม่ปรากฏในตารางต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งรายละเอียดในภาคผนวก ก.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเป็นคู่ ๆ

ความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อภาวะการแยกบุตร

ค่าผลต่าง

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเอง

ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{X}	52.96	54.47	58.72	
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 58.72 - 52.96 = 5.76^*$
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 58.72 - 54.47 = 4.25^*$
				$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 54.47 - 52.96 = 1.51$

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อตนเองก่อนการเลี้ยงดู

ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{X}	26.82	27.80	30.16	
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 30.16 - 26.82 = 3.34^*$
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 30.16 - 27.80 = 2.36^*$
				$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 27.80 - 26.82 = 0.98$

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อตนเองด้านจิตใจและอารมณ์

ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{X}	37.57	37.96	40.42	
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 40.42 - 37.57 = 2.85^*$
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 40.42 - 37.96 = 2.46^*$
				$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 37.96 - 37.57 = 0.39$

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อบุตร

ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{X}	29.94	32.24	35.90	
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 35.90 - 29.94 = 5.96^*$
				$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 35.90 - 32.24 = 3.66$
				$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 32.24 - 29.94 = 2.30$

ตารางที่ 19 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเป็นคู่ ๆ

ความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อภาวะการแยกบุตร				ค่าแตกต่าง
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับบุตร				
ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{x}	29.94	32.24	35.90	$\bar{x}_3 - \bar{x}_1 = 35.90 - 29.94 = 5.96^*$
				$\bar{x}_3 - \bar{x}_2 = 35.90 - 32.24 = 3.66$
				$\bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 32.24 - 29.94 = 2.30$
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับค่านิจใจและอารมณ์				
ลำดับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอด	1	2	3	
\bar{x}	6.52	7.59	8.63	$\bar{x}_3 - \bar{x}_1 = 8.63 - 6.52 = 2.11^*$
				$\bar{x}_3 - \bar{x}_2 = 8.63 - 7.59 = 1.04$
				$\bar{x}_2 - \bar{x}_1 = 7.59 - 6.52 = 1.07^*$

แสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. การทดสอบความแตกต่างของความคึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่ตั้งครรภ์เป็นครรภ์แรก และผู้ป่วยหลังคลอดที่ตั้งครรภ์เป็นครรภ์หลัง

ในการวิจัยได้แยกประเภทผู้ป่วยหลังคลอดเป็นผู้ป่วยครรภ์แรกและครรภ์หลัง จากนั้นไ้้นำความคึกเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอด 2 กลุ่มนี้มาเปรียบเทียบกันโดยวิธี ที เทสต์ (t-test) ซึ่งปรากฏผลดังตารางที่ 20

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบความคึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดระหว่างครรภ์แรกและครรภ์หลัง

หมวด	ความคึกเห็น	ครรภ์แรก N = 71		ครรภ์หลัง N = 79		t
		\bar{X}_1	SD ₁	\bar{X}_2	SD ₂	
	ส่วนรวม	99.05	6.97	100.10	6.68	0.931
ก	ผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	66.62	9.64	67.13	9.13	0.330
ก	กานการเลี้ยงดู	27.88	4.99	28.46	4.77	0.729
ก	กานจิตใจและอารมณ์	37.73	3.89	37.72	3.45	0.018
ข	ผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวข้องกับตนเอง	32.44	6.01	32.97	6.28	0.535
ข	กานการเลี้ยงดู	24.90	8.06	25.34	8.39	0.332
ข	กานจิตใจและอารมณ์	7.53	2.67	7.63	2.91	0.211

*P < 0.05 ค่า t ที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 = 1.96

**P < 0.01 ค่า t ที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 = 2.58

จากตารางที่ 20 ผลจากการนำคะแนนความนึกเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอดที่ถึงครรภ์ เป็นครรภ์แรกและครรภ์หลังมาเปรียบเทียบกันโดยวิธี ที - เทสต์ (t-test) โดยส่วนรวมและ แยกแต่ละหมวดคือ ความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับบุตร ตลอดทั้งความนึก เห็นของผู้ป่วยในแต่ละบ้านของแต่ละหมวด คือ ความการเลี้ยงดูและงานจิตใจและอารมณ์ ปรากฏผลว่า ความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั้ง 2 กลุ่มโดยส่วนรวม โดยแต่ละหมวด และโดยแต่ละบ้าน ต่างก็มี ความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งผลในการทดสอบแสดงว่าผู้ป่วยหลังคลอด ทั้ง 2 กลุ่ม ต่างมีความนึกเห็นที่ไม่แตกต่างกันเลย

จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบคะแนนความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดเป็นรายข้อ พบ ว่าผลการทดสอบความนึกเห็นในข้อ 6 คือ ความเชื่อมั่นในตนเองเกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตร มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนความนึกเห็นข้ออื่น ๆ ของผู้ป่วยหลังคลอดทั้ง 2 กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดคิ ภาควิชา พ. ข.

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. การทดสอบความแตกต่างของความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติและคลอดผิดปกติ

ในการวิจัยไ้แยกผู้ป่วยหลังคลอดตามสภาพการคลอดออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ คลอดปกติ และคลอดผิดปกติ จากนั้นนำความนึกเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วย 2 กลุ่มมาเปรียบเทียบกันโดยวิธีที - เทสต์ (t-test) ซึ่งปรากฏผลดังในตารางที่ 21

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติและคลอดผิดปกติ

หมวด	ความนึกเห็น	คลอดปกติ N = 106		คลอดผิดปกติ N = 44		t
		\bar{X}_1	SD ₁	\bar{X}_2	SD ₂	
	ส่วนรวม	99.57	7.09	99.71	6.19	0.119
ก.	ผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง	55.67	8.08	54.65	8.92	0.649
ก	การเลี้ยงดู	28.57	4.53	27.48	5.02	1.254
ก	จิตใจและอารมณ์	38.62	5.64	38.66	5.69	0.030
ข	ผู้ป่วยหลังคลอดในเรื่องเกี่ยวกับบุตร	32.37	10.12	33.57	10.29	0.654
ข	การเลี้ยงดู	24.80	8.11	25.93	8.49	0.752
ข	จิตใจและอารมณ์	7.57	2.80	7.64	2.80	0.140

*P 0.05 ค่า t ที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 = 1.96

**P 0.01 ค่า t ที่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 = 2.58

จากตารางที่ 21 ผลจากการนำคะแนนความนึกเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติ และผิดปกติ มาเปรียบเทียบกันโดยวิธี ที - เทสต์ (t-test) โดยส่วนรวมโดยแต่ละหมวดคือความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเองและที่เกี่ยวกับบุตร และจำแนกเป็นรายค้านของแต่ละหมวด ข้อค้านการเลี้ยงดู และด้านจิตใจและอารมณ์ ผลปรากฏว่าความนึกเห็นของผู้ป่วยในระหว่าง 2 กลุ่ม โดยส่วนรวมโดยแต่ละหมวดและแต่ละค้าน ต่างก็มีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงผลจากการทดสอบแสดงว่าผู้ป่วยหลังคลอดทั้ง 2 กลุ่มต่างก็มีความนึกเห็นไม่แตกต่างกันเลย

จากนั้นผู้วิจัยได้ทำการเปรียบเทียบคะแนนความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่คลอดปกติและคลอดผิดปกติเป็นรายข้อ ก็พบว่าผลการทดสอบแต่ละข้อต่างก็แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงรายละเอียดในภาคผนวก ค.



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. ทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจหรือ รายได้ของครอบครัวแตกต่างกัน

ในการวิจัยใช้ค่าแจกผู้ป่วยหลังคลอดตามรายได้ของครอบครัวคือ เกือบ (ทั้งของสามี และผู้ป่วย) เป็น 4 กลุ่มด้วยกันคือ กลุ่มที่มีรายได้

500 - 1000 บาท

1001 - 2000 บาท

2001 - 3000 บาท

3000 บาทขึ้นไป

จากนั้นได้ทำการ เปรียบ เทียบความแตกต่างของความคิดเห็นโดยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Analysis of variance one-way classification) ซึ่งปรากฏผลดังในตารางที่ 22

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทาง เศรษฐกิจแตกต่างกัน

หมวด	ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
		ระหว่างกลุ่ม	3	71.358	23.786	0.500
	ส่วนรวม	ภายในกลุ่ม	146	6,940.435	47.537	
		รวมทั้งหมด	149	7,011.793		
ก	ผู้ป่วยหลังคลอด ที่เกี่ยวข้องตนเอง	ระหว่างกลุ่ม	3	659.399	219.800	3.277*
		ภายในกลุ่ม	146	9,791.694	67.066	
		รวมทั้งหมด	149	10,451.093		
ก	การเลี้ยงดู	ระหว่างกลุ่ม	3	114.267	38.089	1.733
		ภายในกลุ่ม	146	3,208.107	21.973	
		รวมทั้งหมด	149	3,322.373		

ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกัน

หมวด	ความคิดเห็น	แหล่งความแปรปรวน	df	S S	M.S	F
ก	จิตใจและอารมณ์	ระหว่างกลุ่ม	3	375.890	125.297	4.016**
		ภายในกลุ่ม	146	4,554.943	31.198	
		รวมทั้งหมด	149	4,930.833		
ข	ผู้ป่วยหลังคลอด ที่เกี่ยวกับบุตร	ระหว่างกลุ่ม	3	1,216.124	405.375	4.125**
		ภายในกลุ่ม	146	14,348.116	98.275	
		รวมทั้งหมด	149	15,564.240		
ข	การเลี้ยงดู	ระหว่างกลุ่ม	3	609.452	203.150	3.096*
		ภายในกลุ่ม	146	9,579.880	65.616	
		รวมทั้งหมด	149	10,189.333		
ข	จิตใจและอารมณ์	ระหว่างกลุ่ม	3	107.161	35.720	4.878**
		ภายในกลุ่ม	146	1,069.213	7.323	
		รวมทั้งหมด	149	1,176.373		

*P < 0.05 ; ~~F.51~~ 2.60

**P < 0.01 ; ~~F.91~~ 3.91

จากตารางที่ 22 ผลจากการนำคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีฐานะทางเศรษฐกิจแตกต่างกันในแต่ละเดือนคือ

ผู้ป่วยรายได้ระหว่าง	500 - 1000 บาท
ผู้ป่วยรายได้ระหว่าง	1001 - 2000 บาท
ผู้ป่วยรายได้ระหว่าง	2001 - 3000 บาท
ผู้ป่วยรายได้ระหว่าง	3000 บาทขึ้นไป

มาทำการเปรียบเทียบความแตกต่างกันโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนว่าผู้ป่วยหลังคลอดแต่ละระดับของรายได้ มีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ ทว่าการนำความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดโดยส่วนรวมแล้วจำแนกความคิดเห็นเป็นหมวด คือหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตนเองและเกี่ยวกับบุตร และเป็นรายคานในแต่ละหมวดคือ คำนจิติใจและอารมณ์ ผลปรากฏว่า ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีคอบภาวะการแยกบุตรในหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตนเอง ผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายคาน ในคานการเลี้ยงดู ผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันที่ระดับ 0.05 ส่วนคานจิติใจและอารมณ์ ผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สำหรับในหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตรผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และในคานการเลี้ยงดูแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในคานจิติใจและอารมณ์นั้น ผู้ป่วยหลังคลอดมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผู้วิจัยจึงได้นำคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้แตกต่างกันมาเปรียบเทียบกันเป็นคู่ ๆ โดยวิธี คันแกนส์ นิว มัลติเปิล เรนจ์ เทสต์ (Duncan's new multiple range test) ซึ่งปรากฏผลดังในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดกว่าแนกตามระดับรายได้เป็น
คู่ ๆ

ความคิดเห็น	คู่เปรียบเทียบที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเอง (หมวด ก.)	ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 500-1000 บาท ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 1001-2000 บาท
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเอง (หมวด ก. กานจิตใจและอารมณ์)	ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 500-1000 บาท ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 1001-2000 บาท
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร (หมวด ข.)	ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 500-1000 บาท ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 1001-2000 บาท
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร (หมวด ข. กานการเลี้ยงดู)	ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 500-1000 บาท ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 1001-2000 บาท
ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตร (หมวด ข. กานจิตใจและอารมณ์)	ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 500-1000 บาท ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไปกับรายได้ 1001-2000 บาท ระดับรายได้ 500-1000 บาทขึ้นไปกับรายได้ - 2001 - 3000 บาท

จากตารางที่ 23 ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตรหลังคลอดทั้งหมดของกลุ่มผู้ป่วยที่มีรายได้ต่างกันปรากฏว่า กลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้สูง (3000 บาทขึ้นไป) มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้ต่ำ (500 - 1000 บาท) และกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้สูง (3000 บาทขึ้นไป) เท่านั้นที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้ปานกลาง (1001 - 2000 บาท) แต่กลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง (1001 - 2000 บาท) กับกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ (500 - 1000 บาท) มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน

ส่วนในกรณีจิตใจและอารมณ์นั้น กลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้สูง (3000 บาทขึ้นไป) มีความคิดเห็นแตกต่างกับกลุ่มผู้ป่วยหลังคลอดที่มีรายได้ต่ำ (500 - 1000 บาท) และกลุ่มที่มีรายได้ปานกลาง (1001 - 2000 บาท) แต่กลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง (2001 - 3000 บาท) มีความคิดเห็นในเรื่องนี้แตกต่างกับกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ (500 - 1000 บาท)

ส่วนที่เปรียบเทียบอื่น ๆ ของแต่ละหมวดและแต่ละคำที่ไม่ปรากฏในตารางต่างมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง.

ศูนย์วิจัยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดจำแนกตามเศรษฐกิจ รายได้เป็นคู่ ๆ

ความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีภาวะการแยกบุตร

ค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเอง

ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป 2001-3000บาท 1001-2000บาท 500-1000 บาท

\bar{X}	52.68	55.19	56.42	59.52	$\bar{X}_4 - \bar{X}_1 = 59.52 - 52.68 = 6.84^*$
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	$\bar{X}_4 - \bar{X}_2 = 59.52 - 55.19 = 4.33^*$
					$\bar{X}_4 - \bar{X}_3 = 59.52 - 56.42 = 3.10$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 56.42 - 52.68 = 3.74$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 56.42 - 55.19 = 1.23$
					$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 55.19 - 52.68 = 2.51$

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับตนเองด้านจิตใจและอารมณ์

ระดับรายได้ 3000 บาทขึ้นไป 2001-3000บาท 1001-2000บาท 500-1000บาท

\bar{X}	36.65	38.54	39.08	41.90	$\bar{X}_4 - \bar{X}_1 = 41.90 - 36.65 = 5.25^*$
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	$\bar{X}_4 - \bar{X}_2 = 41.90 - 38.54 = 3.36^*$
					$\bar{X}_4 - \bar{X}_3 = 41.90 - 39.08 = 2.82$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 39.08 - 36.65 = 2.43$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 39.08 - 38.54 = 0.54$
					$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 38.54 - 36.65 = 1.89$

ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้อยู่หลังล่อคว่าแนวคามเศรษฐกิจ
รายได้เป็นคู่ ๆ

ความคิดเห็นของผู้อยู่หลังล่อภาวะการแยกบุตร

ความคิดเห็นของผู้อยู่หลังล่อคดีเกี่ยวกับบุตร

ระดับรายได้ 300บาทขึ้นไป 2001-3000บาท 1001-2000บาท 500-1000บาท

\bar{X}	26.67	30.96	33.62	35.65	$\bar{X}_4 - \bar{X}_1 = 35.65 - 26.67 = 8.98^*$
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	$\bar{X}_4 - \bar{X}_2 = 35.65 - 30.96 = 4.69$
					$\bar{X}_4 - \bar{X}_3 = 35.65 - 33.62 = 2.03$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 33.62 - 26.67 = 6.95^*$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 33.62 - 30.96 = 2.66$
					$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 30.96 - 26.67 = 4.29$

ความคิดเห็นของผู้อยู่หลังล่อคดีเกี่ยวกับบุตรกานการเลี้ยงดู

ระดับรายได้ 300บาทขึ้นไป 2001-3000บาท 1001-2000บาท 500-1000บาท

\bar{X}	20.71	24.17	25.74	27.16	$\bar{X}_4 - \bar{X}_1 = 27.16 - 20.71 = 6.45^*$
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	$\bar{X}_4 - \bar{X}_2 = 27.16 - 24.17 = 2.99$
					$\bar{X}_4 - \bar{X}_3 = 27.16 - 25.74 = 1.42$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 25.74 - 20.71 = 5.03^*$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 25.74 - 24.17 = 1.57$
					$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 24.17 - 20.71 = 3.46$

ตารางที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดจำแนกตามเศรษฐกิจ รายได้เป็นคู่ ๆ

ความคิดเห็นของผู้ป่วยที่มีต่อภาวะการแยกบุตร

ค่าเฉลี่ย

ความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่เกี่ยวกับบุตรกำเนิดและอารมณ์

ระดับรายได้ 3000บาทขึ้นไป 2001-3000บาท 1001-2000บาท 500-1000บาท

\bar{X}	5.95	6.79	7.88	8.49	$\bar{X}_4 - \bar{X}_1 = 8.49 - 5.95 = 2.54^*$
ลำดับ	(1)	(2)	(3)	(4)	$\bar{X}_4 - \bar{X}_2 = 8.49 - 6.79 = 1.70^*$
					$\bar{X}_4 - \bar{X}_3 = 8.49 - 7.88 = 0.61$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_1 = 7.88 - 5.95 = 1.93^*$
					$\bar{X}_3 - \bar{X}_2 = 7.88 - 6.79 = 1.09$
					$\bar{X}_2 - \bar{X}_1 = 6.79 - 5.95 = 0.84$

* แสดงความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6. แสดงลำดับที่ของความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตรทั้งหมด จากการวิจัยให้นำความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดทั้งหมดมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายชื่อทั้งหมด แล้วนำความนึกเห็นนั้นมาเรียงลำดับตามความมากน้อยของค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งปรากฏผลดังในตารางที่ 25

ตารางที่ 25 ลำดับที่ของความนึกเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตรทั้งหมด

ลำดับที่	ข้อที่	ข้อความ	หมวด ก.		หมวด ข		\bar{X}	S.D.
			ตอนที่ 1	ตอนที่ 2	ตอนที่ 1	ตอนที่ 2		
ความนึกเห็นที่อยู่ในระดับที่ (คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50)								
1	15	ความรู้สึกลึบลึกที่ใดเห็นหน้าบุตร		X			4.81	0.89
2	17	ความรู้สึกลึบลึกที่มีใจถ้าได้เลี้ยงบุตร คนเดียวตั้งแต่แรกคลอด		X			4.48	0.71
3	13	ความรู้สึกลึบลึกสนใจบุตร เมื่อนำบุตรมาให้ หลังจากแยกกันชั่วคราว		X			4.25	0.80
4	16	ความต้องการไปเยี่ยมบุตรบ่อยครั้ง		X			4.23	1.10
5	8	มารดาควรใกล้ชิดกับบุตรก่อน มากกว่าคนอื่น		X			4.19	0.98
6	12	ความรู้สึกลึบลึกของการยอมรับบุตร เมื่อนำ บุตรมาให้หลังจากแยกกันชั่วคราว		X			4.10	0.81
7	2	ความต้องการให้การดูแลบุตรด้วย ตนเอง		X			4.02	1.26
8	1	ความต้องการให้บุตรดูแลตนเอง	X				4.01	1.20
9	14	ความรู้สึกลึบลึกมั่นใจว่าเป็นบุตรของตนเอง		X			3.95	1.04
10	20	คิดว่า จะมีการสลับเปลี่ยนบุตรของตน			X		3.92	1.29

ตารางที่ 25 ลำดับที่ของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร
ทั้งหมด

ลำดับที่	ข้อที่	ข้อความ	หมวด ก		หมวด ข		\bar{X}	S.D.
			งานที่1	งานที่2	งานที่1	งานที่2		
11	9	มีความวิตกกังวลเกิดขึ้น		X			3.91	1.17
12	7	มารภาคสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุตรด้วยการเลี้ยงดูตั้งแต่แรกคลอด	X				3.89	0.85
13	10	นอนไม่หลับ		X			3.53	1.12
14	4	ความรู้สึกว่าตนเองผิด และไม่สบายใจ ถ้าไม่ได้เลี้ยงบุตรด้วยตนเองตั้งแต่แรกคลอด	X				3.52	1.11
ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50)								
15	6	ความเชื่อมั่นในตนเอง เกี่ยวกับการเลี้ยงบุตร	X				3.17	1.21
16	5	ความรู้สึกของการเป็นมารดาที่สมบูรณ์	X				3.07	1.26
17	29	คิดว่าการแยกจากกันมีผลต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโตของบุตร				X	3.00	1.26
18	18	การจัดให้มารดาและบุตรแยกกัน ช่วยให้มารดามีเวลาพักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ				X	2.98	1.20
19	11	ความรู้สึกไม่อยากพุดหรือคุยกับคนอื่น		X			2.90	1.01

ตารางที่ 25 ลำดับที่ของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร
ทั้งหมด

ลำดับที่	ข้อที่	ข้อความ	หมวด ก		หมวด ข		X	S.D.
			ตอนที่ 1	ตอนที่ 2	ตอนที่ 1	ตอนที่ 2		
20	21	คิดว่าบุตรของตนเองจะไม่ได้รับนมตามเวลาที่ต้องการ			X		2.84	1.36
21	27	คิดว่าบุตรอาจจะอยู่กับผู้ที่ทำหน้าที่โดยตรงในระยะนี้			X		2.83	1.43
22	23	คิดว่าบุตรของตนเองจะไม่ได้รับความปลอดภัย			X		2.82	1.32
23	19	คิดว่าบุตรของตนถูกทอดทิ้ง			X		2.67	1.32
24	30	ไม่แน่ใจในความพึงพอใจที่บุตรได้รับจากการสัมผัสจากบุคคลอื่น				X	2.63	1.07
25	25	คิดว่าบุตรอาจได้รับเชื้อ ถ้ามีการติดเชื้อมากขึ้น			X		2.60	1.24
26	22	คิดว่าบุตรของตนเองนอนที่นอนเปียกชื้น			X		2.57	1.31
27	26	คิดว่าบุตรของตนเองจะถูกปล่อยปละละเลย			X		2.56	1.30

ตารางที่ 25 ลำดับที่ของความคิดเห็นของผู้ป่วยหลังคลอดที่มีต่อภาวะการแยกบุตร
ทั้งหมด

ลำดับที่	ข้อที่	ข้อความ	หมวด ก		หมวด ข		\bar{X}	S.D.
			กานที่ 1	กานที่ 2	กานที่ 1	กานที่ 2		
ความคิดเห็นที่อยู่ในระดับค่อนข้างเลว (คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50)								
28	3	ความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ในการเลี้ยงดู บุตรของตน	X				2.37	1.18
29	24	คิดว่าบุตรของตนจะไม่สามารถรับความ ปลอดภัย			X		2.31	1.33
30	28	คิดว่าไม่มีใครสัมผัสบุตรขนาดเท่า มารดา				X	1.95	1.19

กานที่ 1 = กานการเลี้ยงดู
กานที่ 2 = กานจิตใจและอารมณ์

จากตารางที่ 25 ผู้ป่วยหลังคลอดให้ความสำคัญของความคิดเห็นที่มีต่อภาวะการแยกบุตร
ใน 5 ลำดับแรก เป็นหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตนเอง โดยที่ 4 ลำดับแรกเป็นกานจิตใจและอารมณ์
ลำดับที่ 5 เป็นกานการเลี้ยงดู และให้ความสำคัญของความคิดเห็นที่มีต่อภาวะการแยกบุตร 5 ลำดับ
สุดท้ายเป็นหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบุตร เป็นส่วนใหญ่ โดย 4 ลำดับ เป็นหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
บุตร และ 1 ลำดับ เป็นหมวดความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตนเอง และลำดับสุดท้ายเป็นหมวดความคิดเห็นที่
เกี่ยวกับบุตรกานจิตใจและอารมณ์ ส่วนลำดับที่ 3 รองสุดท้ายเป็นความคิดเห็นที่เกี่ยวกับตนเองกานการ
เลี้ยงดู

โดยทั่วไปจะเห็นได้ว่า ผู้ป่วยหลังคลอดให้ความสำคัญของการ
แยกบุตรที่เกี่ยวกับตนเอง มากกว่าให้ความสำคัญของการคิดเห็นเกี่ยวกับบุตร โดยจะเห็นว่า ใน
15 ลำดับแรก จะให้ความสำคัญของการคิดเห็นเกี่ยวกับบุตรเพียงข้อเดียว คือ ลำดับที่ 10 ข้อที่ 20
(คิดว่าจะมีการสืบ เมื่อยุติบุตรของตน) ทั้งรายละเอียดในตารางที่ 25



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย