



## ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นวัยรุ่นคั้งครัวชั้นมีอาชญากรรม 15 – 19 ปี มากครรภ์ในโรงพยาบาลของรัฐบาล และโรงพยาบาลองค์การถูกดูแลสาธารณะ ซึ่งมีจำนวน เดียว 500 เตียงขึ้นไป และมีแผนกสูติกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง

## ตัวอย่างประชากร

ตัวอย่างประชากร คือวัยรุ่นคั้งครัวที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างดังนี้ คือ ครั้งแรก สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยสุ่มໄเล ๓ แห่ง จากโรงพยาบาล ๙ แห่ง จากนั้น เลือกตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ คือ เป็นวัยรุ่นอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ครรภ์แรก อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไป มากครรภ์ในช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูล จำนวน ก่อนตัวอย่างประชากรทั้งสิ้น 150 คน ในเวลา ๓ สัปดาห์

## เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความต้องการค้านสุขภาพ อนามัยของวัยรุ่นคั้งครัว ซึ่งมีอายุระหว่าง 15 – 19 ปี ลักษณะของแบบสัมภาษณ์แบบ เป็น ๓ ตอน คือ

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

ตอนที่ ๒ ความต้องการค้านสุขภาพอนามัย ซึ่งໄค์แก่ ค้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และค่าแนะนำ

ตอนที่ ๓ อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นในระยะคั้งครัว และความต้องการคำแนะนำ เมื่ออาการผิดปกติ

## การหาความครองตามเมืองทางแบบสัมภาษณ์

ผู้วิจัยได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางการพยาบาลมาเพื่อประเมินความครองของแบบสัมภาษณ์ โดยกำหนดเกณฑ์การเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ คือ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝ่ายบริการ หรือฝ่ายการศึกษาและมีประสบการณ์ในการคุ้มครองผู้ป่วยรุนแรงมาก จากเกณฑ์ทั้งกล่าว ผู้วิจัยได้เลือกผู้ทรงคุณวุฒิจากสถานที่ ๗ แห่งที่ไปนี้

ภาควิชาชานามัยแม่และเด็ก คณะสาธารณสุขฯ มหาวิทยาลัยมหิดล	1 ท่าน
ภาควิชาพยาบาลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2 ท่าน
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น	1 ท่าน
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1 ท่าน
แผนกปากครรภ์ โรงพยาบาลศิริราช	1 ท่าน
แผนกปากครรภ์ โรงพยาบาลรามคำแหง	1 ท่าน
แผนกปากครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	1 ท่าน
แผนกปากครรภ์ โรงพยาบาลราชวิถี	1 ท่าน
แผนกปากครรภ์ วชิรพยาบาล	1 ท่าน

เนื่องจากแบบสัมภาษณ์นี้เป็นภาษาไทย ผู้วิจัยได้วางระหว่างความคิดเห็นและขอเสนอแนะนำไปปรับปรุง แบบสัมภาษณ์โดยเลือกขอที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นตรงกันทั้งหมด ๘ ท่านขึ้นไปไว้ และเพิ่มเติม ส่วนที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำตรงกันแค่ ๕ ท่านขึ้นไป

## การนำแบบสัมภาษณ์ไปทดลองใช้

ผู้วิจัยได้นำแบบสัมภาษณ์ที่ปรับปรุงแล้วนี้ไปลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่างประชากรจริงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 20 คน ซึ่งภายหลังการลองใช้ได้ปรับปรุงข้อคำถามและเพิ่มแบบสัมภาษณ์ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นอีก ๒ ข้อ เพื่อความเน่าระสน กังนั้นจึงรวมเป็นทั้งสิ้น 76 ข้อ

### การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกัญชากายคนสองและนิยูชูบสัมภาษณ์อีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นพนักงาน โดยผู้วิจัยใช้ชี้แจงรศดุประส่งค์และอธิบายรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูล ก่อนความเข้าใจของกัน ผู้วิจัยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในพยาบาลละ 1 สัปดาห์ รวมทั้งสั้น 3 สัปดาห์ คือระหว่างวันที่ 8 – 26 สิงหาคม 2526

### การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (SPSS) ของสถาบันบริการคอมพิวเตอร์ ที่มาลงกรณฑ์ทางวิทยาลัย คำนวณหาค่าทาง ๆ กันนี้ คือ

1. ทำการอยละของสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ ชาย ระดับ การศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอนรับการสมรส ระดับเหเรนทรูนานะ อาชีพ และสภาพการคั้งครรภ์รังนี
2. ทำการอยละของความคองการก้านสุขภาพอนามัยและความคองการก้านค่าแนะนำของกลุ่มตัวอย่าง
3. ทำการสัมพันธ์ระหว่างความคองการก้านสุขภาพอนามัย และความคองการก้านค่าแนะนำ กับภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ไก่แก่ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว สถานภาพการยอนรับการสมรส ระดับเหเรนทรูนานะ โดยการทดสอบค่าไคสแควร์ ( $\chi^2$ )
4. ทำการอยละของอาการนิคปิกในขณะทั้งครรภ์และความคองการก้านค่าแนะนำเมื่ออาการนิคปิกคิดเห็น

### สถิติที่ใช้ในการวิจัย

$$\chi^2_{(df)} = \sum \left[ \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e} \right] ^1$$

เมื่อ	$f_o$	คือ ความถี่ที่ได้จากการปฏิบัติ
	$f_e$	คือ ความถี่ตามสมมติฐาน
	$\Sigma$	คือ ผลรวม
	$df$	คือ ขั้นแบ่งความเป็นอิสระ

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

---

<sup>1</sup> ประกาศ กրรณาคุ. สบคิศาสตร์ประยุกษาหัวครุ (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ไทยรัชนาพานิช, 2522), หน้า 120.