

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิจัยเรื่อง ความรู้ และทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ และ ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโรคเอดส์ และ เพื่อเปรียบเทียบความรู้ ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามตัวแปรเพศ ระดับการศึกษาของบิดา และ ระดับการศึกษาของมารดา

ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวอย่าง ประชากรที่ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนรัฐบาล กรุงเทพมหานคร รวม ทั้งสิ้นจำนวน 500 คน เป็นนักเรียนชาย 250 คนและนักเรียนหญิง 250 คน โดยผู้วิจัยทำ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งสิ้นจำนวน 490 ฉบับ คิด เป็นร้อยละ 98

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เอส พี เอส เอส พี ซี (SPSS/PC)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอเป็น 3 ตอน ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
2. ความรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโรคเอดส์
3. ทัศนคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับโรคเอดส์



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นป্রชัชช์มติศึกษาปีที่ 6

นำข้อมูลทั่วไปของนักเรียนชั้นป্রชัชช์มติศึกษาปีที่ 6 มาแจกแจงความถี่ และหาค่าร้อยละของข้อมูลเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางที่ 1 - 2

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนชั้นป্রชัชช์มติศึกษาปีที่ 6 จำแนกตาม เพศ อายุ ศาสนา อาชีพของบิดา มารดา การศึกษาของบิดามารดา

รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	(N = 490)		(N = 240)		(N = 250)	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ปัจจุบันนักเรียนมีอายุ						
ต่ำกว่าอายุ 11 ปี	4	0.8	2	0.8	2	0.8
อายุ 11 ปี	118	24.1	63	26.3	55	22.0
อายุ 12 ปี	297	60.6	132	55.0	165	66.0
อายุ 13 ปี	61	12.4	35	14.6	26	10.4
อายุ 14 ปี	7	1.4	6	2.5	1	0.4
มากกว่า 14 ปี	3	0.6	2	0.8	1	0.4
ศาสนา						
พุทธ	462	94.3	225	92.8	237	94.8
อิสลาม	24	4.9	13	5.4	11	4.4
คริสต์	4	0.8	2	0.8	2	0.8
อื่น ๆ						

### ศาสนา

พุทธ	462	94.3	225	92.8	237	94.8
อิสลาม	24	4.9	13	5.4	11	4.4
คริสต์	4	0.8	2	0.8	2	0.8
อื่น ๆ						

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนทั้งหมด	นักเรียนชาย	นักเรียนหญิง
	(N = 490)	(N = 240)	(N = 250)
	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ

## อาชีพบิดา

รับราชการ	128	26.1	67	27.9	61	24.4
เกษตรกรรม	5	1.0	2	0.8	3	1.2
กรรมกร	19	3.9	7	2.9	12	4.8
ค้าขาย	107	21.8	44	18.3	63	25.2
รับจ้างท้าไป	156	31.8	82	34.2	74	29.6
พนักงานบริษัท	67	13.7	36	15.0	31	12.4
อื่น ๆ	8	1.6	2	0.8	6	2.4

## อาชีพมารดา

แม่บ้าน	180	36.7	78	38.5	102	40.8
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ	63	12.9	43	17.9	20	8.0
เกษตรกรรม	4	0.8	2	0.8	2	0.8
ค้าขาย	128	26.1	55	22.9	73	29.2
รับจ้างท้าไป	72	14.7	40	16.7	32	12.8
พนักงานบริษัท	41	8.4	22	9.2	19	7.6
อื่น ๆ	2	0.4	-	-	2	0.8

## ตารางที่ 1 (ต่อ)

รายการ	นักเรียนห้องน้ำด (N = 490)	นักเรียนชาย (N = 240)	นักเรียนหญิง (N = 250)
	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ
<b>การศึกษาของบิดา</b>			
ไม่ได้เรียนหนังสือ	5 1.0	2 0.8	3 1.2
ประถมตีกษา	204 41.6	87 36.3	117 46.8
มัธยมตีกษา	152 31.0	78 32.5	74 29.6
ปริญญาตรี	87 17.8	44 18.3	43 17.2
อื่น ๆ	42 8.6	29 12.1	13 5.2
<b>การศึกษาของมารดา</b>			
ไม่ได้เรียนหนังสือ	17 3.5	8 3.3	9 3.6
ประถมตีกษา	245 50.0	119 49.6	126 50.4
มัธยมตีกษา	131 26.7	54 22.5	77 30.8
ปริญญาตรี	76 15.5	44 18.3	32 12.8
อื่น ๆ	21 4.3	15 6.3	6 2.4

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ อายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.1 นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 94.3 รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 4.7 ในด้านการประกอบอาชีพบิดาของนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 31.8 อาชีพรองลงมาคือ รับราชการ คิดเป็นร้อยละ 26.1 มาตราของนักเรียนประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 36.7 อาชีพรองลงมาคือ ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 26.1 รายได้การศึกษา

ของบิดามารดาส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 41.6 และ 50.0 ตามลำดับ ระดับการศึกษาของบิดามารดาของลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 31.0 และ 26.7 ตามลำดับ

เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมา มีอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.3 นักเรียนร้อยละ 92.8 นับถือศาสนาพหุ รองลงมา ร้อยละ 5.4 นับถือศาสนาอิสลาม บิดาของนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 34.2 อาชีพรองลงมาคือรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 27.9 มาตรการประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 38.5 อาชีพรองลงมาคือ ด้วย คิดเป็นร้อยละ 22.9 ระดับการศึกษาของบิดาและมาตรการส่วนใหญ่ใน ระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 36.3 และ 46.8 ตามลำดับ ระดับการศึกษารองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ 29.6 ตามลำดับ

นักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีอายุ 12 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.0 รองลงมา มีอายุ 11 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 นักเรียนร้อยละ 94.8 นับถือศาสนาพหุ รองลงมา ร้อยละ 4.4 นับถือศาสนาอิสลาม บิดาของนักเรียนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 29.6 อาชีพรองลงมาคือรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 24.4 มาตรการประกอบอาชีพแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 40.8 อาชีพรองลงมาคือ ด้วย คิดเป็นร้อยละ 29.2 ระดับการศึกษาของบิดาส่วนใหญ่ในระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 29.6 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 17.2 มาตรการส่วนใหญ่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.4 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.8

## ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปกรณ์รวมมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของนักเรียนทั้งหมดศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลโรคเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์ การรู้จักหรือเคยพบเห็นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

รายการ	นักเรียนทั้งหมด	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		
	(N = 490)	(N = 240)	(N = 250)	จำนวน	ร้อยละ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<b>นักเรียนเคยได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูลโรคเอดส์หรือไม่</b>						
เคย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)	490	100	240	49.0	250	51.0
ไม่เคย	-	-	-	-	-	-
บิตา มารดา	250	51.0	119	49.6	131	52.4
ครู อาจารย์	361	73.7	173	72.1	188	75.2
หนังสือแบบเรียน	165	33.7	79	32.9	86	34.4
นิทรรศการในโรงเรียน	298	30.8	145	60.4	153	61.2
นิทรรศการที่มีองค์การหรือเอกชนจัดขึ้นนอกโรงเรียน	227	46.3	119	49.6	108	43.2
สื่อมาลชน เช่น หนังสือพิมพ์						
วิทยุ โทรทัศน์	447	91.2	223	92.9	224	89.6
เพื่อน	164	33.5	86	35.8	78	31.2
อื่น ๆ	7	1.4	6	2.5	1	0.4
<b>นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์</b>						
เคย	7	1.4	5	2.1	2	0.8
ไม่เคย	483	98.6	235	97.9	248	99.2

ตารางที่ 2 (ต่อ)

I

รายการ	นักเรียนทั้งหมด	นักเรียนชาย	นักเรียนหญิง
	(N = 490)	(N = 240)	(N = 250)
จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ	จำนวน ร้อยละ

I

นักเรียนรู้จักหรือ เคยพบทั่นบุคคล  
ที่ป่วยเป็นโรคเอดส์

เคย	112	22.9	50	20.8	62	24.8
ไม่เคย	378	77.1	190	79.2	188	75.2

นักเรียนเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

เคย	5	1.0	-	-	5	2.0
ไม่เคย	485	99.0	240	100	245	98.2

I

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่านักเรียนทั้งหมด เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 100 และแหล่งข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเอดส์ที่เคยได้รับนั้น ส่วนใหญ่ได้รับจาก สื่อมาลชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 91.2 รองลงมาคือจาก ครุ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 73.7 ส่วนด้านการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 1.4 เคยรู้จักหรือพบทั่นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 22.9 และเคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด คิดเป็นร้อยละ 1.0

เมื่อจำแนกตามเพศ พบร้า นักเรียนชายส่วนใหญ่ เคยได้รับความรู้เกี่ยวกับข่าวสาร ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์ จากสื่อมาลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 92.9 รองลงมาคือจาก ครุ อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 72.1 ส่วนด้านการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนชายเคยมีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 2.1 เคยรู้จักหรือพบทั่นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 20.8 และนักเรียนชายไม่เคยใช้ยาเสพติดชนิดฉีด

นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ เดย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับข้าวสาร ข้อมูลเรื่องโรคเอดส์ จากสื่อมาลชน เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 87.6 รองลงมาคือจากครู อาจารย์ คิดเป็นร้อยละ 75.2 ส่วนด้านการมีเพศสัมพันธ์ นักเรียนเดย์มีเพศสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 0.8 เดย์รู้จักหรือพบเห็นบุคคลที่ป่วยเป็นโรคเอดส์ คิดเป็นร้อยละ 24.8 และ เดย์ใช้ยาเสพติดชนิดนิด คิดเป็นร้อยละ 2.0



**ตอนที่ 2 ความรู้ และการเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6**

ผู้วิจัยทราบให้คะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แล้วนำมาหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษาของบิดา และระดับการศึกษาของมารดา โดยการทดสอบค่า "ที" (t-test) ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ 3 - 12

**ตารางที่ 3 จำนวน และค่าร้อยละของระดับคะแนนความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6**

เกณฑ์ระดับความรู้ ร้อยละ ระดับคะแนน ของนักเรียน	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	N = 490		N = 240		N = 250	
ดีมาก	80-100	16-20	4	0.8	2	0.8
ดี	70-79	14-15	120	24.5	62	25.8
ปานกลาง	60-69	12-13	261	53.3	124	51.7
พอใช้	50-59	10-11	83	16.9	43	17.9
ต้องปรับปรุง	0-49	0-9	22	4.5	9	3.8
รวม	490	100	240	100	240	100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมาคือร้อยละ 24.5 มีความรู้อยู่ในระดับดี ร้อยละ 16.9 มีความรู้อยู่ในระดับพอใช้ และนักเรียนร้อยละ 4.5 มีความรู้อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

เมื่อพิจารณาแยกตาม เพศ ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับ โรคเอดส์ อายุในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.7 และ 54.8 ตามลำดับ รองลงมา อายุในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ 23.2 ตามลำดับ



ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับโรค  
เอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนทั้งหมด (N = 490)	
		$\bar{X}$	SD
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.28	0.45
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส	0.77	0.42
3.	เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว	0.26	0.44
4.	โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกครั้ง	0.74	0.44
5.	ผู้สั่งส่อนทางเพศ มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด	0.91	0.21
6.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วอาการที่แสดงว่าอาจเป็นโรคเอดส์ในระยะเริ่มแรก คือ ท้องร่วงเรื้อรังและน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ	0.54	0.50
7.	อาการพิเศษในช่องปากที่เตือนว่าอาจเป็นอาการของ การติดเชื้อโรคเอดส์ คือ เป็นผ้าขาวในช่องปากนานเกิน 3 เดือน	0.34	0.47
8.	ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์ผู้ป่วยมักเสียชีวิตเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	0.54	0.50
9.	ในปัจจุบันเชื้อเอดส์ติดต่อทางเพศสัมพันธ์และทางเลือด	0.91	0.29
10.	นักเรียนอาจติดเชื้อโรคได้จากการใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์	0.65	0.48

## ตารางที่ 4 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนทั้งหมด	
		(N = 490)	$\bar{X}$
11.	ของใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อเอดส์ได้ คือ ที่ตัดเล็บ	0.64	0.48
12.	การกรซทำที่เสียงต่อกการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน	0.95	0.22
13.	การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดสามารถทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้	0.96	0.20
14.	โรคเอดส์ไม่มีทางรักษาให้นายแต่ชลอให้มีอาการน้อยลง	0.79	0.41
15.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ นอกจากตรวจเลือดแล้วยังสามารถตรวจได้จากน้ำลาย	0.10	0.30
16.	วิธีป้องกันการไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ได้ผลดีที่สุดคือ ใช้ถุงยางอนามัย	0.88	0.33
17.	การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบันยาที่ใช้เพื่อยุติยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเอดส์ ในร่างกายผู้ป่วย คือ ยา เอ แซด ที (A Z T)	0.12	0.33
18.	เมื่อส่วนของร่างกายนักเรียนไปสัมผัสเป็นกับเลือดของผู้อื่น ควรล้างด้วยน้ำสบู่โดยเร็ว	0.63	0.48
19.	ถ้านักเรียนติดเชื้อโรคเอดส์ นักเรียนจะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง เพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว	0.76	0.43
20.	นักเรียนติดเชื้อไวรัสที่ติดต่อ ในการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ คือให้ความรู้ในการป้องกันตนของจากโรคเอดส์	0.85	0.36
	รวม	0.63	0.13

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63

ข้อที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบถูก ได้แก่ ข้อ

1. ผู้ที่สำนักงานเขต มีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด
2. ในปัจจุบัน เรื่องเอดส์ติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และทาง เสือค
3. การกระทำที่เสี่ยงต่อการติดเรื่องโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติด ร่วมกัน
4. การใช้ยาเสพติดชนิดฉีดสามารถทำให้ติดเรื่องโรคเอดส์ได้

และข้อที่นักเรียนส่วนใหญ่ตอบไม่ถูกต้อง ได้แก่ ข้อ

1. โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกาย เสื่อมหรือ บกพร่อง
2. เรื่องโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว
3. อาการผิดปกติในช่องปากที่เดือนว่า อาจเป็นอาการของโรคติดเรื่อง โรคเอดส์ คือ เป็นฝ้าชาในช่องปากนานเกิน ๓ เดือน
4. การตรวจหาเรื่องโรคเอดส์ นอกจากตรวจเลือดแล้วยังสามารถตรวจ ได้จากน้ำลาย
5. การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบัน ยาที่ใช้เพื่อยุติขั้นการแบ่งตัวของไวรัส เอดส์ ในร่างกายผู้ป่วย คือ ยาเอ แซต ที (A Z T)

## ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปกรณ์รวมมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นป্রถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		<i>t</i>
		(N = 240)	(N = 250)	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจาก ภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.35	0.47	0.22	0.41	3.21*
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส	0.77	0.42	0.77	0.41	0.07
3.	เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว	0.32	0.47	0.20	0.40	3.28*
4.	โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เพราะเป็น โรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกราย	0.72	0.45	0.76	0.42	-1.19
5.	ผู้ที่สั่งสอนทางเพศมีความเสี่ยง ต่อการ ติดโรคเอดส์มากที่สุด	0.93	0.26	0.90	0.30	1.16
6.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกาย แล้วอาการที่แสดงว่า อาจเป็นโรคเอดส์ ในระยะเริ่มแรก คือห้องร่างเรือรังและ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ	0.52	0.50	0.57	0.50	-1.23
7.	อาการผิดปกติในช่องปาก ที่เตือนว่าอาจ เป็นอาการของ การติดเชื้อโรคเอดส์ คือ เป็นฝ้าข้าวในช่องปากนาน เกิน 3 เดือน	0.32	0.47	0.35	0.48	-0.81
8.	ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์ผู้ป่วยมักเสีย ชีวิตเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	0.57	0.50	0.31	0.50	-1.31
9.	ในปัจจุบันเชื้อเอดส์ติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และทางเลือด	0.92	0.26	0.90	0.31	1.12

## ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N = 240)	(N = 250)	$\bar{X}$	SD	
10.	นักเรียนอาจติดเชื้อโรค ได้จากการใช้ แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์	0.60	0.49	0.71	0.46	-2.53*
11.	ของใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้ เกิดการแพร่เชื้อเอดส์ได้ คือ ที่ตัดเล็บ	0.63	0.48	0.65	0.48	-0.43
12.	การกรายทำที่เสียงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน	0.95	0.22	0.95	0.22	0.10
13.	การใช้ยาเสพติดชนิดนึง สามารถทำให้ติด เชื้อโรคเอดส์ได้	0.98	0.14	0.94	0.24	2.39*
14.	โรคเอดส์ไม่มีทางรักษาให้หายแต่ชลอให้ มีอาการน้อยลง	0.79	0.41	0.79	0.41	-0.01
15.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ นอกจากราช เลือดแล้วยัง สามารถตรวจได้จากน้ำลาย	0.10	0.31	0.09	0.28	0.61
16.	วิธีป้องกันการไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ได้ ผลดีที่สุดคือ ใช้ถุงยางอนามัย	0.89	0.30	0.86	0.34	1.08
17.	การรักษาโรคเอดส์ ในปัจจุบันยาที่ใช้เพื่อ หยุดยั้ง การเปล่งตัวของ ไวรัสเอดส์ ใน	0.13	0.34	0.11	0.31	0.86
18.	เมื่อส่วนของร่างกายนักเรียน ไปสัมผัส เป็นกับเลือดของผู้อื่นควรล้างด้วยน้ำสบู่ โดยเร็ว	0.60	0.49	0.65	0.48	-1.00

## ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
19.	ถ้านักเรียนติดเชื้อโรคเอดส์ นักเรียนจะ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ มีชีวิตที่ยืนยา	0.75	0.43	0.77	0.42	-0.57	
20.	นักเรียนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ คือ ให้ความรู้ในการ ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์	0.84	0.37	0.86	0.35	-0.57	
รวม		0.63	0.13	0.63	0.14	0.61	

\* $p < .05$  ( $.05 \frac{t}{\infty} = +1.96$ )

จากตารางที่ 5 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวมระหว่าง  
นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้เกี่ยวกับโรค  
เอดส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้  
เกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 4 ข้อ  
ดังต่อไปนี้ คือ

ข้อที่ 1. โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น  
หรือบกพร่อง

ข้อที่ 3. เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว

ข้อที่ 10. นักเรียนอาจติดเชื้อโรคเอดส์ได้จากการใช้แอลกอฮอล์ร่วมกัน กับ  
ผู้ป่วยโรคเอดส์

ข้อที่ 13. การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด สามารถทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ด้านความรู้ทั่วไป

ลำดับ	ความรู้สึกเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.35	0.48	0.22	0.41	3.22*	
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส	0.77	0.42	0.77	0.42	0.07	
3.	เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว	0.32	0.47	0.20	0.40	3.28*	
4.	โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกราย	0.72	0.45	0.76	0.42	-1.19	
5.	ผู้ที่สำคัญทางเพศมีความเสี่ยง ต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด	0.98	0.26	0.90	0.30	1.16	
รวม		0.62	0.23	0.57	0.19	2.56*	

\* $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 6 เมื่อเปรียบเทียบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ พบร้า นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ตีกันว่า นักเรียนหญิง มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ จำานวน 2 ข้อ ดัง

ข้อ 1. โรคเอดส์ หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง

ข้อ 3. เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว

โดยนักเรียนชายมีความรู้ตีกันว่า นักเรียนหญิง

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ด้านอาการ

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วอาการที่แสดงว่า อาจเป็นโรคเอดส์ในระยะเริ่มแรก คือห้องร่างเรื้อรังและน้ำหนักลดโดยไม่สาเหตุ	0.52	0.50	0.57	0.50	-1.23	
2.	อาการผิดปกติในช่องปาก ที่เดือนว่าอาจเป็นอาการของ การติดเชื้อโรคเอดส์ คือ เป็นฝ้าข้าวในช่องปากนาน เกิน 3 เดือน	0.32	0.47	0.36	0.48	-0.81	
3.	ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์พัฒนามักเสียชีวิตเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	0.57	0.50	0.51	0.50	-1.31	
รวม		0.47	0.31	0.48	0.30	-0.38	

$p < .05$  (.05  $t = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคเอดส์อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคเอดส์ ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบร้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ด้านการติดต่อ

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	ในปัจจุบัน เชื้อเอดส์ติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ หลากหลายเลือด	0.92	0.26	0.90	0.31	1.12	
2.	นักเรียนอาจติดเชื้อโรค ได้จากการใช้ แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์	0.60	0.49	0.71	0.46	-2.53*	
3.	ของใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้ เกิดการแพร่เชื้อเอดส์ได้ คือ ที่ตัดเล็บ	0.63	0.48	0.65	0.48	-0.43	
4.	การกรายทำที่เสียงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน	0.95	0.22	0.95	0.22	0.10	
5.	การใช้ยาเสพติดชนิดเดียวกัน สามารถทำให้ติด เชื้อโรคเอดส์ได้	0.98	0.14	0.94	0.24	2.39*	
รวม		0.82	0.15	0.83	0.19	-0.68	

\* $p < .05$  ( $.05 \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 8 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคเอดส์ พบว่า นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง มีความรู้เกี่ยวกับการติดต่อของโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ คือ

ข้อ 10. นักเรียนอาจติดเชื้อโรคเอดส์ ได้จากการใช้แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วย  
โรคเอดส์ โดยนักเรียนหญิงมีความรู้ดีกว่านักเรียนชาย

ข้อ 13. การใช้ยาเสพติดชนิดเดียวกัน สามารถทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้ โดย  
นักเรียนชายมีความรู้ดีกว่านักเรียนหญิง

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ด้านการป้องกันและรักษา

ลำดับ	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		t
		(N = 240)	(N = 250)	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์ไม่มีทางรักษาให้หายแต่ช่วยให้มีอาการน้อยลง	0.79	0.41	0.79	0.41	-0.01
2.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ นอกจากตราže เลือดแล้วยัง สามารถตรวจได้จากน้ำลาย	0.10	0.31	0.09	0.28	0.61
3.	วิธีป้องกันการไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ได้ผลดีที่สุดคือ ใช้ถุงยางอนามัย	0.89	0.30	0.86	0.34	1.08
4.	การรักษาโรคเอดส์ ในปัจจุบันยาที่ใช้เพื่อหยุดยั้ง การแบ่งตัวของ ไวรัสเอดส์ ในร่างกายผู้ป่วยคือยา เอ แซด ที(A Z T) หรือ ตีดีซีที	0.13	0.34	0.11	0.31	0.86
5.	เมื่อส่วนของร่างกายนักเรียน ไปปลอมตัว เป็นกับเลือดของผู้อื่นควรล้างด้วยน้ำสบู่ โดยเรื่า	0.60	0.49	0.65	0.48	-1.00
6.	ถ้าหากนักเรียนติดเชื้อโรคเอดส์ นักเรียนจะออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้มีชีวิตที่ยืนยาว	0.75	0.43	0.77	0.42	-0.57
7.	นักเรียนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการป้องกันโรคเอดส์ คือ ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์	0.84	0.37	0.86	0.35	-0.57
รวม		0.59	0.17	0.59	0.18	-0.10

$p < .05 (.05 t = \pm 1.96)$

จากตารางที่ ๙ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ด้านการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ อยู่ในระดับพอใช้

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคเอดส์ พบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความรู้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และ เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

## ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นรายด้านทั้ง 4 ด้านระหว่างนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง

ลำดับ ที่	รายการ	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$	
		(N = 490)		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1	ด้านความรู้ทั่วไป (ข้อ 1 - 5)	0.59	0.21	0.62	0.23	0.57	0.18	2.56*	
		(พอใช้)		(ปานกลาง)		(พอใช้)			
2	ด้านอาการ (ข้อ 6 - 8)	0.47	0.31	0.47	0.31	0.48	0.30	-0.38	
		(ต้องปรับปรุง)		(ต้องปรับปรุง)		(ต้องปรับปรุง)			
3	ด้านการติดต่อ (ข้อ 9 - 13)	0.82	0.17	0.82	0.15	0.83	0.19	-0.68	
		(ตีมาก)		(ตีมาก)		(ตีมาก)			
4	ด้านการป้องกันและรักษา (ข้อ 14 - 20)	0.60	0.17	0.59	0.17	0.59	0.18	-0.10	
		(ปานกลาง)		(พอใช้)		(พอใช้)			
รวม		0.63	0.13	0.64	0.13	0.63	0.14	0.61	

\* $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 เมื่อแยกตามเพศ พบว่า ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.64 และ 0.63 ตามลำดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีความรู้อยู่ในระดับตีมาก ในด้านการติดต่อของโรคเอดส์ แต่ในด้านการป้องกันและรักษารวมทั้งด้านอาการของโรคเอดส์ นักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง และต้องปรับปรุง ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบว่า มีความรู้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำมัธยมศึกษา และนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของบิดา					
		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา		มัธยมศึกษาขึ้นไป		<i>t</i>	
		(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจาก ภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.20	0.40	0.34	0.47	-3.41*	
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส	0.75	0.44	0.79	0.61	-0.04	
3.	เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว	0.15	0.36	0.34	0.47	-5.15*	
4.	โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เพราะเป็น โรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกราย	0.75	0.45	0.76	0.43	-1.01	
5.	ผู้ที่สำคัญทางเพศมีความเสี่ยงต่อการติด โรคเอดส์มากที่สุด	0.90	0.29	0.92	0.27	-0.68	
6.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกาย แล้วอาการที่แสดงว่า อาจเป็นโรคเอดส์ ในระยะเริ่มแรก คือห้องร่างเรือรังและ น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุ	0.54	0.50	0.54	0.50	0.18	
7.	อาการผิดปกติในช่องปาก ที่เตือนว่าอาจ เป็นอาการของ การติดเชื้อโรคเอดส์ ดือ เป็นฝ้าขาวในช่องปากนาน เกิน 3 เดือน	0.31	0.46	0.37	0.48	-1.28	
8.	ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์ผู้ป่วยมักเสีย ชีวิตเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	0.45	0.50	0.61	0.49	-3.50*	

## ตารางที่ 11 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์			ระดับการศึกษาของบุคคล		<i>t</i>	
		ต่ำกว่ามัธยมตיכון มัธยมตיכוןขึ้นไป		(N = 209)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
9.	ในปัจจุบันเชื้อเอดส์ติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ และทางเลือด	0.91	0.29	0.91	0.28	-0.07	
10.	นักเรียนอาจติดเชื้อโรค ได้จากการใช้ แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์	0.71	0.46	0.61	0.49	2.14*	
11.	ของใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้ เกิดการแพร่เชื้อเอดส์ได้ คือ ที่ตัดเล็บ	0.62	0.49	0.66	0.47	-1.02	
12.	การกรายทำที่เสียงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน	0.95	0.21	0.95	0.22	0.27	
13.	การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด สามารถทำให้ติด เชื้อโรคเอดส์ได้	0.97	0.18	0.95	0.22	0.91	
14.	โรคเอดส์ไม่มีทางรักษาให้นายแต่ชลอให้ มีอาการน้อยลง	0.75	0.61	0.81	0.39	-1.68	
15.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ นอกจากราช เลือดแล้วยัง สามารถตรวจได้จากน้ำลาย	0.05	0.21	0.13	0.34	-3.35*	
16.	วิธีป้องกันการไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ได้ ผลลัพธ์ดีคือ ใช้ถุงยางอนามัย	0.90	0.30	0.86	0.34	1.17	
17.	การรักษาโรคเอดส์ ในปัจจุบันยาที่ใช้เพื่อ หยุดยั้ง การแบ่งตัวของ ไวรัสเอดส์ ใน ร่างกายผู้ป่วยคือยา เอ แซด ที(A Z T) 0.09	0.29	0.14	0.35	1.78		

## ตารางที่ 11 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของนิคติ				$t$		
		ต่ำกว่ามัธยมตיכון		มัธยมตיכוןขึ้นไป				
		(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
18.	เมื่อส่วนของร่างกายนักเรียน ไปสัมผัส เป็นกับเด็กของผู้อื่นควรล้างด้วยน้ำสบู่ โดยเร็ว			0.57	0.50	0.66	0.47	-2.07*
19.	ถ้านักเรียนติดเชื้อโรคเอดส์ นักเรียนจะ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ มีชีวิตที่ยืนยา			0.73	0.44	0.78	0.41	-1.13
20.	นักเรียนติดเชื้อไวรัสที่ต่ำสุด ในการรณรงค์ ป้องกันโรคเอดส์ ดีอ ให้ความรู้ในการ ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์			0.82	0.38	0.87	0.33	-1.48
	รวม			0.60	0.13	0.65	0.14	-3.80*

\* $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 11 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม  
ระหว่างนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่บิดามีระดับการ  
ศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ ดี  
กว่านักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นรายข้อ พบร่วมนักเรียนที่บิดามี  
ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป  
มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 6 ข้อ  
ได้แก่ ข้อ 1,3,8,10,15 และ 18

ตารางที่ 12 เปรียบเทียบความรู้ เกี่ยวกับโรค เอกซ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่ใช่ดับการศึกษาต่ำกว่าแม่ของศึกษาและนักเรียนที่มารดาไม่ใช่ดับการศึกษาตั้งแต่มีอยู่ศึกษาขึ้นไป

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการตีกษากของมารดา					
		ต่ำกว่ามัธยมตีกษา		มัธยมตีกษาขึ้นไป		<i>t</i>	
		(N = 262)	(N = 228)	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
1.	โรคเอดส์หมายถึง โรคติดต่อที่เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายเสื่อมหรือบกพร่อง	0.25	0.43	0.32	0.47	-1.67	
2.	โรคเอดส์เกิดจากเชื้อไวรัส	0.75	0.43	0.79	0.40	-1.20	
3.	เชื้อโรคเอดส์ทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว	0.22	0.42	0.30	0.46	-1.84	
4.	โรคเอดส์เป็นโรคร้ายแรง เพราะเป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายทุกราย	0.71	0.46	0.78	0.41	-1.88	
5.	ผู้ที่สำคัญทางเพศมีความเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์มากที่สุด	0.91	0.28	0.92	0.28	-0.18	
6.	หลังจากได้รับเชื้อโรคเอดส์เข้าสู่ร่างกายแล้วอาการที่แสดงว่า อาจเป็นโรคเอดส์ในระยะเริ่มแรก คือห้องร่างเรื้อรังและน้ำหนักลดโดยไม่สาเหตุ	0.57	0.50	0.51	0.50	1.33	
7.	อาการผิดปกติในช่องปาก ที่เตือนว่าอาจเป็นอาการของ การติดเชื้อโรคเอดส์ คือเป็นฝ้าขาวในช่องปากนาน เกิน 3 เดือน	0.35	0.48	0.34	0.47	0.22	
8.	ในระยะสุดท้ายของโรคเอดส์ผู้ป่วยมักเสียชีวิตเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย	0.46	0.50	0.63	0.48	-3.81*	

## ตารางที่ 12 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของมารดา					
		ต่ำกว่ามัธยมตיכון มัธยมตיכוןขึ้นไป		(N = 262)		(N = 228)	
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
9.	ในปัจจุบันเชื้อเอดส์ติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ แหล่งทางเลือก	0.90	0.30	0.92	0.27	-0.78	
10.	นักเรียนอาจติดเชื้อโรค ได้จากการใช้ แปรงสีฟันร่วมกับผู้ป่วยโรคเอดส์	0.66	0.47	0.64	0.48	0.45	
11.	ของใช้ที่ไม่ควรใช้ร่วมกัน เพราะจะทำให้ เกิดการแพร่เชื้อเอดส์ได้ คือ ห้องน้ำ เล็บ	0.61	0.49	0.67	0.47	-1.40	
12.	การกระทำที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์ คือ ใช้เข็มฉีดยาเสพติดร่วมกัน	0.95	0.22	0.95	0.21	-0.26	
13.	การใช้ยาเสพติดชนิดฉีด สามารถทำให้ติด เชื้อโรคเอดส์ได้	0.96	0.16	0.95	0.21	0.55	
14.	โรคเอดส์ไม่มีทางรักษาให้หายแต่ชลอให้ มีอาการน้อยลง	0.77	0.42	0.80	0.40	-0.75	
15.	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ นอกจากตรวจ เลือดแล้วยัง สามารถตรวจได้จากน้ำลาย	0.07	0.27	0.12	0.32	-1.56	
16.	วิธีป้องกันการไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ ที่ได้ ผลลัพธ์คือ ใช้ถุงยางอนามัย	0.88	0.32	0.88	0.33	0.15	
17.	การรักษาโรคเอดส์ในปัจจุบันยาที่ใช้เพื่อ หยุดยั้ง การแบ่งตัวของ ไวรัสเอดส์ใน ร่างกายผู้ป่วยคือยาเอด ชาต ที(A Z T) 0.13 0.34	0.11	0.31	0.68			

## ตารางที่ 12 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของมารดา			
		ต่ำกว่ามัธยมตיכון		มัธยมตיכוןขึ้นไป	
		(N = 262)	(N = 228)	$\bar{X}$	SD
18.	เมื่อส่วนของร่างกายนักเรียน ไปสัมผัส เป็นกับเสื้อของผู้อื่นควรล้างด้วยน้ำสบู่ โดยเร้า			0.61	0.49
19.	ถ้านักเรียนติดเชื้อโรคเอดส์ นักเรียนจะ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อให้ มีชีวิตที่ยืนยา			0.65	0.48
20.	นักเรียนคิดว่าวิธีที่ดีที่สุด ในการบรรรค ป้องกันโรคเอดส์ คือ ให้ความรู้ในการ ป้องกันตนเองจากโรคเอดส์			-0.96	
				0.77	0.42
				-0.52	
				0.84	0.37
				0.86	0.34
				-0.75	
รวม		0.62	0.14	0.65	0.63
					-2.29*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 12 เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม  
ระหว่างนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดา มีระดับ  
การศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  
.05 โดยนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับโรค  
เอดส์ ต่ำกว่านักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון

เมื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ เป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนที่มารดา  
มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכון  
ขึ้นไป มีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน  
1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 8

ตอนที่ ๓ ทัศนคติ และการเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้วิจัยトラจaiให้คะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นำมาหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนตามตัวแปร เพศ ระดับการศึกษาของบิดา และระดับการศึกษาของมารดา โดยการทดสอบค่า "ที" (t-test) ทั้งโดยส่วนรวมและเป็นรายข้อ ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังตารางที่ ๑๓ - ๒๖

ตารางที่ ๑๓ จำนวน และค่าร้อยละ ของระดับคะแนนทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

เกณฑ์ระดับทัศนคติ ของนักเรียน	ค่าเฉลี่ย	นักเรียนทั้งหมด		นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง	
		(N = 490)	(N = 240)	(N = 250)	(N = 240)	(N = 100)	(N = 100)
ตีมาก	4.50 - 5.00	9	1.8	2	0.8	7	2.8
ดี	3.50 - 4.49	344	70.2	174	72.3	170	68.0
ปานกลาง	2.50 - 3.49	136	27.8	63	26.3	73	29.2
พอใช้	1.50 - 2.49	1	0.2	1	0.4	-	-
ต้องแก้ไข	1.00 - 1.49	-	-	-	-	-	-
รวม		490	100	240	100	250	100

จากตารางที่ ๑๓ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.2 มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับดี รองลงมา ร้อยละ 27.8 มีทัศนคติอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบว่า ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงส่วนใหญ่มีทัศนคติอยู่ในระดับดี คือ ร้อยละ 72.3 และ 68.0 ตามลำดับ รองลงมา อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 26.3 และร้อยละ 29.2

ตารางที่ 14 ตารางแสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนชั้นป্রถดติํกชั้นที่ 6 ค้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ลำดับ ที่	ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนทั้งหมด (N = 490)									
		เห็นด้วย		เห็นด้วย อย่างยิ่ง		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย มากที่สุด	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(+).1.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่										
	นำกล้ามทั่วสุขในปัจจุบัน	357	72.9	108	22.0	16	3.3	5	1.0	4	0.8
(+).2.	นักเรียนสามารถช่วยป้องกัน										
	การแพร่กระจาย ของโรค										
	เอดส์ได้	71	14.5	173	35.3	221	43.1	19	3.9	16	3.3
(-).3.	โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคม										
	รังเกียจ	87	17.8	142	29.0	116	23.7	107	31.8	38	7.8
(+).4.	การทำเล็บ หรือโภนหนาที่										
	ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยง										
	ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์	130	26.5	217	44.3	102	20.8	26	5.3	15	3.1
(-).5.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควร										
	ให้ออกจากโรงเรียน	29	5.9	42	8.6	112	22.9	191	39.0	116	23.7
(+).6.	บุคลากร เพศทุกประเภท										
	เสี่ยงต่อ โรคเอดส์ได้										
	เท่าๆ กัน	179	36.5	170	34.7	99	20.2	22	5.7	14	2.9
(+).7.	ผู้ที่เป็นโรคเอดส์เป็นผู้ที่น่า										
	สงสารและควรได้รับความ										
	เห็นใจ	283	57.8	141	28.8	38	7.8	14	2.9	14	2.9
(-).8.	นักเรียนรังเกียจ จะไปมา										
	หากลูกบุคคลที่เป็นโรคเอดส์	22	4.5	49	10.0	165	33.8	145	29.6	109	22.2

ตารางที่ 14 (ต่อ)

นักเรียนทั้งหมด (N = 490)

คำอธิบาย ที่ ที่	หัวข้อคิดเห็น	เห็นด้วย		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-) 9.	พัฒนาเชื้อเพลิงเป็นพากท์กำ										
	ให้สังคมว่าราย	31	6.3	84	17.1	154	31.4	164	33.5	57	11.6
(-) 10.	การจับผิดเชื้อเพลิงไปกักกัน										
	ไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี	57	11.6	122	24.9	117	23.9	117	23.9	77	15.7
(-) 11.	นักเรียนไม่อยากรับประทาน										
	อาหารร่วมกับผิดเชื้อเพลิง	65	13.3	92	18.8	181	36.9	115	23.5	37	7.6
(-) 12.	การติดโรคเพลิง เป็นเรื่อง										
	ของเคราะห์กรรม	27	5.5	47	9.6	115	23.5	163	33.3	138	28.2
(+) 13.	ผู้ป่วยโรคเพลิงอาจหายอยู่										
	กับครอบครัวได้	142	29.0	193	39.4	114	23.3	25	5.1	16	3.3
(-) 14.	นักเรียนอาจได้รับ เชื้อโรค										
	เพลิงสักวันหนึ่ง	38	7.8	89	18.2	240	49.0	56	11.4	67	13.7
(+) 15.	นักเรียนที่มี เชื้อโรคเพลิง										
	สามารถแพร่กระจายเชื้อไป										
	สู่เพื่อนได้	68	13.9	118	24.1	160	32.7	90	18.4	54	11.0
(+) 16.	ผู้ติดยาเสพติด ชนิดเดิม										
	โอกาสติดโรคเพลิงได้	347	70.8	103	21.0	21	4.3	10	2.0	9	1.8
(-) 17.	นักเรียนที่ติดเชื้อเพลิงควร										
	เรียนในโรงเรียนพิเศษ										
	แยกออกจากนักเรียนทั่วไป	40	8.2	72	14.7	140	28.6	162	33.1	76	15.5

## ตารางที่ 14 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ เกี่ยวกับโรคเอดส์	อั้นราย เข้าใกล้	นักเรียนทั้งหมด (N = 490)									
			เห็นด้วย		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-) 18.	ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคล อันตราย นักเรียนไม่กล้า											
		เข้าใกล้	30	6.1	66	13.5	135	27.3	163	33.3	99	19.6
(+) 19.	ควรจัดให้มีการเรียนการ สอนเรื่องโรคเอดส์ในรายวัน											
		เข้าประจำ	372	75.9	99	20.2	12	2.4	3	0.6	4	0.8
(+) 20.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้											
		เข้าใกล้	282	43.3	208	42.4	58	11.8	7	1.4	5	1.0

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชั้นปฐมศึกษาปี ๖ ส่วนใหญ่มีหัวข้อ  
ที่ติดเชื้อเอดส์ โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อที่ว่า ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง  
โรคเอดส์ในรายวันประจำ ร้อยละ 75.9 รองลงมาคือโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัว  
ที่สุดในปัจจุบัน ร้อยละ 72.9 และผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นภัย对自己 ร้อยละ 70.8  
และยังมีนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับหัวข้อทางลบในข้อที่ว่า โรคเอดส์เป็น  
โรคที่สังคมรังเกียจ คิดเป็นร้อยละ 46.8 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 17.8 และเห็นด้วย  
ร้อยละ 29.0) การรับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปักกันไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งที่ ร้อยละ 36.5 (เห็น  
ด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 11.6 และเห็นด้วย ร้อยละ 24.9) นักเรียนไม่อยากรับประทาน  
อาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 32.1 (เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 13.3 และเห็นด้วย  
ร้อยละ 18.8) และนักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษ แยกออกจาก  
นักเรียนทั่วไป ร้อยละ 22.9 (เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 8.2 และเห็นด้วยร้อยละ 14.7)

ตารางที่ 15 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

ลำดับ ที่	ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย (N = 240)											
		เห็นด้วย อย่างยิ่ง		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย อย่างหง			
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%		
(+) 1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่													
	ผ่านกล้าที่สุดในปัจจุบัน	164	68.3	60	25.0	8	3.3	4	1.7	4	1.7		
(+) 2. นักเรียนสามารถช่วยป้องกัน													
	การแพร่ระบาด ของโรค												
	เอดส์ได้	37	15.4	77	32.1	109	45.4	8	3.3	9	3.8		
(-) 3. โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคม													
	รังเกียจ	50	20.8	64	20.7	61	25.4	45	18.8	20	8.3		
(+) 4. การทำเล็บ หรือโกนหนวดที่													
	ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยง												
	ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์	53	22.1	106	42.2	58	24.2	14	5.8	9	3.8		
(-) 5. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควร													
	ให้ออกจากโรงเรียน	15	6.3	21	8.8	45	18.8	103	42.9	56	23.3		
(+/-) 6. บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาส													
	เสี่ยงต่อ โรคเอดส์ได้												
	เท่าๆ กัน	89	37.1	88	36.7	44	18.3	10	4.2	9	3.8		
(-) 7. ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ เป็นผู้ที่น่า													
	สงสาร ควรได้รับความ												
	เห็นใจ	144	60.0	69	28.8	15	6.3	9	3.8	3	1.3		
(-) 8. นักเรียนรังเกียจ ชอบ													
	หลีกเลี่ยงบุคคลที่เป็นโรคเอดส์	12	5.0	25	10.4	82	34.2	71	29.6	50	20.8		

ตารางที่ 15 (ต่อ)

ผู้ติดเชื้อ ( $N = 240$ )

## ตารางที่ 15 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวสังคัด เกี่ยวกับโรคเอดส์	อั้นตราย นักเรียนไม่กล้า เข้าใกล้	นักเรียนชาย (N = 240)									
			เห็นด้วย		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-)18.	ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคล											
	อันตราย นักเรียนไม่กล้า											
	เข้าใกล้	11	4.6	35	14.6	69	28.8	78	32.5	47	19.6	
(+)19.	ควรจัดให้มี การเรียนการ											
	สอนเรื่องโรคเอดส์ในระดับ											
	ชั้นประถมศึกษา	178	70.2	52	21.7	6	2.5	2	0.8	2	0.8	
(+)20.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ											
	ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้	106	44.2	97	40.4	30	12.5	3	1.3	4	1.7	

จากตารางที่ 15 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชายส่วนใหญ่มีหัวสังคัดที่ติดเชื้อโรคเอดส์โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งในข้อที่ว่า ผู้ติดยาเสพติดชนิดเดียวโอกาสติดโรคเอดส์ได้ ร้อยละ 74.6 รองลงมาคือ ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 70.2 และโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน ร้อยละ 68.3 แต่มีนักเรียนชายอีกส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับหัวสังคัดทางลบในข้อที่ว่าโรคเอดส์เป็นโรคที่ลังเลรังเกียจ ร้อยละ 41.5 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 20.8 และเห็นด้วยร้อยละ 20.7) นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 32.9 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 12.5 และเห็นด้วยร้อยละ 20.4) การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปภักภัณไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี ร้อยละ 32.4 (เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 11.3 และเห็นด้วยร้อยละ 27.1) และนักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษแยกออกจากนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 24.6 (เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 8.3 และเห็นด้วย ร้อยละ 16.3)

ตารางที่ 16 ตารางแสดงจำนวนร้อยละ ของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์

นักเรียนหญิง (N = 250)

ลำดับ ที่	ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์	เห็นด้วย		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		ผล่างหัว
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
(+)1.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่นำกล้าที่สุดในปัจจุบัน	193	77.2	48	19.2	8	3.2	1	0.4	-	-	
(+)2.	นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคเอดส์ได้	34	13.6	96	38.4	102	40.8	11	4.4	7	2.8	
(-)3.	โรคเอดส์เป็นโรคที่ลังเล	37	14.8	78	31.2	55	22.0	62	24.8	18	7.2	
(+)4.	การทำเล็บ หรือโกนหนวดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	77	30.8	111	44.4	44	17.6	12	4.8	6	2.4	
(-)5.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออกจากโรงเรียน	14	5.6	21	8.4	67	26.8	88	35.2	60	24.0	
(+)6.	บุคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อ โรคเอดส์ได้เท่าๆ กัน	90	36.0	82	32.8	55	22.0	18	7.2	5	2.0	
(+)7.	ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ เป็นผู้ที่น่าสงสารและควรได้รับความเห็นใจ	139	55.6	72	28.8	23	9.2	5	2.0	11	4.4	
(-)8.	นักเรียนรังเกียจ จะไปมาหาสู่กับบุคคลที่เป็นโรคเอดส์	10	4.0	24	9.6	83	33.2	74	29.6	59	23.6	

## ตารางที่ 16 (ต่อ)

นักเรียนหญิง (N = 240)

ลำดับ ที่	หัวนคติ เกี่ยวกับโรคเอดส์	อั้งเชิง	เห็นด้วย		เห็นด้วย		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
			N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(+) 9. พื้ตติดเชื้อเอดส์เป็นพากที่ทำให้สังคมวุ่นวาย												
			18	7.2	39	15.6	84	33.6	82	32.8	27	10.8
(+) 10. การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้เพื่อรักษาเป็นลึ้งดี												
			30	12.0	57	22.8	62	24.8	66	26.4	35	14.0
(+) 11. นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์												
			35	14.0	43	17.2	90	36.0	59	23.4	23	9.2
(+) 12. การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของเคราะห์กรรม												
			9	3.6	27	10.8	66	26.4	80	32.0	68	27.2
(+) 13. ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจขาดอ่ายอยู่กับครอบครัวได้												
			67	26.8	102	40.8	59	23.6	15	6.0	7	2.8
(+) 14. นักเรียนอาจได้รับ เชื้อโรคเอดส์สักกันหนึ่ง												
			20	8.0	39	15.6	126	50.4	34	13.6	31	12.4
(+) 15. นักเรียนเหมือน เชื้อโรคเอดส์สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้												
			35	14.0	52	20.8	94	37.6	44	17.6	25	10.0
(+) 16. พื้ตติดยาเสพติด ชนิดเดิม												
			168	62.2	58	23.2	13	5.2	4	1.6	7	2.8
(+) 17. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียน ในโรงเรียนพัฒนา												
			20	8.0	33	13.2	76	30.4	83	33.2	78	15.2

ตารางที่ 16 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนหญิง (N = 240)									
		เห็นด้วย		เห็นด้วย อย่างยิ่ง		ไม่แน่ใจ		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย อย่างยิ่ง	
		N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
(-) 18.	ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคล อันตราย นักเรียนไม่กล้า เข้าใกล้	19	7.6	31	12.4	66	26.4	85	34.0	499	19.6
(+) 19.	ควรจัดให้มี การเรียนการ สอนเรื่องโรคเอดส์ในระดับ ประถมศึกษา	194	77.6	47	18.8	6	2.4	1	0.4	2	0.8
(+) 20.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้	106	42.4	111	44.4	28	11.2	4	1.6	1	0.4

จากตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ มีหัวข้อที่ติดเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อที่ว่า ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 77.6 รองลงมาคือ โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน ร้อยละ 77.2 และผู้ติดยาเสพติดชนิดฉีดมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้ ร้อยละ 62.2 และมีนักเรียนหญิงอีกส่วนหนึ่งที่เห็นด้วยกับหัวข้อที่ทางลบในข้อที่ว่า โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ ร้อยละ 46.0 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 14.8 เห็นด้วย ร้อยละ 31.2) การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปภักภัณไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งที่ ร้อยละ 34.8 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 12.0 เห็นด้วย ร้อยละ 22.8) นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ ร้อยละ 31.2 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 14.0 เห็นด้วย ร้อยละ 17.2) และนักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษแยกออกจากนักเรียนทั่วไป ร้อยละ 21.2 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ 8.0 เห็นด้วย ร้อยละ 13.2)

ตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนทั้งหมด	
		(N = 490)	X SD
(+)	1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.65	0.67
(+)	2. นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้	3.54	0.92
(-)	3. โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังสiegaya	2.73	1.21
(+)	4. การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.86	0.97
(-)	5. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรให้ออกจากโรงเรียน	3.66	1.11
(+)	6. บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.96	1.03
(+)	7. ผู้ที่เป็นโรคเอดส์เป็นผู้ที่น่าสงสารและควรได้รับความเห็นใจ	4.36	0.95
(-)	8. นักเรียนรังสiegaya ไปมาหาสู่ กับบุคคลที่เป็นโรคเอดส์	3.55	1.08
(-)	9. ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์เป็นพากที่ ทำให้สังคมวุ่นวาย	3.27	1.07
(-)	10. การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้ เพื่อรักษาเป็นสิ่งเดียว	3.07	1.26
(-)	11. นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.93	1.12
(-)	12. การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของเคราะห์กรรม	3.69	1.14
(+)	13. ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจอาศัยอยู่กับครอบครัวได้	3.86	1.00

## ตารางที่ 17 (ต่อ)

ลำดับ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนทั้งหมด	
		(N = 490)	X SD
(-) 14.	นักเรียนอาจได้รับเชื้อโรคเอดส์สักวันหนึ่ง	3.05	1.07
(+) 15.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์สามารถ แพร่กระจาย เชื้อไปสู่เพื่อนได้	3.11	1.19
(+) 16.	ผู้ติดยาเสพติดชนิดเดิมมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้	4.57	0.82
(-) 17.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษ แยกออกจากนักเรียนทั่วไป	3.33	0.15
(-) 18.	ผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นบุคคลอันตราย นักเรียนไม่กล้า เข้าใกล้	3.47	1.13
(+) 19.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องโรคเอดส์ ใน ระดับประถมศึกษา	4.70	0.63
(+) 20.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์ เท่าที่ทำได้	4.25	0.80
รวม		3.68	0.38

- (+) หมายถึง ทัศนคติทางบวก  
(-) หมายถึง ทัศนคติทางลบ

จากตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวมอยู่ในระดับบวก โดยมีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติเท่ากับ 3.68 (จากค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ระหว่าง 4.50 - 5.00 ค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ระหว่าง 1.00 - 1.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในระดับ

ตีมาก จำนวน 3 ช้อ ได้แก่ ช้อ 1,16 และ 19 อยู่ในระดับตี จำนวน 9 ทีก ได้แก่ ช้อ 2,4,5,6,7,8,12 ,13 และ 20 อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 8 ช้อ ได้แก่ ช้อ 3,9, 10,11,14,15,17 และ 18 และไม่มีช้อใดที่นักเรียนมีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ อยู่ในระดับพอใจและต้องปรับปรุง



## ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 18 เปรียบเทียบหัตคนดติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นปีชุดที่ 6  
ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ลำดับ	หัตคนดติ เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		<i>t</i>	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
(+)	1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัว						
	ที่สุดในปัจจุบัน	4.57	0.72	4.73	0.53	-2.72*	
(+)	2. นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการ						
	แพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้	3.52	0.90	3.56	0.88	-0.43	
(-)	3. โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.67	1.23	2.78	1.18	-1.04	
(+)	4. การทำเล็บ หรือโภนหนาที่ร้าน						
	เสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด						
	โรคเอดส์	3.75	0.99	3.96	0.95	-2.45*	
(-)	5. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออก						
	จากโรงเรียน	3.68	1.11	3.64	1.10	0.47	
(+)	6. บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อ						
	โรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.99	1.03	3.94	1.02	0.60	
(+)	7. ผู้ที่เป็นโรคเอดส์เป็นผู้ที่น่าสงสาร						
	และควรได้รับความเห็นใจ	4.42	0.86	4.29	1.02	1.56	
(-)	8. นักเรียนรังเกียจจะไปมาหาสู่ กับ						
	บุคคลที่เป็นโรคเอดส์	3.51	1.08	3.59	1.07	-0.86	
(-)	9. ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นพวกที่ทำให้						
	สังคมวุ่นวาย	3.29	1.08	3.24	1.07	0.53	
(-)	10. การขับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้						
	เพื่อรักษาเป็นสิ่งต้อง	3.06	1.28	3.07	1.24	-0.08	

## ตารางที่ 18 (ต่อ)

ลำดับ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		<i>t</i>
		<u>(N = 240)</u>	<u><math>\bar{X}</math></u>	<u>SD</u>	<u>(N = 250)</u>	
(-)11.	นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหารร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์		2.89	1.08	2.97	1.15 -0.71
(-)12.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของเคราะห์กรรม		3.69	1.19	3.68	1.09 0.11
(+)13.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจอาเจียน อยู่กับครอบครัวได้		3.89	1.01	3.83	0.98 0.66
(-)14.	นักเรียนอาจได้ รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง		3.03	1.09	3.07	1.05 -0.36
(+)15.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์ สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้		3.12	1.22	3.11	1.16 0.04
(+)16.	ผู้ติดยาเสพติด ชนิดเดียวมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้		4.64	0.74	4.50	0.88 1.81
(-)17.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษแยกออกจากนักเรียนทั่วไป		3.32	1.17	3.34	1.13 -0.26
(-)18.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคลอันตราย นักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้		3.48	1.10	3.46	1.16 0.23
(+)19.	ควรจัดให้มี การเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ ในรายตับประถมศึกษา		4.67	0.65	4.72	0.60 0.79

## ตารางที่ 18 (ต่อ)

สำดับ	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$	
		(N = 240)		(N = 250)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
(+)	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้	4.24	0.84	4.26	0.75	-0.37	
(-)	ราม	3.67	0.37	3.68	0.39	-0.44	

\* $p < .05$  ( $.05t = \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง ทัศนคติทางบวก

(-) หมายถึง ทัศนคติทางลบ

จากตารางที่ 18 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง พบร้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์เป็นรายข้อ พบร้า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่

ข้อ 1. โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน

ข้อ 4. การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ร้านเสริมสวย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบหัวหน้าศูนย์กับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นปีที่ 6  
ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในด้านหัวหน้าศูนย์ทางบวก

ลำดับ ที่	หัวหน้าศูนย์ทางบวก เกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		<i>t</i>
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุด ในปัจจุบัน	4.57	0.72	4.73	0.53	-2.72*
2.	นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ กระจายของโรคเอดส์ได้	3.52	0.92	3.56	0.88	-0.43
3.	การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ร้าน เสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคเอดส์	3.75	0.99	3.96	0.95	-2.45*
4.	บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อ โรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.99	1.03	3.94	1.02	0.60
5.	ผู้ที่เป็นโรคเอดส์เป็นผู้ที่น่าสงสาร และการได้รับความเห็นใจ	4.42	0.86	4.29	1.02	1.56
6.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจหายด้วย ครอบครัวได้	3.89	1.01	3.83	0.98	0.66
7.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์ สามารถ แพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้	3.12	1.22	3.11	1.16	0.04
8.	ผู้ติดยาเสพติด ชนิดเดียวมีโอกาสติด โรคเอดส์ได้	4.64	0.74	4.50	0.88	1.81

## ตารางที่ 19 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
9.	การจัดให้มี การเรียนการสอนเรื่อง					
	โรคเอดส์ ในรายตัวประดุจศึกษา	4.67	0.65	4.72	0.60	0.79
10.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย					
	โรคเอดส์เท่าที่ทำได้	4.24	0.84	4.26	0.75	-0.37
	รวม	4.08	0.38	4.09	0.39	-0.28

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = +1.96$ )

จากตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์อยู่ในเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติเท่ากับ 4.08 และ 4.09 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม พบว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางบวก ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางบวกเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ 3

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 20 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียน ชั้นประถมปีที่ 6  
ระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ในด้านทัศนคติทางลบ

ลำดับ ที่	ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.67	1.23	2.78	1.18	-1.04
2.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออก จากโรงเรียน	3.68	1.11	3.64	1.10	0.47
3.	นักเรียนรังเกียจจะไปมาหาสู่ กับ บุคคลที่เป็นโรคเอดส์	3.51	1.08	3.59	1.07	-0.86
4.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นพากที่ทำให้ สังคมวุ่นวาย	3.29	1.08	3.24	1.07	0.53
5.	การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้ เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี	3.06	1.28	3.07	1.24	-0.08
6.	นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.89	1.08	2.97	1.15	-0.71
7.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของ เคราะห์กรรม	3.69	1.19	3.68	1.09	0.11
8.	นักเรียนอาจได้ รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง	3.03	1.09	3.07	1.05	-0.36

## ตารางที่ 20 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์	นักเรียนชาย		นักเรียนหญิง		$t$	
		( $N = 240$ )	$\bar{X}$	( $N = 250$ )	$\bar{X}$		
9.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษแยกออกจากนักเรียนทั่วไป		3.32	1.17	3.34	1.13	-0.26
10.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคลอันตราย		3.48	1.10	3.46	1.16	0.23
	นักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้						
	รวม		3.26	0.59	3.28	0.62	-0.38

$p < .05$  ( $.05 t_{\text{crit}} = +1.96$ )

จากตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ทั้งนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของระดับทัศนคติเท่ากับ 3.26 และ 3.28

เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม พบร่วมนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางลบ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบร่วมนักเรียนชาย และนักเรียนหญิงมีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

ตารางที่ 21 เปรียบเทียบหัตคนดิเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นป्रนมศึกษาปีที่ ๖ ระหว่างนักเรียนที่บิดา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาและนักเรียนที่บิดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป

ระดับการศึกษาของบิดา

ลำดับที่	หัตคนดิเกี่ยวกับโรคเอดส์	ต่ำกว่ามัธยมศึกษา		มัธยมศึกษาขึ้นไป		$t$
		(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD	
(+)	1. โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.65	0.62	4.65	0.71	-0.15
(+)	2. นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคเอดส์ได้	3.53	0.91	3.55	0.89	-0.26
(-)	3. โรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.66	1.22	2.78	1.20	-1.08
(+)	4. การทำเล็บ หรือโภชนาดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.86	0.91	3.86	1.02	0.04
(-)	5. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออกจากโรงเรียน	3.53	1.13	3.76	1.08	-2.30*
(+)	6. บุคคลทุกเพศทุกวัย มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.90	1.07	4.01	0.99	-1.10
(+)	7. ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ เป็นผู้ที่น่าสงสารและควรได้รับ ความเห็นใจ	4.30	0.94	4.40	0.95	-1.12

## ตารางที่ 21 (ต่อ)

ลำดับที่	หัวนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	รชาดับการศึกษาของบุคคล					
		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๗		t	
	(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
<hr/>							
(-) 8.	นักเรียนรังเกียจจะไปมาหาสู่กับบุคคลที่เป็น โรคเอดส์	3.50	1.00	3.59	1.13	-0.94	
(-) 9.	ผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นพวกที่ทำให้สังคมวุ่นวาย	3.18	1.05	3.33	1.09	-1.56	
(-) 10.	การรับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปักกันไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งต้อง	2.75	1.25	3.31	1.21	-5.06*	
(-) 11.	นักเรียน ไม่อยากรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.97	1.11	2.90	1.13	0.66	
(-) 12.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของเคราะห์กรรม	3.58	1.13	3.77	1.15	-1.86	
(+) 13.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจอาเจียน อยู่กับครอบครัวได้	3.77	0.98	3.92	1.02	-1.57	
(-) 14.	นักเรียนอาจได้รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง	2.98	1.02	3.10	1.11	-1.25	
(+) 15.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์สามารถแพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้	4.53	0.80	4.59	0.84	-0.78	
(+) 16.	ผู้ติดยาเสพติดชนิดเดียวมีโอกาสติดโรคเอดส์ได้	3.26	1.20	3.38	1.11	-1.20	

## ตารางที่ 21 (ต่อ)

ลำดับที่	หัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของบิดา		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาขั้นไป		$t$		
		(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD			
<hr/>								
(-) 17.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียน ในโรงเรียนพิเศษ แยกออกจาก นักเรียนทั่วไป			3.26	1.20	3.38	1.11	-1.20
(-) 18.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคลอันตราย นักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้			3.39	1.15	3.52	1.11	-1.27
(+) 19.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ ในระดับประถมศึกษา	4.72	0.55	4.68	0.68	0.62		
(+) 20.	นักเรียน ควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้	4.28	0.71	4.23	0.86	0.67		
<hr/>								
รวม				3.62	0.38	3.72	0.38	-2.93*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = +1.96$ )

(+) หมายถึง หัวหน้าศูนย์ฯทางบาก

(-) หมายถึง หัวหน้าศูนย์ฯทางลบ

จากตารางที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบหัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม  
ระหว่างนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา กับนักเรียนที่บิดามีระดับการ  
ศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขั้นไป พบร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05  
เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบร่วม นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยม  
ศึกษา กับนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขั้นไป มีหัวหน้าศูนย์ฯ เกี่ยวกับโรคเอดส์

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 และ 10 โดยนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป มีทัศนคติถึกว่า 'นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่า' มากกว่า 'มัธยมศึกษา'



ตารางที่ 22 เปรียบเทียบหัตถศดติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นปีชุดที่ 6  
ระหว่างนักเรียนที่บิดา มีรชดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาและนักเรียนที่  
บิดา มีรชดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป ด้านนาก

ลำดับ ที่	หัตถศดติทางนาก เกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของบิดา				t	
		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นไป		(N = 209)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	โรคเอดส์เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุด ในปัจจุบัน	4.65	0.62	4.65	0.71	-0.15	
2.	นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ กระจายของโรคเอดส์ได้	3.53	0.91	3.55	0.89	-0.26	
3.	การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ร้าน เสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิด โรคเอดส์	3.86	0.91	3.86	1.02	0.04	
4.	บุคคลทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงต่อ โรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.90	1.07	4.01	0.99	-1.10	
5.	ผู้ที่เป็นโรคเอดส์เป็นผู้ที่น่าสงสาร แล้วครารได้รับความเห็นใจ	4.30	0.94	4.40	0.95	-1.12	
6.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจอาการ อยู่กับครอบครัวได้	3.77	0.98	3.92	1.02	-1.57	
7.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์ สามารถ แพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้	3.10	1.12	3.12	1.24	-0.14	
8.	ผู้ติดยาเสพติด ชนิดเดียวมีโอกาสติด โรคเอดส์ได้	4.53	0.80	4.59	0.84	-0.78	

## ตารางที่ 22 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระดับการศึกษาของบุคคล					
		สำหรับนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכוןขึ้นไป		สำหรับนักเรียนที่มีระดับการศึกษาน้อยกว่ามัธยมตיכון		$t$	
		(N = 209)	(N = 281)	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
9.	ควรจัดให้มี การเรียนการสอนเรื่อง						
	โรคเอดส์ ในระดับประถมศึกษา	4.72	0.55	4.68	0.68	0.62	
10.	นักเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วย						
	โรคเอดส์เท่าที่ทำได้	4.28	0.71	4.23	0.86	0.67	
	รวม	4.06	0.38	4.10	0.69	-1.02	

$p < .05 \quad (.05 t_{\infty} = +1.96)$

จากตารางที่ 22 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบางเกี้ยวกับโรคเอดส์ ระหว่างนักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมตיכוןขึ้นไป โดยส่วนรวม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมติกษา กับนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมตיכוןขึ้นไป มีทัศนคติทางบางเกี้ยวกับโรคเอดส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 23 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่บิดา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาและนักเรียนที่บิดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป ด้านลับ

ลำดับ ที่	ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของบิดา					
		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นไป		(N = 209)		(N = 281)	
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
1.	โรคเอดส์เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.66	1.22	2.78	1.20	-1.08	
2.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออก จากโรงเรียน	3.53	1.13	3.76	1.08	-2.30*	
3.	นักเรียนรังเกียจจะไปมาหาสู่ กับ บุคคลที่เป็นโรคเอดส์	3.50	1.00	3.59	1.13	-0.94	
4.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นพากที่ทำให้ สังคมวุ่นวาย	3.18	1.05	3.33	1.09	-1.56	
5.	การรับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปักกันไว้ เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี	2.75	1.25	3.31	1.21	-5.06*	
6.	นักเรียนไม่อยากรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.97	1.11	2.90	1.13	0.66	
7.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของ เคราะห์กรรม	3.58	1.13	3.77	1.15	-1.86	
8.	นักเรียนอาจได้ รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง	2.98	1.02	3.10	1.11	-1.25	

## ตารางที่ 23 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของบิดา		$t$	
		(N = 209)	(N = 281)		
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD
9.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ควรเรียนในโรงเรียนพิเศษแยกออกจากนักเรียนทั่วไป	3.26	1.20	3.38	1.11 -1.20
10.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นบุคคลอันตรายนักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้	3.39	1.15	3.52	1.11 -1.27
	รวม	3.18	0.61	3.35	0.59 -3.06*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์โดยส่วนรวม ระหว่างนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา กับนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป พบร่วม มีทัศนคติทางลบ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่บิดามีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป มีทัศนคติทางลบต่ำกว่า นักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบร่วม นักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา กับนักเรียนที่บิดามีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป มีทัศนคติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 และ 10 โดยนักเรียนที่บิดามีการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป มีทัศนคติทางลบต่ำกว่า นักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษา

ตารางที่ 24 เปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มาตรา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון และนักเรียนที่ มาตรา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป

ลำดับ ที่	ทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	ระดับการศึกษาของมาตรา		ต่ำกว่ามัธยมตיכון มัธยมตיכוןขึ้นไป		$t$	
		(N = 262)		(N = 228)			
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
(+)	1. โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	4.65	0.66	4.65	0.69	-0.08	
(+)	2. นักเรียนสามารถช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคเอดส์ได้	3.51	0.95	3.56	0.84	-0.62	
(-)	3. โรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.69	1.19	2.78	1.22	-0.82	
(+)	4. การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์	3.84	1.01	3.88	0.93	-0.48	
(-)	5. นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออกจากโรงเรียน	3.64	1.10	3.68	1.11	-0.38	
(+)	6. บุคคลทุกเพศทุกวัย มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.99	1.11	4.03	0.992	-1.37	
(+)	7. ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ เป็นผู้ที่น่าสงสารและควรได้รับ ความเห็นใจ	4.31	0.97	4.41	0.93	-1.10	

## ตารางที่ 24 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ ที่ศึกษา	ระดับการศึกษาของมารดา		ตัวแปรตามศึกษา มัธยมศึกษาชั้นปี (N = 262)		t
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD	
(-) 8.	นักเรียนรังเกียจจะไปมาหาสู่ กับบุคคลที่เป็น โรคเอดส์	3.48	1.08	3.64	1.07	-1.63
(-) 9.	ผู้ติดเชื้อเอดส์เป็นพากที่ทำ ให้ลังเลว่าราย	3.21	1.10	3.34	1.04	-1.31
(-) 10.	การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้ เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี	2.87	1.29	3.30	1.18	-3.85*
(-) 11.	นักเรียน ไม่อยากรับประทาน อาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.91	1.11	2.96	1.13	-0.51
(-) 12.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของ เคราะห์กรรม	3.64	1.12	3.75	1.16	-1.09
(+) 13.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจอาศัยอยู่กับ ครอบครัวได้	3.83	1.01	3.89	0.99	-0.68
(-) 14.	นักเรียนอาจได้รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง	3.06	1.09	3.04	1.05	0.22
(+) 15.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์สามารถ แพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้	3.15	1.19	3.07	1.19	0.69
(+) 16.	ผู้ติดยาเสพติดชนิดเดี้ยมมีโอกาสติด โรคเอดส์ได้	4.54	0.83	4.60	0.81	-0.79

ตารางที่ 24 (ต่อ)

ลำดับ ที่	หัวข้อ	ระดับการศึกษาของมารดา					
		ต่ำกว่ามัธยมตיכון มัธยมตיכוןขึ้นไป		(N = 262)		(N = 228)	
		$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
(-) 17.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอ็คส์かるเรียน ในโรงเรียนพิเศษ แยกออกจาก นักเรียนท้าไป	3.26	1.22	3.41	1.05	-1.49	
(-) 18.	ผู้ที่ติดเชื้อเอ็คส์เป็นบุคคลอันตราย นักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้	3.37	1.94	3.58	1.12	-2.12*	
(+) 19.	ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง โรคเอดส์ ในระดับประถมศึกษา	4.71	0.57	4.68	0.69	0.59	
(+) 20.	นักเรียน ควรให้ความช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้	4.22	0.78	4.29	0.82	-0.89	
รวม		3.64	0.38	3.73	0.38	-2.55*	

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

(+) หมายถึง หัวหน้าครัวบ้าน

(-) หมายถึง หัวหน้าครัวบ้านลพบุรี

จากตารางที่ 24 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม  
ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดา มีระดับ  
การศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป พบร่วม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
โดยนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีหัวหน้าครัวบ้าน

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบว่า ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่รับการติเกษากำกว่ามัธยมติเกษา กับนักเรียนที่มารดาไม่รับการติเกษากั้งแต่มัธยมติเกษาขึ้นไป มีทัศนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 10 และ 18 โดยนักเรียนหญิงที่มารดาไม่รับการติเกษากั้งแต่มัธยมติเกษามีทัศนคติถือว่านักเรียนที่มารดาไม่รับการติเกษากำกว่ามัธยมติเกษา



ตารางที่ 25 เปรียบเทียบหัวหน้าเด็กที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา และนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป ด้านน้ำก

ระดับการศึกษาของมารดา

ลำดับ ที่	หัวหน้าเด็กที่ทางบาก เกี่ยวกับโรคเอดส์	ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นไป		$t$		
		(N = 262)	(N = 228)			
	X	SD	X	SD		
1.	โรคเอดส์ เป็นโรคติดต่อที่ นำกล้าวที่สุดในปัจจุบัน	4.65	0.66	4.65	0.69	-0.08
2.	นักเรียนสามารถช่วยป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้	3.51	0.95	3.56	0.84	-0.62
3.	การทำเล็บ หรือโภนหนาดที่ ร้านเสริมสวยมีโอกาสเสี่ยง ต่อการเกิดโรคเอดส์	3.84	1.01	3.88	0.93	-0.48
4.	บุคคลทุกเพศทุกวัย มีโอกาส เสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้เท่า ๆ กัน	3.99	1.11	4.03	0.92	-1.37
5.	ผู้ที่เป็นโรคเอดส์ เป็นผู้ที่น่า สงสารและควรได้รับ ความ เห็นใจ	4.31	0.97	4.41	0.93	-1.10
6.	ผู้ป่วยโรคเอดส์อาจขาด ครอบครัวได้	3.83	1.01	3.89	0.99	-0.68
7.	นักเรียนที่มีเชื้อโรคเอดส์สามารถ แพร่กระจายเชื้อไปสู่เพื่อนได้	3.15	1.19	3.07	1.19	0.69
8.	ผู้ติดเชื้อเอดส์นัดด้มีโอกาสติด โรคเอดส์ได้	4.54	0.83	4.60	0.81	-0.79



ตารางที่ 25 (ต่อ)

## ระดับการศึกษาของมารดา

ลำดับ ที่	ต่ำกว่ามัธยมตיכון		มัธยมตיכוןขึ้นไป		t
	(N = 262)	(N = 228)	(N = 262)	(N = 228)	
	X	SD	X	SD	

## 9. ควรจัดให้มีการเรียนการสอนเรื่อง

โรคเอดส์ ในระดับประถมตיכון 4.71 0.57 4.68 0.69 0.59

## 10. นักเรียน ควรให้ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยโรคเอดส์เท่าที่ทำได้ 4.22 0.78 4.29 0.82 -0.89

รวม 4.07 0.40 4.11 0.38 -1.12

$$p < .05 \quad (.05 t_{\infty} = +1.96)$$

จากตารางที่ 25 เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติทางบางเกี้ยวกับโรคเอดส์ โดยส่วนรวม ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป พบร้า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบร้า ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดาไม่มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีทัศนคติเกี้ยวกับโรคเอดส์ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 26 เปรียบเทียบหัตคนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างนักเรียนที่มาตรา มาตรตัวบวกการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษา และนักเรียนที่ มาตรา มาตรตัวบวกการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาขึ้นไป ด้านลบ

ลำดับ ที่	หัตคนคติเกี่ยวกับโรคเอดส์	รยดับการศึกษาของมาตรา		ต่ำกว่ามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นไป		$t$
		(N = 262)	(N = 228)	$\bar{X}$	SD	
1.	โรคเอดส์ เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ	2.69	1.19	2.78	1.22	-0.82
2.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอดส์ ควรให้ออกจากโรงเรียน	3.64	1.10	3.68	1.11	-0.38
3.	นักเรียนรังเกียจจะไปมาหากกับบุคคลที่เป็น โรคเอดส์	3.48	1.08	3.64	1.07	-1.63
4.	ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์เป็นพากที่ทำให้สังคมวุ่นวาย	3.21	1.10	3.34	1.04	-1.31
5.	การจับผู้ติดเชื้อเอดส์ไปกักกันไว้เพื่อรักษาเป็นสิ่งดี	2.87	1.29	3.30	1.18	-3.85*
6.	นักเรียน ไม่อยากรับประทานอาหาร ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์	2.91	1.11	2.96	1.13	-0.51
7.	การติดโรคเอดส์ เป็นเรื่องของเดรษฐกรรม	3.64	1.12	3.75	1.16	-1.09
8.	นักเรียนอาจได้รับเชื้อโรคเอดส์ สักวันหนึ่ง	3.06	1.09	3.04	1.05	0.22

## ตารางที่ 26 (ต่อ)

ลำดับ ที่	ระดับการศึกษาของมารดา					
	ต่ำกว่ามัธยมตיכון มัธยมตיכוןขึ้นไป		(N = 262)		(N = 228) t	
	$\bar{X}$	SD	$\bar{X}$	SD		
9.	นักเรียนที่ติดเชื้อเอ็คส์かるเรียน ในโรงเรียนพิเศษ แยกออกจาก นักเรียนทั่วไป	3.26	1.22	3.41	1.05	-1.49
10.	ผู้ที่ติดเชื้อเอ็คส์เป็นบุคคลอันตราย นักเรียนไม่กล้าเข้าใกล้	3.37	1.94	3.58	1.12	-2.12*
	รวม		3.21	0.62	3.35	0.58 -2.50*

\*  $p < .05$  ( $.05 t_{\infty} = \pm 1.96$ )

จากตารางที่ 26 เมื่อเปรียบเทียบหัตคนดิติทางลบเกี่ยวกับโรคเอดส์ โดย ส่วนรวม ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดา มีระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป พบร่วาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีหัตคนดิติเกี่ยวกับโรคเอดส์ต่ำกว่า นักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมตיכון

เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายข้อ พบร่วา ระหว่างนักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษา ต่ำกว่ามัธยมตיכון กับนักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีหัตคนดิติ เกี่ยวกับโรคเอดส์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5 และ 10 โดยนักเรียนที่มารดาไม่ระดับการศึกษาตั้งแต่มัธยมตיכוןขึ้นไป มีหัตคนดิติ ทางลบต่ำกว่านักเรียนชาย