การศึกษาฤทธิ์การฆ่ำ เชื้อบัค เตรีและ เชื้อราของสมุนไพรบางชนิด



นางสาวพวงน้อย โลหะขจรพันธ์

001942

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต

แผนกวิชาจุลชีววิทยา

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๔๒๒

STUDIES OF ANTIBACTERIAL AND ANTIFUNGAL ACTIVITIES OF SOME MEDICINAL PLANTS

MISS PUANGNOI LOHAKACHORNPAN

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS

FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

GRADUATE SCHOOL

CHULALONGKORN UNIVERSITY

1979

Thesis Title

Studies of Antibacterial and Antifungal

Activities of Some Medicinal Plants

By

Miss Puangnoi Lohakachornpan

Department

Microbiology

Thesis Advisor Assistant Professor Sumana Vardhanabhuti

Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in partial fulfillment of the requirements for the Master's degree.

> (Associate Professor Supradit Bunnag Ph.D.)

Thesis Committee

Soft Flost Chairman

(Associate Professor Vichiara Jirawongse Ph.D.)

Jun ONN:) Member

(Assistant Professor Sumana Vardhanabhuti

M.Sc. in Pharm. Hon., M.P.H.)

Nat pra- Member

(Assistant Professor Santi Thoongsuwan Ph.D.)

Coll gall Member

(Assistant Professor Aurapin Rudeechuen

M.Sc. in Pharm.)

Copyright of the Graduate School, Chulalongkorn University

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาฤทธิ์การฆ่ำ เชื้อบัคเตรีและ เชื้อราของสมุนไพรบางชนิด

ชื่อนิสิต นางสาวพวงน้อย โลหะขจรพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุมนา วรรธนะภูติ

แผนกวิชา จุลชีววิทยา

ปีกำรศึกษา ๒๕๒๑

บทศักย์อ



พืชชนิดต่ำงๆของท้องถิ่นโดยทั่วไป มีอีกจำนวนมากที่ยังมิได้นำมาใช้ เป็นยาสมุนไพร และการศึกษาถึงคุณสมบัติ เฉพาะของพืชแต่ละชนิดปรากฏว่ำยังไม่ เป็นการ เพียงพอ เมื่อ เทียบ กับปริมาณของพืชที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ โดย เฉพาะแถบร้อนแท่งทวีปเอเชีย เช่นประเทศไทย

การใช้นา๊ยาสกัดจากพืชชั้นสูงซึ่งเป็นตัวแทนพืช ๘๕ ตระกูล จำนวน ๒๘๘ ชนิด รวมทั้งสิ้น ๓๒๘ ตัวอย่าง เพื่อทดสอบอำนาจการฆ่าเชื้อบัคเตรีในกลุ่มกรัมบวก (Gram positive bacteria) กรัมลบ (Gram negative bacteria) กลุ่มมีสปอร์ (Sporeforming bacilli) และเชื้อราจำพวกแอสเพอยีลลัส (Aspergillus) และ เพนิซีลเลียม (Penicillium) โดยวิธีใช้กระดาษซับนา๊ยาสกัดวางบนวุ้นเพาะเชื้อ (filter paper disc method) ผลปรากฏว่าร้อยละ ๑๓๘ ของพืชที่ใช้ทดลอง ซึ่งได้ มาจากการสุ่มตัวอย่างพืชโดยทั่วๆไป มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อบัคเตรี ในจำนวนนี้ ร้อยละ ๔๕๔ ออกฤทธิ์ต่อเชื้อตัวแทนบัคเตรีกลุ่มกรัมบวก จำนวนร้อยละ ๒๑๘ ออกฤทธิ์ต่อเชื้อตัวแทนบัคเตรีกลุ่มกรัมบวก จำนวนร้อยละ ๒๑๘ ออกฤทธิ์ต่อเชื้อตัวแทนบัคเตรีกลุ่มกรัมจากกลืยขึ้งพบว่าจำนวนร้อยละ ๑๕.๖ ของนา๊ยาสกัดจากพืชซึ่งนำมาทดลอง มีผลในการ ยับยังการเจริญของเชื้อรา

เชื้อที่ใช้เป็นตัวแทนในกลุ่มกรัมบวกบัคเตรี คือ Staphylococcus aureus

Rosenbach กรัมฉบ คือ Escherichia coli (Migula) Castellani et Chalmers
และกลุ่มมีสปอร์ คือ Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn ส่วนราที่ใช้เป็นตัวแทน
ของเชื้อรา ๒ ชนิด คือ Aspergillus niger van Tieghem และ Penicillium chrysogenum Thom

นา๊ยาสกัดที่ใช้ ๔ ชนิด ต่อพืชแต่ละตัวอย่าง คือ ไดเอทิลอีเทอร์ อะซิโตน เอ๋ทิลอัลกอฮอล์ และ นา๊กสั่น Thesis Title Studies of Antibacterial and Antifungal

Activities of Some Medicinal Plants

Name Miss Puangnoi Lohakachornpan

Thesis Advisor Assistant Professor Sumana Vardhanabhuti

Department Microbiology

Academic Year 1978

ABSTRACT

An enormous number of plants in various localities have not yet been used for medicinal purpose. Studies into their special properties are not extensive enough, with regards to the number of plant species present in various parts of the world, especially in tropical Asia including Thailand.

The results of antimicrobial activities of this study were obtained by using filter paper disc method of 329 samples of plant parts obtained from 289 higher plant species comprising 85 families. About 63.8% of samples was found to be effective to bacteria. Of these, 45.9% was found to be active against Gram positive bacteria, 26.4% against Gram negative bacteria and 54.4% against spore-forming bacilli. Moreover, 14.6% of such was shown to have antifungal activities against fungi.

The three representative groups of microorganisms used in

this work are Staphylococcus aureus Rosenbach for Gram positive bacteria, Escherichia coli (Migula) Castellani et Chalmers for Gram negative bacteria, and Bacillus subtilis (Ehrenberg) Cohn for spore-forming bacilli. Aspergillus niger van Tieghem and Penicillium chrysogenum Thom are two representative fungi.

Four solvents used for extraction of each part of plant samples are diethyl ether, acetone, ethyl alcohol, and distilled water.

ACKNOWLEDGEMENT



The author is heartfully grateful to Assistant Professor
Miss Pisawat Dutiyabodhi, Head of the Department of Microbiology,
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, for
her kindness to accept her to study in the Department of Microbiology and for her invaluable advice for this thesis.

Her sincere gratitude and thanks are expressed to her advisor, Mrs. Sumana Vardhanabhuti, Assistant Professor of the Department of Microbiology, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, for her helpful guidances, suggestions and encouragements throughout the course of this study.

The author feels greatly indebted and wishes to express her deep appreciation to Professor M.L. Pranod Xumsaeng, Head of the Department of Food Chemistry, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, for his kindness in providing facilities for this study.

Her indescribable thanks are also directed to Mr. Nijsiri Ruangrungsi, Instructor of the Department of Pharmacognosy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University, for his effective helps, particularly in the collection and authentication of plant samples.

The author also wishes to acknowledge the good help of Mr. Suthee Sunthornthum, an Instructor of the Department of Food Chemistry and Mr. Chaiyo Chaichantipyuth, the graduate student

of the Department of Pharmacognosy.

The author wishes to express her grateful thanks to

Chulalongkorn University Graduate School for granting her partial

financial support (of five thousand and five hundred baht) to

conduct this study.

Finally, the author would like to express her thanks to all of those whose names have not been mentioned and to those who in one way or another helped her to make this work a reality.

CONTENT

	Page
THAI ABSTRACT	iv
ENGLISH ABSTRACT	vi
ACKNOWLEDGEMENT	viii
CONTENT	×
LIST OF TABLES	×ii
LIST OF FIGURES	xiii
CHAPTER	
I INTRODUCTION	1
Historical	3
Literatures Survey	11
Purpose and Scope of Investigation	21
Methodology	23
II EXPERIMENTAL	29
Materials	
1. Plant Materials	29
2. Microorganisms Used	29
3. Solvents and Chemicals	31
4. Culture Media	32
5. Other Materials	33

	Page
6. Antibacterial Standards	33
7. Antifungal Standard	33
Methods	34
1. Preparation of Plant Extracts	34
2. Preparation of Discs	35
3. Preparation of Plate Cultures	35
4. Testing	36
III RESULTS AND DATA	38
IV DISCUSSION	120
V CONCLUSION	127
REFERENCES	137
APPENDIX	142
VITA	154

LIST OF TABLES

Table		Page
	urveys of Higher Plants for Antibiotic	15
	amed Antibiotic Substances or Preparations and	
Ti	heir Sources	18
3 M:	icroorganisms Used for Antimicrobial Activity	30
4 A1	ntimicrobial Activities of Plant Extracts	40
5 A1	ntimicrobial Activities of Additional Samples	
no	ot Included in Higher Plants	113
6 A1	ntibiotic Control Against Test Microorganisms	114
7 De	egree of Activities of Tested Plant Extracts	115
8 P	ercentage Effective of Total Plant Samples	
Aş	gainst Test Microorganisms	118
9 P	lants Showing Antimicrobial Activity Against	
Ва	acteria and/or Fungi	119

LIST OF FIGURES

Figure		Page
	Activities of Plants Tested Against Staphylococcus	
1	Rhizomes of Rheum emodi Wall.	129
2	Leaves of Moringa oleifera Lamk.	129
3	Roots of Glycyrrhiza wralensis Fisch.	129
4	Wood of Dracaena Lourieri Gagnep.	129
	Activities of Plants Tested Against Escherichia coli	
5	Rhizomes of Rheum emodi Wall.	130
6	Aerial parts of Impatiens balsamina L.	130
7	Leaves of Piper betel L.	130
8	Wood of Dracaena lourieri Gagnep.	130
	Activities of Plants Tested Against Bacillus subtilis	
9	Rhizomes of Rheum emodi Wall.	131
10	Leaves of Moringa oleifera Lamk.	131
11	Flowers of Mesua ferrea L.	131
12	Pulps of Citrus hystrix DC.	131
	Activities of Plants Tested Against Aspergillus niger	
13	Aerial parts of Impatiens balsamina L.	132
14	Rhizomes of Alpinia galanga Swartz.	132
15	Wood of Euphorbia antiquorum L.	132
16	Aerial parts of Nasturtium benghalense DC	132

igure		Page
	Activities of Plants Tested Against Penicillium chryso-	
17	Wood of Alangium salviifolium Wang.	133
18	Leaves of Piper betel L.	133
19	Roots of Plumbago zeylanica L.	133
20	Seeds of Camellia sasangqua Thunb.	133
	Activities of the roots of Plumbago rosea L. Against	
21	Staphylococcus aureus	134
22	Escherichia coli	134
23	Bacillus subtilis	134
24	Aspergillus niger	134
	Activities of the leaves of Lawsonia inermis. L. var. alba Hassk. Against	
25	Bacillus subtilis	135
26	Staphylococcus aureus	135
	Activities of the aerial parts of Impatiens balsamina Against	L.
27	Bacillus subtilis	13
28	Staphylococcus aureus	13
	Activities of Plants Tested Against Bacillus subtilis	
29	Rhizomes of Dactyloctenium aegyptiacum Willd.	13
30	Aerial parts of Polygonum chinensis L.	13

Figure		Page
	Activities of Plants Tested Against Bacillus subtilis	
31	Aerial parts of Euphorbia tirucalli L.	136
32	Aerial parts of Catharanthus roseus G.Don.	136