### การศึกษาการกระจายของสารตะกั่วและปรอท บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนลาง



นายพิชาญ สวางวงศ์

002023

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูกรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2520

## A STUDY ON THE DISTRIBUTION OF LEAD AND MERCURY IN THE LOWER SECTION OF THE CHAO-PRAYA RIVER

Mr. Pichan Sawangwong

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Science

Department of Marine Science

Graduate School
Chulalongkorn University

1977

Accepted by the Graduate School, Chulalongkorn University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science.

Kirid Prochadomol.

(Professor Dr. Visid Prachuabmoh)

Thesis Committee

Manuardi Gengpreng. Chairman

(Assistant Professor Dr.Manuwadi Hungspreugs)

Lamera Merovant Advisor

(Dr. Piamsak Menasveta)

Knaphl Hudan Member

(Assistant Professor Dr. Suraphol Sudara)

Absormuda Siripone Member

(Mrs. Absornsuda Siripong)

Thesis Advisor: Dr. Piamsak Menasveta

Copyright 1977

by

The Graduate School

Chulalongkorn University

Thesis Title: A Study on the Distribution of Lead and Mercury in the

Lower Section of the Chao-Praya River.

By : Mr. Pichan Sawangwong

Department : Marine Science

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการกระจายของสารฅะก๋วและปรอทบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

ฅอนลาง

ชื่อ นาย พิชาญ สวางวงศ์

แผนกวิชา แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ปีการศึกษา 2519



### บทคัดยอ

สารตะกั่ว และปรอท นับว่าเป็นสารสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาการเจือปนในแหล่งน้ำ การทราบสภาพพื้นฐานของสารทั้งสองนี้ที่กระจายอยู่มีส่วนสำคัญในการประเมินและทำนาย สภาพของแหล่งน้ำที่เกี่ยวกับผลอันเนื่องจากสารทั้งสองชนิดนี้

ได้ทำการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างน้ำ ดินตะกอน และสิ่งมีชีวิต ในสองระยะ ของปี พ.ศ. 2519 กล่าวคือ ในเดือน มกราคม และพฤษภาคม ตัวอย่างที่นำมาทำ การวิเคราะห์ทางเคมี เพื่อหาปริมาณของสารตะกัว และปรอท พบว่า ตัวอย่างน้ำที่เก็บ ในเพื่อนมกราคม มีปริมาณความเข้มข้นของสารตะกั่ว และ ปรอท น้อยกว่าตัวอย่างที่เก็บ ในเดือนพฤษภาคม สารตะกั่วประมาณ 85 % อยู่ในสภาพที่เกาะพันกับวัตถุแขวนลอย ส่วนปรอท มีประมาณ 15 % เท่านั้น ที่เกาะพันกับวัตถุแขวนลอย สารทั้งสองชนิดนี้มีแนว โน้มสูงขึ้นในสถานีที่อยู่บริเวณในเมือง และเขตอุตสาหกรรม ตลอดจนบริเวณร่องน้ำที่ปาก แม่น้ำ แต่จากการศึกษาทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่างกันของสารทั้งสองในสองฤดูที่ทำการศึกษา

จากการศึกษาคินตะกอน พบว่า ค่าของสารตะกั่ว และปรอท มีปริมาณสูง ที่สถานี ที่อยูบริเวณในเมือง และยานอุตสาหกรรม ค่าสูงมากพบบางบริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานีที่ อยูบริเวณรองน้ำ นอกสันคอนในบริเวณปากแม่น้ำ การสะสมตัวของปรอทตามขนาดของ ปลาบางชนิดเห็นได้ชัด แต่การสะสม**ตัว**ของสารตะกั่วมีแนวโน้มไม่ชัดเจน ความสามารถ ผลจากการศึกษาเรื่องนี้ได้แสดงถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของบริเวณที่ทำการศึกษา ในแง่ที่เกี่ยวกับการกระจายของสารตะกั่ว และปรอท ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้เป็นประ— โยชน์ ในการพิจารณามาตรฐานของแหล่งน้ำธรรมชาติ และใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ ในอนาคตได้. Thesis Title A Study on the Distribution of Lead and Mercury in the

Lower Section of the Chao-Praya River

Name Mr. Pichan Sawangwong

Department Marine Science

Academic Year 1976



### Abstract

Lead and mercury are considered the most threatening heavy metals in the aquatic environment. The base-line values of the distribution of the two metals are important in evaluating and predicting the degree of pollution caused by the two metals prevailing in the receiving waters. The samples (including water, sedements and biological species) were collected in two periods of 1976; January and May. After having been treated chemically, all the treated samples were determined instrumentally for the total concentration of lead and mercury residues.

The water samples collected in January show a relatively low concentration of both lead and mercury in certain areas, as compared to those collected in May. The mean lead concentration in particulate fraction is 85 % of the total lead whereas the mean mercury concentration is 15 %. The concentration of the two metals in river water trends to be higher in the Bangkok Metropolitan Area towards the river channel at the outer bar. But no significant statistical difference existed between the mean values of varieties for the two seasons.

The sediment cores show a high lead and mercury content at stations within the urban and industrialized area with high values for mercury in the channel at the outer bar.

The mercury accumulation and the size of the fish was observed to have a positive linear relationship in many species for both the January and May collections, but for lead the relationship was not so obvious. The concentration factor in each organism for mercury ranged from 55 to 3580 in some selected species studied while lead values ranged only in the order of a hundred.

Biological samples collected in the two seasons did not show any significant statistical difference between the three trophic levels.

The results obtained from this study revealed the present situation of lead and mercury distribution in the region. The information can be significant in controlling and further studying of the aquatic quality concerning the pollutional effects of these two metals in the lower section of the Chao-Praya River.

# \* AND THE WAY TO THE W

#### ACKNOWLEDGEMENTS

I am especially grateful to Dr. Piamsak Menasveta, my academic advisor, for his kind assistance in obtaining funds from the Institute of Environmental Research, Chulalongkorn University and for numerous suggestions on methodology in undertaing the research towards this thesis.

I wish to express my gratitude to assistant professor Dr. Manuwadi Hungspreugs for her kind suggestions in the preparing of the nanuscript and statistical part of this thesis.

I am also in great debt to Dr. C.R. Elliott for his corrections and suggestions in preparing the manuscript of this thesis.

My thanks also go to Miss Prompong Pongkasikij, Mr. Apichart Temvicharkorn, Mr. Padermsak Charayaphandu and Mr. Prasart Chevaporanapiwat for their help in various field and laboratory operations.

I am also in debt to Mr. Praewthong Thongchua for his assistance in the line drawings.

I would also like to express my gratitude to the staff of the Metallurgy Section of the Department of Mineral Resources, and to the Department of Chemistry, Chulalongkorn University, for making their laboratory equipments available in the course of this research.

### Table of Content

	page
Abstract (in Thai)	iv
Abstract.	vi
Acknowledgement	vi <b>ii</b>
List of Tables	xi
List of Figures	xii
Chapter	
I. Introduction	1
Objectives and Scopes of Thesis	2
Merits of Thesis	2
Method of the Study	3
Literature Survey and Previous Study of Lead and	
Mercury in the Aquatic Environment	3
Geochemistry of Lead and Mercury in the Aquatic	
Environment	6
Interaction of Lead and Mercury with Biota in the	
Aquatic System	. 8
Definition of Terms	10
II Materials and Methods	
The Chao-Praya River and the Area of Study	11
Materials and Methods	15

		page
	Sampling and Storing Techniques for the Samples	17
	Pretreatment of Samples	20
	Determination of the Total Lead Concentration	21
	Determination of the Total Mercury Concentration	24
	Statistical Analyses	26
III.	Results	28
IV.	Discussion	
	Water	53
	Sediment	57
	Biota	63
٧.	Conclusions and Recommendations	
	Conclusions	69
	Recommendations	70
	References	72
	Vita	79

### List of Tables

		page
Table		
1a	Concentration of Dissolved, Particulate and Total	30
	Content of Lead and Mercury in the Water Samples	
	on the ppb Basis for January Collections	
18	Concentration of Dissolved, Particulate and Total	30
	Content of Lead and Mercury in the Water Samples	
	on the ppb Basis for May.Collections	
2	Total Lead Concentration in Wet Sediment on the ppm Basis.	31
3	Total Mercury Concentration in Wet Sediment on the ppm Basis	32
4	Total Concentration of Lead and Mercury Residues in	33
	Biological Samples for January Collections	
5	Total Concentration of Lead and Mercury Residues in .	34
	Biological Samples for May Collections	

### List of Figures

	Pub
Figu	re
1	Methylation Diagram
2	Physiographic Provinces of the Chao-Praya River System14
3	Sampling Sites19
4	Diagram for Core Operation20
5	Distribution of Dissolved, Particulate and Total Lead
	in the Water Samples for January Collections35
6	Distribution of Dissolved, Particulate and Total Mercury
	in the Water Samples for January Collections36
7	Distribution of Dissolved, Particulate and Total Lead in
	the Water Samples for May Collections37
8	Distribution of Dissolved, Particulate and Total Mercury
	in the Water Samples for May Collections
9	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station I39
10	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station II40
11	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station III41

12	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station IV+V.42
13	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Lepth at Station VI43
14	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station VII44
15	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station VIII.45
16	The Relationship between the Total Lead and Mercury
	Concentration in Sediment Core with Depth at Station IX46
17a	The Relationship between the Total Mercury Residues in
	Muscle with Length in Selected Biota
1 <b>7</b> b	The Relationship between the Total Lead Residues in the
	Muscle with Length in Selected Biota
18	Comparison of the Total Lead and Mercury Residues in Biota
	on the Trophic Level Basis for January and May
	Concentrations48
19a	Calibration Curve for Lead49
19b	Calibration Curve for Mercury49
20	Accuracy Curves for Experimental and EPA Standards for
	Mercury50