

บทสรุป

ความมุ่งหมาย

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาลักษณะทั่วไปของผู้พยาบาลกระทำอัคคีภัยตามในประเทศไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างเพศในเรื่อง อายุ อาชีพ สภาพสมรส การศึกษา วิธีการสาเหตุ จำนวนครั้งที่พยาบาลกระทำอัคคีภัยตาม และก่อให้ทางจิตที่ผู้พยาบาลกระทำอัคคีภัยตามใช้เมื่อเกิดภัย

วิธีดำเนินการวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างผู้พยาบาลกระทำอัคคีภัยตามในประเทศไทย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นคนไข้ที่เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร ๓ แห่ง คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศรีมหุญา จำนวน ๘๙ คน ชาย ๕๖ คน หญิง ๓๓ คน และเป็นคนไข้ที่มีประวัติพยาบาลกระทำอัคคีภัยตาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

๑. แบบสัมภาษณ์เพื่อทำการใช้กลไกทางจิต จำนวน ๓๐ ข้อ
๒. แบบสำรวจข้อมูลทั่ว ๆ ไป

การวิเคราะห์ข้อมูล

๑. เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้พยาบาลกระทำอัคคีภัยตามระหว่างเพศ ในเรื่องอายุ การศึกษา อาชีพ สภาพสมรส วิธีการ สาเหตุ จำนวนครั้ง
๒. เปรียบเทียบการใช้กลไกทางจิตระหว่างเพศ

ผลการวิจัย

๑. เปรียบเทียบลักษณะทั่วไปของผู้พยาบาลกระทำอัคคีภัยตามระหว่างเพศ

๑.๑ เปรียบเทียบอายุของผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมระหว่างเพศพบว่า มีความแตกต่างกัน กลุ่มทัวอย่างหญิงมีอัตราผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมสูงสุดในช่วงอายุ ๒๖ - ๓๐ ปี และในช่วงอายุที่สูงกว่า ๔๖ ปีขึ้นไปไม่พบว่ามีผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรม ในกลุ่มทัวอย่างชายมีอัตราผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมสูงสุดในช่วงอายุ ๒๙ - ๓๔ ปี และอายุสูงสุด ของผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมอยู่ในช่วง ๒๖ - ๒๘ ปี

๑.๒ เปรียบเทียบการศึกษาของผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมระหว่างเพศพบว่า กลุ่มทัวอย่างชาย ผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรม มีอัตราสูงสุดอยู่ในระดับการศึกษาประถมปีที่ ๔ - ๗ ในกลุ่มทัวอย่างหญิง ผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรม มีอัตราสูงสุดอยู่ในระดับการศึกษาที่สูงกว่า มัธยมศึกษาปีที่ ๓

๑.๓ เปรียบเทียบอาชีพของผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมระหว่างเพศพบว่า ในการแบ่งปันประเภทอาชีพ ในกลุ่มทัวอย่างชายผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมมากจากอาชีพบริการ มากที่สุด และกลุ่มทัวอย่างหญิงเป็นนักเรียนมากที่สุด

๑.๔ สภาพสมรส เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเพศพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน โดย ส่วนรวมผู้พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมเป็นโสดมากที่สุด

๑.๕ การเปรียบเทียบวิธีการกระทำอัคคีนิมาตกรรมพบว่า มีความแตกต่างระหว่าง เพศ กลุ่มทัวอย่างชายใช้ช่องนิ่มมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มทัวอย่างหญิงเลือกใช้ยานอนหลับ บางส่วน ป่วย และผู้ชายใช้วิธีการที่รุนแรงกว่าผู้หญิง

๑.๖ สาเหตุที่นำไปสู่การกระทำอัคคีนิมาตกรรม มีความแตกต่างระหว่างเพศ ใน กลุ่มทัวอย่างชายสาเหตุที่สำคัญคือโรคจิต ในกลุ่มทัวอย่างหญิงสาเหตุที่สำคัญคือถูกพ่อแม่ เจ้านาย ดูแล

๑.๗ จำนวนครรภ์ที่กลุ่มทัวอย่างพยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรม มีความแตกต่าง ระหว่างเพศ ต่อกลุ่มทัวอย่างชาย พยาบาลกระทำอัคคีนิมาตกรรมมีอยู่ครรภ์กว่ากลุ่มทัวอย่างหญิง แต่เมื่อคราวผู้พยาบาลกระทำชำนาญกว่า

#### ๑.๘. เปรียบเทียบการใช้ก็อกไกทางจิตระหว่างเพศ

๑.๙ การใช้ก็อกไกทางจิตแต่ชนิดในกลุ่มทัวอย่างชาย กลุ่มทัวอย่างหญิง และใน กลุ่มทัวอย่างทั้งหมด ความแปรปรวนของคะแนนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .<sup>\*\*</sup>

๒.๖ ความถี่ในการใช้กลไกทางจิตแคละชนิด เมื่อนำมาเปรียบเทียบระหว่างเพศ  
พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

#### ข้อ เสนอแนะ

๑. ควรจะให้ศึกษาเรื่องนี้โดย เนื่องจากว่าการใช้กลไกทางจิตยังไม่มีงานวิจัยที่  
กว้างขวาง การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางกันจะทำให้ได้ผล เป็นที่เชื่อถือได้
๒. ควรจะให้ทำการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้พยาบาลกระทำอัคติกรรม  
ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสามัญ และโรงพยาบาลโรคจิต
๓. ควรจะให้ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างระหว่างผู้พยาบาลกระทำอัคติกรรม  
และผู้กระทำอัคติกรรมสามารៈ
๔. ควรจะให้ศึกษาถึงวิธีการอบรมเลี้ยงดูของผู้พยาบาลกระทำอัคติกรรม
๕. ควรจะให้ศึกษาถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับคนไข้ ผู้พยาบาลกระทำอัคติกรรม