

สรุปผล

ผลการวิจัยพบว่า ปวงศ์แซนติสของจังหวัดภูเก็ต มี 12 Subfamily ,
37 สกุล 77 ชนิด ดังนี้คือ

Subfamily Carpilinae พบ 2 สกุล 3 ชนิด คือ

สกุล Carpilius ได้แก่ Carpilius maculatus และ
C. convexus

สกุล Liagore ได้แก่ Liagore rubromaculata

Subfamily Liomerinae พบ 1 สกุล 4 ชนิด คือ

สกุล Liomera ได้แก่ Liomera cincimana, L.laevis,
L. bella และ L. venosa

Subfamily Zozyminae พบ 1 สกุล 4 ชนิด คือ

สกุล Zosymus ได้แก่ Zosymus aeneus

สกุล Zozymodes ได้แก่ Zozymodes cavipes

สกุล Platypodia ได้แก่ Platypodia alcocki และ

P. helleri

สกุล Ateragatis ได้แก่ Ateragatis roseus,

A. integerrimus และ A. floridus.

สกุล Lophozozymus ได้แก่ Lophozozymus pictor และ

L. dodone

Subfamily Euxanthinae พบ 1 สกุล 1 ชนิด

สกุล Euxanthus ได้แก่ Euxanthus exsculptus

Subfamily Xanthinae ใบ 5 สกุล 8 ชนิด คือ

สกุล Demania ได้แก่ Demania scaberrima

สกุล Macromedaeus ได้แก่ Macromedaeus crassi-

manus

สกุล Leptodius ได้แก่ Leptodius exaratus,

L. nudipes และ L. sanguineus

สกุล Medaeops ได้แก่ Medaeops granulosis

สกุล Xanthias ได้แก่ Xanthias punctatus และ

X. lamarcki

Subfamily Galeninae พบ 1 สกุล 1 ชนิด คือ

สกุล Galene ได้แก่ Galene bispinosa

Subfamily Actaeinae พบ 4 สกุล 8 ชนิด คือ

สกุล Actaea ได้แก่ Actaea cavipes,

A. Polyacantha และ A. modesta

สกุล Actaeodes ได้แก่ Actaeodes tomentosus และ

A. hirsutissimus

สกุล Paractaea ได้แก่ Paractaea ruppelli

สกุล Pseudoliomera ได้แก่ Pseudoliomera granosimana
และ P. speciosa

Subfamily Chlorodinae พบ 4 สกุล 14 ชนิด คือ

สกุล Etisus ได้แก่ Etisus laevimanus, E. electra,
E. utitis, E. anaglyptus และ E. frontalis

สกุล Pilodius ได้แก่ Pilodius nigrocrinitus ,
P. pugil, P. areolatus. และ P. scabriculus

สกุล Chlorodiella ได้แก่ Chlorodiella nigra,
C. cytherea, และ C. laevissima

สกุล Phymodius ได้แก่ Phymodius monticulosus และ
P. nitidus

Subfamily Cymoinae พบ 1 สกุล 2 ชนิด คือ

สกุล Cymo ได้แก่ Cymo melanodactylus และ
C. quadrilobatus

Subfamily Menippinae พบ 6 สกุล 11 ชนิด คือ

สกุล Sphaerozius ได้แก่ Sphaerozius nitidus

สกุล Ozius ได้แก่ Ozius rugulosus และ
O. granulosus

สกุล Epixanthus ได้แก่ Epixanthus frontalis,
E. corrosus และ E. dentatus

สกุล Baptozius ได้แก่ Baptozius vinosus

สกุล Eriphia ได้แก่ Eriphia sebana, E. smithi และ
E. scabricula

- สกุล Maldivia ได้แก่ Maldivia triunguiculata
- Subfamily Pilumninae พบ 5 สกุล 11 ชนิด คือ
- สกุล Pilumnus ได้แก่ Pilumnus vesperilio,
P. scabriusculus, P. minutus และ P. longicornis
- สกุล Actumnus ได้แก่ Actumnus obesus และ
A. digitalis
- สกุล Glabropilumnus ได้แก่ Glabropilumnus semi-
nudus และ G. laevimanus
- สกุล Pilumnopeus ได้แก่ Pilumnopeus makiana
- สกุล Heteropanope ได้แก่ Heteropanope glabra
และ H. changensis
- Subfamily Trapeziinae พบ 2 สกุล 5 ชนิด คือ
- สกุล Trapezia ได้แก่ Trapezia cymodoce,
T. ferruginea T. areolata และ T. wardi.
- สกุล Tetralia ได้แก่ Tetralia glaberrima