



บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังนี้

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
2. ความรู้เรื่องโรคเอดส์
3. เจตคติเรื่องโรคเอดส์
4. พฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับโรคเอดส์

1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2533 จำนวน 400 คน จากจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า เป็นนักเรียนเพศชายมากกว่าเพศหญิง กล่าวคือ เป็นเพศชายร้อยละ 74.50 เพศหญิงร้อยละ 25.50 โดยคิดเป็นร้อยละ 26.75, 35.50, 37.75 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5, 6 ตามลำดับ ช่วงอายุที่พบมากที่สุดได้แก่ กลุ่มอายุ 16-17 ปี มีถึงร้อยละ 56.75 รองลงมาได้แก่ 18-20 ปี ร้อยละ 28.00 น้อยที่สุดคือ อายุ 14-15 ปี ร้อยละ 15.25 คิดเป็นอายุเฉลี่ยเท่ากับ 16.75 ปี (S.D. = 1.17) เมื่อพิจารณาถึงภูมิลำเนาเดิม พบว่า ร้อยละ 70.25 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร และร้อยละ 29.26 เป็นผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของสถานภาพกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา อายุ และภูมิลำเนาเดิม

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	298	74.50
หญิง	102	25.50
รวม	400	100.00
ระดับการศึกษา		
ม.4	107	26.75
ม.5	142	35.50
ม.6	151	37.75
รวม	400	100.00
อายุ (ปี)		
14 - 15	61	15.25
16 - 17	227	56.75
18 - 20	112	28.00
รวม	400	100.00
	\bar{X}	= 16.75
	S.D.	= 1.17
ภูมิลำเนา		
กรุงเทพมหานคร	283	70.75
ต่างจังหวัด	117	29.25
รวม	400	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของสถานภาพกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเศรษฐกิจ ที่พักอาศัย
บุคคลที่นักเรียนพักด้วย

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เศรษฐกิจ		
จน	14	3.50
ปานกลาง	350	87.50
รวย	16	4.00
ไม่แน่ใจ	20	5.00
รวม	400	100.00
ที่พักอาศัย		
บ้านพ่อ-แม่	335	83.75
บ้านเช่า	31	7.75
วัด	9	2.25
หอพัก	13	3.25
อื่น ๆ : บ้านเพื่อน	12	3.00
รวม	400	100.00
อาศัยกับ		
พ่อ-แม่	302	75.50
ญาติ	60	15.00
ผู้ที่คุ้นเคยกับครอบครัว	9	2.25
เพื่อน	11	2.75
อื่น ๆ : แพน, พี่, น้อง	18	4.50
รวม	400	100.00

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าฐานะของครอบครัวตนเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นนั้น มีฐานะปานกลางจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 87.50 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจในฐานะครอบครัวตน คิดเป็นร้อยละ 5.00 มีฐานะรวยและจนจำนวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ 3.50 ตามลำดับ

สำหรับที่พักอาศัยนั้นพบว่า เป็นบ้านพ่อแม่มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.75 รองลงมาได้แก่ บ้านเช่าร้อยละ 7.75 หอพักร้อยละ 3.25 น้อยที่สุดตอบว่า บ้านเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 3.00 และ 2.25 ตามลำดับ

ส่วนบุคคลในกลุ่มตัวอย่างพักอาศัยด้วยนั้น พบว่า พักอยู่กับพ่อแม่จำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.50 รองลงมาได้แก่ ญาติร้อยละ 15.00 อยู่กับแฟน, พี่, น้อง ร้อยละ 4.50 น้อยที่สุดคือ เพื่อน และผู้ที่คุ้นเคยกับครอบครัวของตน คิดเป็นร้อยละ 2.75 และ 2.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละของสถานภาพกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามบุคคลที่ตนไว้วางใจ และ
 นำปัญหาไปปรึกษาด้วย (N = 400)

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างไว้วางใจ (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)		
พ่อ	7	1.75
แม่	58	14.50
ทั้งพ่อและแม่	294	73.50
เพื่อน	149	37.25
ญาติ	97	24.25
ครู	125	31.25
บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างนำปัญหาไปปรึกษาคด้วยมากที่สุด		
พ่อ	11	2.75
แม่	78	19.50
ทั้งพ่อและแม่	96	24.00
เพื่อน	128	32.00
ญาติ	15	3.75
ครู	24	6.00
อื่น ๆ : แฟน, พี่, พ่อของเพื่อน	48	12.00

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า บุคคลในกลุ่มตัวอย่างมีความไว้วางใจมากเป็นอันดับแรก ได้แก่ ทั้งพ่อและแม่คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาได้แก่ เพื่อน ครู และญาติ คิดเป็นร้อยละ 37.25 31.25 และ 24.25 ตามลำดับ

ส่วนบุคคลในกลุ่มตัวอย่างนำปัญหาไปปรึกษาด้วยมากที่สุด ได้แก่ เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมาได้แก่ ทั้งพ่อและแม่ร้อยละ 24.00 แม่และบุคคลอื่น ๆ เช่น แฟน, พี่, พ่อของเพื่อน คิดเป็นร้อยละ 19.50 และ 12.00 ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากกลุ่มที่ปรึกษาพ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่ไว้ด้วยกันพบว่า มีจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่น โดยคิดเป็นร้อยละ 46.25

ตารางที่ 4 สื่อความรู้เรื่องโรคเอดส์ใน 3 อันดับแรกของกลุ่มตัวอย่างเรียงจากมากไปหาน้อย

อันดับความสำคัญ	ประเภทของสื่อ	จำนวน	ร้อยละ
1.	<u>ได้รับมากที่สุดเป็นอันดับแรก</u>		
	1. โทรทัศน์	204	51.00
	2. สิ่งตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์	79	19.80
	3. ครู	41	10.20
	4. การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ	28	7.00
2.	<u>ได้รับมากที่สุดเป็นอันดับสอง</u>		
	1. สิ่งตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์	139	34.80
	2. โทรทัศน์	86	21.50
	3. นิทรรศการ	51	12.80
	4. ครู	40	10.00
3.	<u>ได้รับมากที่สุดเป็นอันดับสาม</u>		
	1. นิทรรศการ	79	19.80
	2. สิ่งตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์	72	18.00
	3. การบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ	64	16.00
	4. โทรทัศน์	56	14.00

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับความรู้เรื่องโรคเอดส์จากโทรทัศน์มากเป็นอันดับแรก จำนวนมากที่สุดร้อยละ 51.00 รองลงมาได้แก่ หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 19.80 ครูร้อยละ 10.20 ขณะที่สื่อความรู้ที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเป็นอันดับสองจำนวนมากที่สุดได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ : หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 34.80 รองลงมาได้แก่ โทรทัศน์ ร้อยละ 21.5 และสื่อที่กลุ่มตัวอย่างได้รับเป็นอันดับสาม จำนวนมากที่สุดได้แก่ นิทรรศการ ร้อยละ 19.80 รองลงมาได้แก่ สิ่งตีพิมพ์ ร้อยละ 18.00

2. ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง

จากการศึกษาถึงความรู้เรื่องโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้เสนอเป็นภาพรวมของระดับคะแนนความรู้เรื่องโรคเอดส์ และลำดับเนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์จากมากไปหาน้อย ดังจะเสนอรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละลำดับเนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องมากไปหาน้อย (N = 400)

ลำดับที่	เนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์	จำนวน	ร้อยละ
1	การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์	384	96.00
2	บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์	383	95.75
3	วิธีใดบ้างที่เชื้อโรคเอดส์ไม่สามารถแพร่ถึงกันได้	381	95.25
4	การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ทราบได้โดยการตรวจเลือกหาไวรัสเอดส์	372	93.00
5	ทุก ๆ คนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	367	91.75
6	อาการของโรคเอดส์	365	91.25
7	โรคเอดส์คืออะไร	361	90.25
8	โรคเอดส์อันตรายเพราะเหตุใด	358	89.50
9	พฤติกรรมที่ไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์เลย	329	82.25
10	โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์น้อยที่สุด	317	79.25
11	ธรรมชาติของเชื้อโรคเอดส์เป็นอย่างไร	310	77.50
12	เชื้อโรคเอดส์มีอยู่มากในของเหลวชนิดใดของร่างกายมนุษย์	308	77.00
*13	การป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์เป็นวิธีที่นักเรียนสามารถทำได้ดีที่สุด	188	47.00

ตารางที่ 5 (ต่อ)

ลำดับที่	เนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์	จำนวน	ร้อยละ
* 14	ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในระยะต่อไปจะมีอาการอย่างไร	185	46.25
* 15	ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์จะอ่อนเพลียไม่สามารถทำงานได้ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้ ผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์จะไม่ติดเชื้อโรคเอดส์	152	38.00

* ข้อคำถามที่จำนวนนักเรียนกว่าร้อยละ 50.00 ยังมีความรู้ไม่ถูกต้อง

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องมากกว่าร้อยละ 90.00 ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีป้องกันโรคเอดส์ เมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ (ร้อยละ 96.00) บุคคลที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ (ร้อยละ 95.75) วิธีใดบ้างที่เชื้อโรคเอดส์ไม่สามารถแพร่ถึงกันได้ (ร้อยละ 95.25) การตรวจหาเชื้อโรคเอดส์ทราบได้โดยการตรวจเลือดหาไวรัสเอดส์ (ร้อยละ 93.00) ทุก ๆ คนเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ (ร้อยละ 91.75) อาการของโรคเอดส์ (ร้อยละ 91.25) และโรคเอดส์คืออะไร (ร้อยละ 90.25)

สำหรับเนื้อหาความรู้เรื่องโรคเอดส์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้อง ร้อยละ 75.00 ถึงร้อยละ 90.00 ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับโรคเอดส์อันตรายเพราะเหตุใด (ร้อยละ 89.50) พฤติกรรมที่ไม่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์เลย (ร้อยละ 82.25) โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์น้อยที่สุด (ร้อยละ 79.25) ธรรมชาติของเชื้อโรคเอดส์เป็นอย่างไร (ร้อยละ 77.50) และเชื้อโรคเอดส์มีอยู่มากในของเหลวชนิดใดของร่างกายมนุษย์ (ร้อยละ 77.00)

ส่วนเนื้อหาความรู้โรคเอดส์ที่กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ถูกต้องต่ำกว่าร้อยละ 50.00 ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อโรคเอดส์ เป็นวิธีที่นักเรียนสามารถทำได้ดีที่สุด (ร้อยละ 47.00) ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ในระยะต่อไปจะมีอาการอย่างไร (ร้อยละ 46.25) และผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ จะไม่ติดเชื้อโรคเอดส์หรือการดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้ติดเชื้อโรคเอดส์ได้ หรือผู้ติดเชื้อโรคเอดส์จะอ่อนเพลียไม่สามารถทำงานได้ (ร้อยละ 38.00)

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละระดับคะแนนความรู้เรื่องโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ระดับความรู้เรื่องโรคเอดส์	จำนวน	ร้อยละ
มีความรู้ระดับสูง (13-15 คะแนน)	179	44.75
มีความรู้ระดับปานกลาง (10-12 คะแนน)	183	45.75
มีความรู้ระดับต่ำ (ตั้งแต่ 9 คะแนนลงมา)	38	9.50
รวม	400	100.00
	\bar{X} =	11.92
	S.D. =	2.08

จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรคเอดส์ในระดับปานกลางจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.75 รองลงมาได้แก่ มีความรู้ในระดับสูง และระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 44.75 และ 9.50 ตามลำดับ และมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.92 คะแนน

3. เจตคติเรื่องโรคเอดส์

ในส่วนของเจตคติต่อเรื่องโรคเอดส์นั้น ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละเจตคติเรื่องโรคเอดส์ตามรายข้อของกลุ่มตัวอย่าง (N = 400)

ข้อความ	ระดับเจตคติ					
	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย	
	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)	จำนวน	(%)
- โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน	317	(92.75)	14	(3.50)	15	(3.75)
- ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้	290	(72.50)	80	(20.00)	30	(7.50)
- การใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศ ทำให้มีความสุขไม่เต็มที่	81	(20.25)	206	(51.50)	113	(28.25)
- การมีประสบการณ์ทางเพศ ไม่ใช่สิ่งเลวร้าย	248	(82.00)	112	(28.00)	40	(10.00)
- สังคมควรให้ความสงสาร เห็นใจผู้เป็นเอดส์	137	(84.50)	42	(10.50)	20	(5.00)
- การเปิดเผยผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์จะช่วยในการป้องกันโรคได้	137	(34.25)	122	(30.50)	141	(35.25)

ตารางที่ 7 (ต่อ)

ข้อความ	ระดับเจตคติ		
	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่เห็นด้วย
	จำนวน (%)	จำนวน (%)	จำนวน (%)
- ไม่ควรเปิดเผยผู้ติดเชื้อโรค เอดส์ เพราะสังคมยังไม่ ยอมรับ	192 (48.00)	110 (27.50)	98 (24.50)
- ก่อนแต่งงานชายหญิงควร ทดลองอยู่ด้วยกัน	152 (38.00)	105 (26.25)	145 (35.75)
- การแจกถุงยางอนามัยเป็น การป้องกันโรคเอดส์ที่ควร สนับสนุน	294 (73.50)	77 (19.25)	29 (7.25)

จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า "โรคเอดส์เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดในปัจจุบัน" คิดเป็นร้อยละ 92.75 รองลงมาได้แก่ ไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ร้อยละ 3.75 และ 3.50 ตามลำดับ และเห็นด้วยว่า "ผู้ติดเชื้อโรคเอดส์สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้" คิดเป็นร้อยละ 72.50 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วย ร้อยละ 20.00 และ 7.50 ตามลำดับ มากกว่าครึ่งเล็กน้อยที่ไม่แน่ใจว่า "การใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศทำให้มีความสุขไม่เต็มที่" คือ คิดเป็นร้อยละ 51.50 รองลงมาได้แก่ ไม่เห็นด้วย และเห็นด้วยร้อยละ 28.25 และ 20.25 ตามลำดับ

เห็นด้วยว่า "การมีประสบการณ์ทางเพศในช่วงวัยรุ่น" คิดเป็นร้อยละ 62.00 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วย ร้อยละ 28.00 และ 10.00 ตามลำดับ และส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า "สังคมควรให้ความสงสารเห็นใจผู้เป็นเอดส์" คิดเป็นร้อยละ 84.50 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจและไม่เห็นด้วย ร้อยละ 10.50 และ 5.00 ตามลำดับ ไม่เห็นด้วยว่า

"การเปิดเผยผู้ที่ติดเชื้อโรคเอดส์จะช่วยในการป้องกันโรคได้" คิดเป็นร้อยละ 25.25 รองลงมาได้แก่ เห็นด้วยและไม่แน่ใจ ร้อยละ 34.25 และ 30.50 ตามลำดับ

น้อยกว่าครึ่งเล็กน้อยที่เห็นด้วยว่า "ไม่ควรเปิดเผยผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ เพราะสังคมยังไม่ยอมรับ" คิดเป็นร้อยละ 48.00 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วยร้อยละ 27.50 และ 24.50 ตามลำดับ และเห็นด้วยว่า "ก่อนแต่งงานชายหญิงควรทดลองอยู่ด้วยกัน" คิดเป็นร้อยละ 38.00 รองลงมาได้แก่ ไม่เห็นด้วยและไม่แน่ใจ ร้อยละ 35.75 และ 26.25 ตามลำดับ ส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า "การแจกถุงยางอนามัยเป็นมาตรการการป้องกันโรคเอดส์ที่ควรสนับสนุน" คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาได้แก่ ไม่แน่ใจ และไม่เห็นด้วยร้อยละ 19.25 และ 7.25 ตามลำดับ

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละระดับเจตคติเรื่องโรคเอดส์ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 400)

ระดับเจตคติ	จำนวน	ร้อยละ
ระดับดี (43-54 คะแนน)	149	37.25
ระดับปานกลาง (31-42 คะแนน)	239	59.75
ระดับไม่ดี (18-30 คะแนน)	12	3.00
	X = 40.04	
	S.D. = 4.01	

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเจตคติเรื่องโรคเอดส์ในระดับปานกลางจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.75 รองลงมาได้แก่ มีเจตคติในระดับดีและไม่ดีคิดเป็นร้อยละ 37.25 และ 3.00 ตามลำดับ โดยเฉลี่ยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มด้านเจตคติเรื่องโรคเอดส์อยู่ระหว่างระดับดี และค่อนข้างไปทางระดับปานกลาง ($X = 40.04$)

4. พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคเอดส์

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมเสี่ยงนี้เป็นข้อมูลเฉพาะในช่วงรอบ 1 ปีที่ผ่านมาของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้วิจัยนำเสนอเป็นรายชื่อและในรูปของระดับความเสี่ยงของพฤติกรรมแต่ละด้าน ซึ่งได้แก่ การเที่ยวสถานเริงรมย์ การเสพยาหรือยาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและต่างเพศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมกาเที่ยวสถานเริงรมย์ของกลุ่มตัวอย่าง (N = 400)

พฤติกรรมกาเที่ยวสถานเริงรมย์	จำนวน	ร้อยละ
การเที่ยวสถานเริงรมย์ (เช่น ดิสโกเธค, บาร์-ไนท์คลับ...)		
ไม่เคย	240	60.00
เคย	160	40.00
รวม	400	100.00
สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างเคยเที่ยว		
ดิสโกเธค	119	29.30
บาร์-ไนท์คลับ	62	15.40
อาบ อบ นวด	40	9.80
ผับ	78	19.20
คอฟฟี่ช็อป	85	20.90
อื่น ๆ : โรงแรม โรงน้ำชา	22	5.50
จำนวนของการเที่ยว (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	85	53.20
5-10 ครั้ง	30	18.70
มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป	43	26.80
อื่น ๆ : ไม่นั่นนอน, นาน ๆ ครั้ง	2	1.30
	\bar{X}	= 0.68
	S.D.	= 1.01

จากตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.00 ไม่เคยเที่ยวสถานเริงรมย์ และเคยเที่ยวร้อยละ 40.00 สถานเริงรมย์ที่กลุ่มตัวอย่างไปเที่ยวมากที่สุดได้แก่ ดิสโก้เธค รองลงมาได้แก่ คอฟฟี่ช็อป, ผับ ฯลฯ และจำนวนของการเที่ยวเฉลี่ยต่อเดือน ร้อยละ 53.20 ไปเที่ยว 1-5 ครั้ง ขณะที่ประมาณร้อยละ 18.70 ไปเที่ยว 5-10 ครั้ง และมีถึงร้อยละ 26.80 ที่เที่ยวมากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการเสพสารหรือยาเสพติดของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมการเสพสารหรือยาเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
การเสพสารหรือยาเสพติด (เช่น บุหรี่, สุรา.....)		
ไม่เคย	261	65.26
เคย	139	34.75
รวม	400	100.00
สารหรือยาเสพติดที่เคยใช้นั้น ได้แก่		
บุหรี่	101	32.30
สุรา	128	40.90
ยาบ้า/ยาขยัน	30	9.60
กัญชา	19	6.10
กาว/ทินเนอร์	23	7.30
เฮโรอีน	12	3.80

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 65.25 ไม่เคยเสพสารหรือยาเสพติด และประมาณร้อยละ 34.75 เคยเสพสารหรือยาเสพติด โดยสารหรือยาเสพติดที่เสพมากที่สุด ได้แก่ สุราร้อยละ 40.90 รองลงมาได้แก่ บุหรี่ ยาบ้าหรือยาขยัน, กาวหรือทินเนอร์, กัญชาและเฮโรอีน คิดเป็นร้อยละ 32.30, 9.60 7.30, 6.10 และ 3.80 ตามลำดับ

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมกาเสพติดหรือยาเสพติด จำนวนตามประเภท
สารเสพติดและวิธีการเสพของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมกาเสพติดหรือยาเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
บุหรี		
ความถี่ในการเสพ (เฉลี่ยต่อสัปดาห์)		
1-5 มวน	54	53.50
6-10 มวน	9	8.90
มากกว่า 10 มวนขึ้นไป	30	29.70
อื่น ๆ : นาน ๆ ครั้ง	8	7.90
	$\bar{X} = 0.56$	
	S.D. = 1.35	
สุรา (เฉลี่ยต่อสัปดาห์)		
1-5 ครั้ง	103	80.50
6-10 ครั้ง	14	10.90
มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป	4	3.10
อื่น ๆ : นาน ๆ ครั้ง เวลามึน	7	5.50
	$\bar{X} = 0.62$	
	S.D. = 1.56	
กัญชา (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	9	47.40
6-10 ครั้ง	2	10.50
มากกว่า 10 ครั้ง	3	15.80
อื่น ๆ : นาน ๆ ครั้ง สัngerกับเพื่อน ๆ	5	26.30
	$\bar{X} = 0.15$	
	S.D. = 0.94	

ตารางที่ 11 (ต่อ)

พฤติกรรมการเสพยาหรือยาเสพติด	จำนวน	ร้อยละ
กาว-ทินเนอร์ (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	12	52.20
6-10 ครั้ง	-	-
มากกว่า 10 ครั้ง	2	8.60
อื่น ๆ : ไม่นั่นนอน, เจอเพื่อน	9	39.20
	$\bar{X} = 0.22$	
	S.D. = 1.21	
ยาม้า		
(วิธีการเสพ)		
กิน	29	96.60
ฉีด	1	3.40
เฮโรอีน		
สูด-ดม	6	50.00
ฉีด	6	50.00
ความถี่ในการเสพ (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	5	41.70
6-10 ครั้ง	2	16.60
มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป	-	-
อื่น ๆ : ไม่นั่นนอน นาน ๆ ครั้ง	5	41.70
	$\bar{X} = 0.12$	
	S.D. = 0.90	

จากตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า จำนวนครั้งในการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่าง ประมาณร้อยละ 53.50 สูบ 1-5 มวน ในขณะที่ร้อยละ 8.90 สูบ 6-10 มวน และที่น่าสนใจ คือ มีกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 29.70 สูบมากกว่า 10 มวนต่อสัปดาห์

สำหรับจำนวนครั้งในการดื่มสุราของกลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 80.50 ดื่ม 1-5 ครั้ง ร้อยละ 10.90 ดื่ม 6-10 ครั้ง มีเพียงร้อยละ 3.10 ที่ดื่มมากกว่า 10 ครั้ง อีก ร้อยละ 5.00 ตอบว่าดื่มนาน ๆ ครั้ง หรือเฉพาะเวลาว่าง ส่วนกัญชาร้อยละ 47.40 ตอบ ว่าเสพ 1-5 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 26.30 ตอบว่า เสพนาน ๆ ครั้ง หรือเวลาสังสรรค์กับ เพื่อน ๆ และจำนวนร้อยละ 15.80 ที่เสพมากกว่า 10 ครั้ง ในขณะที่กาวหรือทินเนอร์ร้อยละ 52.20 เสพ 1-5 ครั้งต่อเดือน ไม้แน่นอนหรือเมื่อเจอเพื่อนคิดเป็นร้อยละ 39.20 และ ประมาณร้อยละ 8.60 ที่เสพมากกว่า 10 ครั้ง

สำหรับวิธีการเสพยาบ้าของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 96.40 ที่ใช้วิธีกิน อีก ร้อยละ 3.4 ใช้วิธีฉีด ส่วนเฮโรอีนพบว่า ใช้วิธีสูด-ดม และการฉีด ร้อยละ 50.00 เท่ากัน และส่วนใหญ่อเสพ 1-5 ครั้งต่อเดือน

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันของกลุ่มตัวอย่าง
(N = 400)

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	จำนวน	ร้อยละ
การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน		
ไม่เคย	364	91.00
เคย	36	9.00
รวม	400	100.00
จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์ (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	26	72.20
6-10 ครั้ง	1	2.80
มากกว่า 10 ครั้ง	6	16.70
อื่น ๆ : นาน ๆ ครั้ง	3	8.30
	$\bar{X} = 0.11$	
	S.D. = 0.72	
บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย		
คู่อีก	19	52.80
บุคคลอาชีพพิเศษ	4	11.11
อื่น ๆ : เพื่อน คนรู้จัก	13	36.09
ในการมีเพศสัมพันธ์ใช้การป้องกัน		
ไม่ใช้	25	69.40
ใช้	11	30.60
กรณีที่ใช้การป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์		
บางครั้ง	7	63.64
ทุกครั้ง	4	36.36

ตารางที่ 12 (ต่อ)

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน	จำนวน	ร้อยละ
วิธีการใช้ในการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์		
หลังภายนอก	6	54.50
ใช้ถุงยางอนามัย	3	27.30
อื่น ๆ	2	17.20

จากตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 91.00 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน และร้อยละ 9.00 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน ในขณะที่จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า 1-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.20 มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 16.70 และ 6-10 ครั้ง ร้อยละ 2.80 ซึ่งบุคคลในกลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย คือ คู่รักคิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาได้แก่ บุคคลอาชีพพิเศษและอื่น ๆ เช่น เพื่อน คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 27.80 และ 13.90 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้น ได้ใช้วิธีการป้องกันหรือไม่ พบว่าประมาณร้อยละ 69.40 ไม่ใช้การป้องกัน และร้อยละ 30.60 ใช้การป้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่า มีการใช้บางครั้งร้อยละ 63.64 และใช้ทุกครั้งร้อยละ 36.36 โดยร้อยละ 54.50 ใช้วิธีหลังภายนอก รองลงมาได้แก่ ถุงยางอนามัย และการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.30 และ 17.20 ตามลำดับ

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ	จำนวน	ร้อยละ
การมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ		
ไม่เคย	302	75.50
เคย	98	24.50
รวม	400	100.50
จำนวนครั้งของการเคยมีเพศสัมพันธ์ (เฉลี่ยต่อเดือน)		
1-5 ครั้ง	71	72.50
6-10 ครั้ง	9	9.20
มากกว่า 10 ครั้ง	11	11.20
อื่น ๆ : นาน ๆ ครั้ง	7	7.10
	$\bar{X} = 0.44$	
	S.D. = 1.19	
บุคคลในกลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย		
คูรัก	64	50.40
บุคคลอาชีพพิเศษ	62	48.80
อื่น ๆ : คนรู้จัก	1	0.80
ในการมีเพศสัมพันธ์ใช้การป้องกัน		
ไม่ใช้	17	17.40
ใช้	81	82.60
กรณีที่ใช้การป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์		
บางครั้ง	42	51.80
ทุกครั้ง	39	48.20

ตารางที่ 13 (ต่อ)

พฤติกรรมการณ์มีเพศสัมพันธ์กับต่างประเทศ	จำนวน	ร้อยละ
วิธีการใช้ในการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์		
หลังภายนอก	18	22.20
ใช้ถุงยางอนามัย	47	58.00
กินยาคุมกำเนิด	11	13.60
ใส่ห่วงอนามัย	2	2.50
อื่น ๆ : ฉีดยาคุม	3	3.70

จากตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประมาณร้อยละ 75.50 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับต่างประเทศ และร้อยละ 24.50 ที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับต่างประเทศ ในขณะที่จำนวนครั้งของการมีเพศสัมพันธ์เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า 1-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 72.50 มากกว่า 10 ครั้งขึ้นไป ร้อยละ 11.20 และ 6-10 ครั้ง ร้อยละ 9.20 ซึ่งบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างเคยมีเพศสัมพันธ์ด้วย ได้แก่ คู่รัก คิดเป็นร้อยละ 50.40 รองลงมาได้แก่ บุคคลอาชีพพิเศษ และอื่น ๆ เช่น คนรู้จัก คิดเป็นร้อยละ 48.80 และ 0.80 ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มตัวอย่างที่เคยมีเพศสัมพันธ์นั้น ได้ใช้วิธีการป้องกันหรือไม่ พบว่าประมาณร้อยละ 17.40 ไม่ใช้การป้องกัน และร้อยละ 82.60 ใช้การป้องกัน นอกจากนี้ยังพบว่า ใช้เป็นบางครั้ง คิดเป็นร้อยละ 51.80 และใช้ทุกครั้งร้อยละ 48.20 โดยประมาณร้อยละ 58.00 ใช้ถุงยางอนามัย รองลงมาได้แก่ การหลังภายนอก กินยาคุมกำเนิด ใส่ห่วงอนามัย และอื่น ๆ ได้แก่ การฉีดยาคุมกำเนิด คิดเป็นร้อยละ 22.20, 13.60 2.50 และ 3.70 ตามลำดับ

ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละการเที่ยวสถานเริงรมย์, การเสพสารหรือยาเสพติด, การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันและต่างเพศ จำแนกตามเพศของกลุ่มตัวอย่าง

พฤติกรรม	เพศ	
	ชาย (N = 298)	หญิง (N = 102)
	จำนวน (%)	จำนวน (%)
สถานที่ของการเที่ยวสถานเริงรมย์		
ดิสโกเธค	73 (24.49)	46 (45)
คอฟฟี่ช็อป	47 (15.77)	38 (37.25)
ผับ	50 (16.78)	28 (27.45)
บาร์-ไนท์ คลับ	41 (13.75)	21 (20.58)
สารเสพติด		
สุรา	98 (32.88)	30 (29.41)
บุหรี่	87 (29.19)	14 (13.72)
ยาบ้า/ยาขยัน	25 (8.39)	5 (4.90)
เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน		
คูรักรัก	17 (5.70)	2 (1.96)
ใช้การป้องกัน	9 (3.02)	2 (1.96)
การหลังภายนอก	6 (2.01)	-
ถุงยางอนามัย	3 (1.00)	-
เพศสัมพันธ์กับต่างเพศ		
คูรักรัก	42 (14.09)	22 (21.56)
บุคคลอาชีพพิเศษ	50 (16.77)	12 (11.76)
ใช้การป้องกัน	65 (21.81)	16 (15.68)
การหลังภายนอก	18 (6.04)	-
ถุงยางอนามัย	47 (15.77)	-

จากตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า เมื่อพิจารณาพฤติกรรมด้านต่างๆ ของกลุ่มตัวอย่าง โดยจำแนกตามเพศนั้น พบว่า ร้อยละ 24.49 ของนักเรียนชายและร้อยละ 45 ของนักเรียนหญิง ตอบว่า เคยเที่ยวดิสโกเธค ขณะที่ร้อยละ 15.77 ของนักเรียนชายและร้อยละ 37.25 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยเที่ยวคอฟฟี่ช็อป ร้อยละ 16.78 ของนักเรียนชายและร้อยละ 27.45 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยเที่ยวผับ นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 13.75 ของนักเรียนชายและร้อยละ 20.58 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยเที่ยวบาร์-ไนท์คลับ

สำหรับพฤติกรรมการเสพยาเสพติด พบว่า ร้อยละ 32.88 ของนักเรียนชายและร้อยละ 29.41 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยดื่มสุรา ขณะที่ร้อยละ 29.19 ของนักเรียนชายและร้อยละ 13.72 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 8.39 ของนักเรียนชายและร้อยละ 4.90 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยเสพยาบ้าหรือยาขยัน

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน พบว่า ร้อยละ 5.70 ของนักเรียนชาย และร้อยละ 1.96 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีก นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 3.02 ของนักเรียนชายและร้อยละ 1.96 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยใช้การป้องกัน โดยที่ร้อยละ 2.01 ของนักเรียนชายใช้การหลังภายนอก และร้อยละ 1.00 ใช้ถุงยางอนามัย

ส่วนพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับต่างเพศ ร้อยละ 14.09 ของนักเรียนชาย และร้อยละ 21.56 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์กับคู่อีก และร้อยละ 16.77 ของนักเรียนชาย ร้อยละ 11.76 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลอาชีพพิเศษ นอกจากนี้ยังพบว่า ร้อยละ 21.81 ของนักเรียนชาย และร้อยละ 15.68 ของนักเรียนหญิงตอบว่า เคยใช้การป้องกันเมื่อจะมีเพศสัมพันธ์ โดยที่ร้อยละ 6.04 ของนักเรียนชายใช้การหลังภายนอก และร้อยละ 15.77 ใช้ถุงยางอนามัย