

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย มีประวัติการพยายามฆ่าตัวตายด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลลาดบัวหลวง จำนวน 20 คนและสมาชิกครอบครัว 1-4 คน การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษานำเสนอเป็นลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและสมาชิกครอบครัว

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว

เพื่อความเข้าใจในการเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ศึกษาได้กำหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้คือ

$\bar{X}$	หมายถึง	ค่าคะแนนเฉลี่ย
SD	หมายถึง	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
n	หมายถึง	จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
p	หมายถึง	ระดับความมีนัยสำคัญ
t	หมายถึง	ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าคะแนนเฉลี่ยของข้อมูลแต่ละกลุ่ม

## ผลการศึกษา

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและสมาชิกครอบครัว

ตารางที่ 3 จำนวน ร้อยละของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายที่ได้รับการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้และจำนวนครั้งการทำร้ายตนเอง (n = 20)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (คน) (n = 20)	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	7	35
หญิง	13	65
อายุ		
20-29 ปี	3	15
30-39 ปี	6	30
40-49 ปี	6	30
50-59 ปี	5	25
ระดับการศึกษา		
ไม่ได้เรียน	1	5
ประถมศึกษา	9	45
มัธยมศึกษาตอนต้น	7	35
มัธยมศึกษาตอนปลาย	2	10
ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรืออนุปริญญา	1	5
สถานภาพสมรส		
โสด	8	40
คู่	11	55
ม่าย	1	5

ตารางที่ 3 (ต่อ)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน(คน) (n = 20)	ร้อยละ
รายได้ต่อเดือน		
1,000-2,000 บาท	2	10
2,001-3,000 บาท	9	45
3,001-4,000 บาท	7	35
4,001-5,000 บาท	2	10
5,000 บาทขึ้นไป	0	0
ประวัติการทำร้ายตนเอง		
ครั้งแรก	18	80
มากกว่า 1 ครั้ง	2	20

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 35 โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 30-49 ปี ร้อยละ 60 และมีระดับการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 45 สถานภาพส่วนใหญ่อยู่ ร้อยละ 55 รายได้ต่อเดือน 2,001-3,000 บาท ร้อยละ 45 และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีประวัติการทำร้ายตนเองครั้งแรก ร้อยละ 80

ตารางที่ 4 จำนวน ร้อยละของสมาชิกครอบครัวที่ได้รับการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว จำแนกตาม เพศ อายุ ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวและ สัมพันธภาพในครอบครัว (n = 40)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง	จำนวน (คน) (n = 40)	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
ชาย	5	12.5
หญิง	35	77.5
<b>อายุ</b>		
20-29 ปี	1	2.5
30-39 ปี	8	20
40-49 ปี	18	45
50-59 ปี	13	32.5
60 ปีขึ้นไป	1	2.5
<b>ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว</b>		
พอใช้	20	50
ไม่พอใช้	10	25
มีเหลือเก็บ	5	12.5
หนี้สิน	5	12.5
<b>สัมพันธภาพในครอบครัว</b>		
ไม่ดี	20	50
ปานกลาง	15	37.5
ดี	5	12.5
ดีมาก	0	0

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 12.5 โดยส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี ร้อยละ 45 ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวพอใช้ ร้อยละ 37.5 และส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ร้อยละ 50

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้  
คำปรึกษาครอบครัว

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความคิดฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้  
คำปรึกษาครอบครัว

ตัวแปร	ก่อนการใช้โปรแกรม		หลังการใช้โปรแกรม		t
	$\bar{X}$	S.D.	$\bar{X}$	S.D.	
1.ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่	.00	.00	1.50	.88	7.55*
2.ความปรารถนาที่จะเสียชีวิต	2.00	.00	.20	.41	7.00*
3.เหตุผลที่จะมีชีวิตหรือปรารถนาที่จะเสียชีวิต	2.00	.00	.15	.36	7.58*
4.จะลงมือกระทำหรือพยายามฆ่าตัวตาย	1.95	.22	.15	.36	39.00*
5.ความต้องที่จะเสียชีวิตโดยทางอ้อม	1.85	.36	.05	.22	22.58*
6.ช่วงเวลาที่ท่านคิดถึงการมีความคิดฆ่าตัวตาย	2.30	2.08	.00	.00	4.94*
7.ความถี่ของการฆ่าตัวตาย	1.80	1.32	.05	.22	6.09*
8.ท่านมีเจตคติต่อความคิดและความต้องการจะเสียชีวิต	1.75	.55	.10	.30	14.22*
9.สามารถควบคุมการกระทำการฆ่าตัวตาย	.25	.63	.95	.88	4.79*
10.สิ่งที่ถูกคามที่มีต่อการพยายามฆ่าตัวตาย	1.75	.44	.05	.22	17.61*
11.มีเหตุผลที่พิจารณาในการพยายามฆ่าตัวตาย	.15	.36	1.85	.36	22.58*
12.การวางแผนในการพยายามฆ่าตัวตาย	1.60	.68	.00	.00	10.51*
13.โอกาสและง่ายต่อการพยายามฆ่าตัวตาย	1.75	.63	.10	.44	12.25*
14.ความสามารถในการกระทำการฆ่าตัวตาย	1.80	.52	.00	.00	15.38*
15.ความคาดหวังต่อการกระทำการฆ่าตัวตาย	1.75	.55	.05	.22	14.22*
16.การเตรียมการในการลงมือฆ่าตัวตาย	1.80	.41	.00	.00	19.61*
17.ท่านเขียนจดหมายลาตาย	1.15	.87	.05	.22	5.87*
18.คาดหวังว่าท่านต้องเสียชีวิตจากการกระทำ	1.60	.68	.10	.30	10.51*
19.มีการปิดบังและไม่ต้องการให้ผู้อื่นทราบถึงความตั้งใจที่จะฆ่าตัวตาย	1.25	.71	.10	.30	5.87*
	30.60	4.45	1.45	2.625	25.14*

\*p < .05

\* การคิดคะแนนอยู่ในภาคผนวก

จากตารางที่ 5 พบว่าคะแนนเฉลี่ยความคิดฆ่าตัวตายก่อนและหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยความคิดฆ่าตัวตายของผู้ที่พยายามฆ่าตัวตายหลังการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัวลดลงก่อนการใช้โปรแกรมการให้คำปรึกษาครอบครัว