

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษา ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกของพยาบาลผู้นิเทศก์ที่มีต่อเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวช พยาบาลประจำการ โรงพยาบาลศรีธัญญา จากกลุ่มตัวอย่าง 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำดับดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานะภาพของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถาม นำเสนอเป็นจำนวนและร้อยละ (ตารางที่ 4)

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกของพยาบาลผู้นิเทศก์ โดยใช้ค่าที (pair t-test) นำเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อชี้บอกระดับคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (ตารางที่ 5-6)

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองโดยใช้ค่าที (t-test) นำเสนอเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อชี้บอกระดับคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล (ตารางที่ 7-8)

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของพยาบาลผู้นิเทศก์ต่อการใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกที่เน้นสัมพันธภาพ (ตารางที่ 9)

### ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง

ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างพยาบาลประจำการ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจำแนกตามอายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ระดับตำแหน่ง ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน

สถานภาพ	กลุ่มทดลอง		กลุ่มควบคุม		รวม	
	(N=15)	%	(N=15)	%	(N=30)	%
อายุ						
20 - 29 ปี	0	0	1	6.66	1	3.33
30 - 49 ปี	14	93.33	14	93.33	28	93.33
40 - 49 ปี	1	6.66	0	0	1	3.33
สถานภาพ						
โสด	10	66.66	7	46.66	17	56.66
สมรส	5	33.33	8	53.33	13	43.33
วุฒิการศึกษา						
ประกาศนียบัตรเทียบเท่า ปริญญาตรี	15	100	15	100	30	100
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานปัจจุบัน						
1 - 5 ปี	1	6.66	1	6.66	2	6.66
6 - 10 ปี	0	0	4	26.66	4	13.33
11 - 15 ปี	13	86.66	8	53.33	21	70
16 - 20 ปี	0	0	2	13.33	2	6.66
21 - 25 ปี	1	6.66	0	0	1	3.33
พยาบาลวิชาชีพ						
ระดับ 3	1	6.66	0	0	1	3.33
ระดับ 4	0	0	1	6.66	1	3.33
ระดับ 5	6	40	8	53.33	14	46.66
ระดับ 6	8	53.33	5	33.33	13	43.33
ระดับ 7	0	0	1	6.66	1	3.33

ตารางที่ 4 (ต่อ)

สถานภาพ	กลุ่มทดลอง		กลุ่มควบคุม		รวม	
	(N=15)	%	(N=15)	%	(N=30)	%
ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน						
เวรเช้า - บ่าย - ดึก	11	73.33	11	73.33	22	73.33
ปฏิบัติงานเฉพาะเวรเช้า	4	26.66	4	26.66	8	26.66

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลประจำการทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.33 ส่วนน้อยของกลุ่มทดลอง มีอายุระหว่าง 40-49 ปีและกลุ่มควบคุม มีอายุระหว่าง 20-29ปี คิดเป็นร้อยละ 6.66 เท่ากัน

สถานภาพสมรส โดยรวมส่วนมากเป็นโสดทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม คิดเป็นร้อยละ 46.66 และร้อยละ 53.33 สมรสแล้วร้อยละ 43.33 ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีวุฒิประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี ทั้งหมดร้อยละ 100

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 86.66และ 53.33 รองลงมาของกลุ่มทดลอง มี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 21-25 ปี และ 1 - 5 ปี เท่ากันคิดเป็นร้อยละ 6.66 ส่วนกลุ่มควบคุม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 6 - 10 ปี 16 - 20ปี และ 1- 5ปีเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 26.66 13.33และ6.66ตามลำดับ

ระดับตำแหน่ง โดยรวมส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 46.66 ส่วนใหญ่ของกลุ่มทดลอง เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ 6 คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ 5 และระดับ 3 คิดเป็นร้อยละ 40 และ 6.66 กลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ 5 คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมาเป็นพยาบาลวิชาชีพระดับ 6 คิดเป็นร้อยละ 33.33และระดับ 4 ระดับ 7 คิดเป็นร้อยละ 6.66 เท่ากัน

ช่วงเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในช่วงเวรเช้า-บ่าย-ดึก คิดเป็นร้อยละ 73.33 และส่วนน้อยร้อยละ 26.66 ปฏิบัติงานเฉพาะในเวรเช้า

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วย  
จิตเวชของพยาบาลประจำการ ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการ  
ปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงของกลุ่มทดลอง ก่อนและหลังการทดลอง (pair t-test)

ตัวแปร	หลังการทดลอง			ก่อนการทดลอง			t-test
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ	
<b>เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง(นาที)</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	69.13	31.48		30.00	24.44		5.51*
การสอนทางสุขภาพ	27.27	17.41		9.73	18.37		4.02*
การพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษา ทางกาย	59.40	33.13		26.93	25.18		3.35*
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	15.33	24.45		9.13	18.24		1.30
การดูแลด้านร่างกาย	63.93	31.06		30.27	23.20		3.73*
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>232.47</b>	<b>76.54</b>		<b>104.06</b>	<b>71.30</b>		<b>6.04*</b>
<b>คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	9.33	3.49	พอใช้	4.53	2.85	ต่ำ	5.96*
การสอนทางสุขภาพ	6.47	2.85	พอใช้	0.67	1.23	ต้องปรับปรุง	7.09*
การพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษา ทางกาย	5.80	2.70	พอใช้	3.87	2.97	ต่ำ	2.04*
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	1.53	2.26	ต้องปรับปรุง	0.67	0.97	ต้องปรับปรุง	1.36
การดูแลด้านร่างกาย	7.40	3.13	ปานกลาง	3.53	2.53	ต่ำ	3.55*
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>30.53</b>	<b>10.89</b>	<b>พอใช้</b>	<b>13.27</b>	<b>7.23</b>	<b>ต้องปรับปรุง</b>	<b>5.15*</b>

\*  $p < .05$

จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการในกลุ่มทดลองรวมทุกด้าน หลังการทดลองและก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติบำบัดทางจิต การสอนทางสุขภาพ การพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาทางกาย และการดูแลด้านร่างกาย

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของเวลาและคุณภาพการปฏิบัติ การพยาบาลโดยตรงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ส่วนค่าเฉลี่ยของเวลาและคุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดไม่แตกต่างกัน

ระดับคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำ การรวมทุกด้านมีระดับเพิ่มขึ้น โดยก่อนการทดลองอยู่ในระดับต้องปรับปรุง และหลังการทดลอง อยู่ในระดับพอใช้

เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของ พยาบาลประจำการเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิตและด้านการพยาบาล ที่เกี่ยวกับการรักษาทางกาย เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำเป็นระดับพอใช้ ด้านการสอนทางสุขภาพ เพิ่มขึ้นจากระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับพอใช้ ด้านการดูแลด้านร่างกาย เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำเป็นระดับ ปานกลาง ส่วนระดับคุณภาพด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดยังต้องปรับปรุง

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยตรงของกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง (pair t-test)

ตัวแปร	หลังการทดลอง			ก่อนการทดลอง			t-test
	X	S.D.	ระดับคุณภาพ	X	S.D.	ระดับคุณภาพ	
<b>เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง(นาที)</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	44.20	32.17		42.53	28.46		0.18
การสอนทางสุขภาพ	5.20	15.02		1.00	3.87		1.03
การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกาย	25.47	16.26		20.60	13.35		0.86
การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการบำบัด	10.00	25.84		0.67	2.58		1.38
การดูแลด้านร่างกาย	37.80	22.41		31.40	17.31		0.89
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>122.67</b>	<b>51.94</b>		<b>96.20</b>	<b>41.27</b>		<b>2.17*</b>
<b>คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	5.93	3.65	ต่ำ	4.67	2.25	ต่ำ	1.63
การสอนทางสุขภาพ	0.27	0.59	ต้องปรับปรุง	0.13	0.51	ต้องปรับปรุง	0.62
การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกาย	3.80	2.39	ต่ำ	3.06	1.75	ต่ำ	0.96
การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการบำบัด	0.87	2.10	ต้องปรับปรุง	0.13	0.52	ต้องปรับปรุง	1.32
การดูแลด้านร่างกาย	4.60	3.13	ต่ำ	2.80	1.61	ต่ำ	1.91
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>15.47</b>	<b>6.71</b>	<b>ต่ำ</b>	<b>10.93</b>	<b>4.31</b>	<b>ต้องปรับปรุง</b>	<b>2.49*</b>

\*  $p < 0.05$

จากตารางที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการในกลุ่มควบคุมรวมทุกด้านหลังการทดลองกับก่อนการทดลอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงเป็นรายด้านทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน

ระดับคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงรวมทุกด้านในกลุ่มควบคุมหลังการทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลองจากระดับต้องปรับปรุงเป็นระดับต่ำ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต ด้านการพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาทางกาย และด้านการดูแลด้านร่างกาย คุณภาพอยู่ในระดับต่ำคงเดิม ส่วนด้านการสอนทางสุขภาพและด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด คุณภาพอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ตารางที่ 7 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยตรงระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลอง

ตัวแปร	กลุ่มทดลอง (n=15)			กลุ่มควบคุม (n=15)			t-test
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ	
<b>เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง(นาที)</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	30.00	24.45		42.53	28.46		1.29
การสอนทางสุขภาพ	9.73	18.37		1.00	3.87		1.80
การพยาบาลที่ เกี่ยวกับการรักษาทางกาย	26.93	25.19		20.60	13.35		0.86
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	9.13	18.24		0.67	2.58		1.78
การดูแลด้านร่างกาย	30.24	23.21		31.40	17.31		0.15
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>104.07</b>	<b>71.31</b>		<b>96.20</b>	<b>41.27</b>		<b>0.37</b>
<b>คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	4.53	2.85	ต่ำ	4.67	2.22	ต่ำ	0.14
การสอนทางสุขภาพ	0.67	1.23	ต้องปรับปรุง	0.13	0.51	ต้องปรับปรุง	1.54
การพยาบาลที่ เกี่ยวกับการรักษาทางกาย	3.86	2.97	ต่ำ	3.07	1.75	ต่ำ	0.90
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	0.67	.976	ต้องปรับปรุง	0.13	0.51	ต้องปรับปรุง	1.87
การดูแลด้านร่างกาย	2.80	1.61	ต่ำ	3.53	2.53	ต่ำ	0.95
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>13.27</b>	<b>7.23</b>	<b>ต้องปรับปรุง</b>	<b>10.93</b>	<b>4.31</b>	<b>ต้องปรับปรุง</b>	<b>1.07</b>

\* p &lt; 0.05

จากตารางที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาล โดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันทั้งรายหมวดและรายด้าน

ระดับคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงรวมทุกด้าน ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมก่อนการทดลองอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทั้งสองกลุ่ม

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง (test)

ตัวแปร	กลุ่มทดลอง (n=15)		กลุ่มควบคุม (n=15)		t-test		
	$\bar{X}$	S.D.	ระดับคุณภาพ	$\bar{X}$		S.D.	ระดับคุณภาพ
<b>เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง(นาที)</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	69.13	31.48		44.20	32.18	2.15*	
การสอนทางสุขภาพ	27.27	17.41		5.20	15.02	3.72*	
การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกาย	59.40	33.13		25.47	16.26	3.56*	
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	15.33	24.45		10.00	25.84	0.58	
การดูแลด้านร่างกาย	63.93	31.07		37.80	22.41	2.64*	
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>232.47</b>	<b>76.53</b>		<b>122.67</b>	<b>51.94</b>	<b>4.60*</b>	
<b>คุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรง</b>							
การปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต	9.33	3.50	พอใช้	5.93	3.65	ต่ำ	2.60*
การสอนทางสุขภาพ	6.47	2.85	พอใช้	0.27	0.52	ต้องปรับปรุง	8.25*
การพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางกาย	5.80	2.70	พอใช้	3.80	2.40	ต่ำ	2.14
การจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัด	1.53	2.26	ต้องปรับปรุง	0.87	2.10	ต้องปรับปรุง	0.84
การดูแลด้านร่างกาย	7.40	3.13	ปานกลาง	4.60	3.13	ต่ำ	2.45*
<b>รวมทุกด้าน</b>	<b>30.53</b>	<b>10.89</b>	<b>พอใช้</b>	<b>15.47</b>	<b>6.72</b>	<b>ต่ำ</b>	<b>4.56*</b>

\* p < .05

จากตารางที่ 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงแก่ผู้ป่วยจิตเวชของพยาบาลประจำการระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการทดลอง รวมทุกด้าน แตกต่าง



กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และเมื่อดูรายด้านแล้วพบว่าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ใช้และคุณภาพของการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงด้านการปฏิบัติเพื่อการบำบัดทางจิต การสอนทางสุขภาพและการดูแลด้านร่างกายของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาลโดยตรงรวมทุกด้านในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม โดยที่กลุ่มทดลองอยู่ในระดับพอใช้ และในกลุ่มควบคุมอยู่ในระดับต่ำ

เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพเป็นรายด้าน พบว่าระดับคุณภาพ ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดอยู่ในระดับต้องปรับปรุงทั้งสองกลุ่ม ส่วนในด้านอื่นๆระดับคุณภาพในกลุ่มทดลองอยู่ในระดับ พอใช้ และในกลุ่มควบคุม อยู่ในระดับต่ำ

#### ตารางที่ 9 ความคิดเห็นของพยาบาลผู้สังเกตเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิก

การใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิก	คะแนนความคิดเห็น (ร้อยละ)		
	เป็นจริงมาก	เป็นจริงปานกลาง	เป็นจริงน้อย
ช่วยทำให้ท่านรู้หลักการนิเทศงานอย่างเป็นระบบ	83.33	16.66	0.00
ช่วยทำให้ท่านรู้จักการวางแผนงาน	83.33	16.66	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการเยี่ยมตรวจ	83.33	16.66	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการสอน	66.66	33.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการประชุมปรึกษา	66.66	33.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการให้คำปรึกษา/แนะนำ	66.66	33.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านปฏิบัติงานได้เป็นลำดับขั้นตอน	50.00	50.00	0.00
ช่วยทำให้ท่านทำงานใกล้ชิดกับพยาบาลประจำการมากขึ้น	50.00	50.00	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีสัมพันธภาพที่ดีกับพยาบาลประจำการดีขึ้น	50.00	50.00	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการให้คำปรึกษา แนะนำ	50.00	50.00	0.00
ช่วยทำให้ท่านทำงานร่วมกับพยาบาลประจำการได้ดีขึ้นในเรื่องการวางแผนการพยาบาล	33.33	66.66	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการเยี่ยมตรวจ	33.33	66.66	0.00

ตารางที่ 9 (ต่อ)

การใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิก	คะแนนความคิดเห็น (ร้อยละ)		
	เป็นจริงมาก	เป็นจริงปานกลาง	เป็นจริงน้อย
ช่วยทำให้ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการประชุมปรึกษา	33.33	66.66	0.00
ช่วยทำให้ท่านทำงานร่วมกับพยาบาลประจำการได้ดีขึ้นในเรื่องการทำงานเป็นทีม	16.66	83.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศเกี่ยวกับการเยี่ยมตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	16.66	83.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศเกี่ยวกับการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	16.66	83.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศเกี่ยวกับการประชุมปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	16.66	83.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านสามารถปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	16.66	83.33	0.00
ช่วยทำให้ท่านมีความพึงพอใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการสอน	16.66	83.33	0.00
ท่านคิดว่าพยาบาลประจำการพอใจในการนิเทศของท่าน	0.00	100.00	0.00
<b>โดยรวม</b>	<b>42.50</b>	<b>57.50</b>	<b>0.00</b>

จากตารางที่ 9 พบว่า พยาบาลผู้นิเทศก็มีความคิดเห็นต่อการนิเทศจากการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกอยู่ในระดับเป็นจริงมาก สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 83.33 มี 3 ข้อรายการได้แก่ การใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกช่วยทำให้รู้หลักการนิเทศงานอย่างเป็นระบบ รู้จักการวางแผนและช่วยทำให้มีความมั่นใจในการปฏิบัติกิจกรรมการนิเทศด้านการเยี่ยมตรวจ ส่วนที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ ข้อรายการที่คิดว่าพยาบาลประจำการพอใจในการนิเทศของพยาบาลผู้นิเทศ

เมื่อพิจารณาโดยรวมจากข้อรายการทั้งหมด ส่วนใหญ่พยาบาลผู้นิเทศก็มีความคิดเห็นต่อการนิเทศโดยใช้รูปแบบการนิเทศทางคลินิกอยู่ในระดับเป็นจริงปานกลางคิดเป็นคะแนนร้อยละ 57.50 และระดับเป็นจริงมากคิดเป็นคะแนนร้อยละ 42.50