

## บทที่ 4

### ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การนำเสนอผลการวิเคราะห์การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ จากกลุ่มตัวอย่าง 150 คน แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และอายุ ระยะที่เข้ารับ การบำบัด การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ ความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ และอายุ การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และ ความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สัญลักษณ์ทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้  
สัญลักษณ์ทางสถิติ

$\bar{X}$	แทน	คะแนนเฉลี่ย
S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r	แทน	สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
n	แทน	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง
p	แทน	ระดับความมีนัยสำคัญ
$\chi^2$	แทน	ค่าสถิติไค-สแควร์

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ และอายุ ความผาสุกทางใจ การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ตารางที่ 6 ความถี่ และร้อยละของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ระยะในการบำบัดรักษา และการประเมินความเครียดของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะเข้ารับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ตัวแปร	ความถี่	ร้อยละ
<b>เพศ</b>		
- ชาย	134	89.3
- หญิง	16	10.7
<b>ระยะการบำบัดรักษา</b>		
- ระยะบำบัดรักษาด้วยยา	54	36
- ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ	96	64
<b>การประเมินความเครียด</b>		
- สูญเสีย/อันตราย	1	.7
- ความทุกข์	1	.7
- ทำหาย	148	98.7

จากตารางที่ 6 พบว่า วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 89.3) เข้ารับการบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ (ร้อยละ 64) และเมื่อแบ่งกลุ่มลักษณะการประเมินความเครียด พบว่า วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าส่วนใหญ่มีการประเมินความเครียดในลักษณะทำหาย (ร้อยละ 98.7)

ตารางที่ 7 ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของอายุ วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะเข้ารับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันจิตเวช

อายุ	ความถี่	ร้อยละ	$\bar{X}$	S.D.
13 - 15 ปี	14	9.3		
16 - 18 ปี	53	35.3		
19 - 21 ปี	83	55.3		
รวม	150	100	18.72	2.24

จากตารางที่ 7 พบว่า วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีอายุอยู่ในช่วง 13 - 21 ปี ซึ่งพบว่า มีอายุช่วง 19 - 21 ปี มากที่สุด และมีอายุโดยเฉลี่ย 18.72 ปี

ตารางที่ 8 ความถี่ ร้อยละ คะแนนเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความพึงพอใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะเข้ารับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันจิตเวช

ความพึงพอใจ	เกณฑ์ (คะแนน)	ความถี่(คน)	ร้อยละ	$\bar{X}$	S.D.
ระดับสูง	73 - 110	56	37.33		
ระดับปานกลาง	61 - 72	42	28		
ระดับต่ำ	0 - 60	52	34.67		
รวม		150	100	66.94	16.77

จากตารางที่ 8 พบว่า วัยรุ่นที่เสพติดยาบ้าซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่าง มีคะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 66.94 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาจำแนกตามระดับพบว่า ร้อยละ 37.33 มีคะแนนความพึงพอใจในระดับสูง ร้อยละ 34.67 มีความพึงพอใจในระดับต่ำ และร้อยละ 28 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ( $\bar{X}$ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการเผชิญความเครียดลักษณะต่างๆ และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ตัวแปร	$\bar{X}$	S.D.
การเผชิญความเครียด		
- ใช้ความสามารถของตนเอง	54.26	7.09
- ใช้แหล่งสนับสนุนอื่นๆ	18.93	4.33
- หลีกเลี่ยงปัญหา	34.93	9.54
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง	30.35	4.84

จากตารางที่ 9 พบว่า วัยรุ่นเสพติดยาบ้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีการเผชิญความเครียดโดยใช้ความสามารถของตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 54.26 (S.D.= 7.09) ส่วนการเผชิญความเครียดโดยใช้แหล่งสนับสนุนอื่นๆ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 18.93 (S.D.= 4.33) และการเผชิญปัญหาแบบหลีกเลี่ยงปัญหา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.93 (S.D.= 9.54) ส่วนความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.35 (S.D.= 4.84)

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ อายุ กับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ โดยใช้สถิติ ไคว์สแควร์ (Chi-square test) ดังแสดงในตารางที่ 10 -11

ตารางที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ (n=150คน)

เพศ	ระดับของความผาสุกทางใจ						$\chi^2$	P-value
	ต่ำ		ปานกลาง		สูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
ชาย	48	32.0	36	24.0	50	33.3	1.060	.589
หญิง	4	2.7	6	4.0	6	4.0		
รวม	52	34.7	42	28	56	37.3		

จากตารางที่10 พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 11 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ กับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับ  
การบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ (n=150คน)

อายุ	ระดับของความผาสุกทางใจ						$\chi^2$	P-value
	ต่ำ		ปานกลาง		สูง			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
13-15 ปี	5	3.3	3	2.0	6	4.0	1.228	.837
16-18 ปี	16	10.7	17	11.3	20	13.3		
19-21 ปี	31	20.7	22	14.7	30	20.0		
รวม	52	34.7	42	28.0	56	37.3		

จากตารางที่11 พบว่า อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่  
เสพติดยาบ้า ขณะรับการรักษาแผนกผู้ป่วยนอก

ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันระหว่าง การประเมินความเครียด การเผชิญความเครียด และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง กับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์

ตัวแปร	r	p-value
การประเมินความเครียด		
ลักษณะทำทนาย	.192	.009
การเผชิญความเครียด		
โดยใช้ความสามารถของตนเอง	.434	.000
โดยใช้แหล่งสนับสนุนอื่นๆ	.152	.031
แบบหลีกเลี่ยงปัญหา	-.563	.000
ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง	.644	.000

จากตารางที่ 12 พบว่า การเผชิญความเครียดแบบหลีกเลี่ยงปัญหา มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( $r = -.563$ ) ส่วนการประเมินความเครียดลักษณะทำทนาย การเผชิญความเครียดโดยใช้ความสามารถของตนเอง การเผชิญความเครียดโดยใช้แหล่งสนับสนุนอื่นๆ และความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกทางใจของวัยรุ่นที่เสพติดยาบ้า ขณะรับการบำบัดรักษาในแผนกผู้ป่วยนอก สถาบันธัญญารักษ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ( $r = .192, .434, .152$  และ  $.644$  ตามลำดับ)