

บรรณานุกรม

หนังสือ

นิยม ปุราคำ. ทฤษฎีของการสำรวจสถิติจากตัวอย่างและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร :
ศ.ส.การพิมพ์, 2517.

ยาเสพติดให้โทษและหลักสูตรอบรม 1 สัปดาห์ เอกสารบทเรียน. [ม.ป.ท.]: 2516

บทความ

"ยาเสพติด ความสูญเสียปีละหมื่นล้าน." วารสารเศรษฐกิจและสังคม 14 (กันยายน -
ตุลาคม 2520): 9 - 20 .

ศุภรัตน์ เลิศพาศิชย์กุล. "นโยบายเกี่ยวกับฝิ่นของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว."
สะพาน (2520): 87 - 116.

เสริน ปุณณะหิตานนท์. "ปัญหา ยาเสพติดในประเทศไทย." วารสารสังคมศาสตร์ 14
(เมษายน 2520): 1 - 12 .

เอกสารอื่น ๆ

จิตร สิทธิอมร และคนอื่น. "การศึกษาปัญหา ยาเสพติดในผู้มารับการรักษาที่โรงพยาบาล
ชัยภูมิรักษ์." รายงานผลงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.

นิพนธ์ วีระสุนทร. "การสำรวจทัศนคติของบุคคลในครอบครัวที่มีต่อ ยาเสพติดและผู้ติดยา
เสพติด." วิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2520.

วิชัย โปษยะจินดา. "การศึกษาปัญหา ยาเสพติดในผู้ต้องโทษผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดใน
ทัณฑสถาน." รายงานผลงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2519.

Books

- Hogg, Robert V., and Craig, Allen T. Introduction to Mathematical Statistics. 2d ed. New York: The Macmillan Co., 1969.
- Haber, Audrey, and Runyon, Richard P. General Statistics. 2d ed. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co., 1971.
- McCoy, Alfred W; Read, Cathleen; and Adams II, Leonard P. The Politics of Heroin in Southeast Asia. New York: Harper & Row Publishers, 1973.
- Nowlis, Helen. Drug Demystified. Paris: The Unesco Press, 1975.
- Siegel, Sidney. Nonparametric Statistics: For the Behavioral Sciences. Tokyo: McGraw-Hill Koyakusha, Ltd., 1956.

Other Materials

- Drug Enforcement Administration. "Fact Sheets." United States Department of Justice, Washington, D.C., 1973.
- Drug Enforcement Administration. "Drugs of Abuse." United States Department of Justice, Washington, D.C., 1973.
- Pornsiri Chatiyononda. "Repeated Drug Addiction." Department of Social Work, Faculty of Social Administration, Thammasat University, 1977.

Vichai Poshyachinda and Chitr Sitthi-Amorn. "Heroin use in Slum
Community Observation on Heroin Injection in a Drug Joint."
Drug Dependence Research Programme Technical Report,
Institute of Health Research Chulalongkorn University, 1977.

ภาคผนวก ก.

ตารางที่ 1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามอายุและกลุ่มผู้ป่วย

ช่วงอายุ (ปี)	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 16	-	-	-	-	-	-
16 - 20	27	21.43	16	23.53	11	18.96
21 - 25	54	42.86	31	45.59	23	39.66
26 - 30	21	16.67	10	14.71	11	18.96
31 - 35	10	7.94	6	8.82	4	6.90
36 - 40	7	5.55	3	4.41	4	6.90
40 ขึ้นไป	7	5.55	2	2.94	5	8.62
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 2 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเฉียบพลันจากไวรัสโคโรนา 2019 จำแนกตามพื้นที่เกิดและกลุ่มผู้ป่วย

พื้นที่เกิด	รวม		กลุ่มรอดไม่ได้		กลุ่มรอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร	104	82.54	57	83.82	47	81.04
ภาคกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร)	13	10.32	8	11.76	5	8.62
ภาคเหนือ	2	1.59	1	1.47	1	1.72
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	-	-	-
ภาคตะวันออก	1	0.79	1	1.47	-	-
ภาคใต้	1	0.79	1	1.47	-	-
จำไม่ได้	3	2.38	-	-	3	5.17
ไม่ระบุ	2	1.59	-	-	2	3.45
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามเขตที่อยู่ก่อนเข้ารับการรักษา 30 วัน และกลุ่มผู้ป่วย

เขต	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้		เขต	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
คลองสาน	5	3.97	3	4.41	2	3.45	พระนคร	3	2.38	1	1.47	2	3.45
คูสิต	6	4.76	1	1.47	5	8.62	พระโขนง	8	6.35	5	7.35	3	5.17
ตลิ่งชัน	1	0.79	-	-	1	1.72	พญาไท	14	11.11	6	8.83	8	13.79
ธนบุรี	12	9.52	9	13.24	3	5.17	ภาษีเจริญ	4	3.17	3	4.41	1	1.72
บางกอกน้อย	8	6.35	6	8.82	2	3.45	ยานนาวา	13	10.32	8	11.77	5	8.62
บางขุนเทียน	2	1.59	1	1.47	1	1.72	ราชบุรีรณะ	3	2.38	1	1.47	2	3.45
บางรัก	8	6.35	4	5.88	4	6.90	สัมพันธวงศ์	7	5.56	2	2.94	5	8.82
บางกะปิ	6	4.76	4	5.88	2	3.45	ห้วยขวาง	2	1.59	2	2.94	-	-
บางเขน	4	3.17	2	2.94	2	3.45	บางกอกใหญ่ มีนบุรี ลาดกระบัง หนอง- จอกี่ หนองแขม	-	-	-	-	-	-
ป้อมปราบฯ	7	5.56	3	4.41	4	6.90	เขตไม่ระบุ	6	4.76	2	2.94	4	6.90
ปทุมวัน	7	5.56	5	7.35	2	3.45	รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 3.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดเทียบกับประชากร 1000 คน จำแนกตามเขต

เขต	จำนวนผู้ป่วย ติดยาเสพติด	จำนวน ประชากร	จำนวนผู้ป่วย ต่อประชากร 1000 คน	เขต	จำนวนผู้ป่วย ติดยาเสพติด	จำนวน ประชากร	จำนวนผู้ป่วย ต่อประชากร 1000 คน
คลองสาน	5	144,664	0.03	พระนคร	3	127,665	0.02
ดุสิต	6	418,392	0.01	พระโขนง	8	461,543	0.02
ตลิ่งชัน	1	57,435	0.02	พญาไท	14	527,059	0.03
ธนบุรี	12	240,724	0.05	ภาษีเจริญ	4	157,152	0.03
บางกอกน้อย	8	366,878	0.02	ยานนาวา	13	364,214	0.04
บางขุนเทียน	2	176,448	0.01	ราชบุรีบูรณะ	3	93,251	0.03
บางรัก	8	112,608	0.07	สัมพันธวงศ์	7	81,314	0.09
บางกะปิ	6	161,869	0.04	ห้วยขวาง	2	97,527	0.02
บางเขน	4	264,968	0.02	มีนบุรี	0	47,115	0
บางกอกใหญ่	0	94,822	0	ลาดกระบัง	0	36,065	0
ป้อมปราบฯ	7	200,316	0.03	หนองจอก	0	47,666	0
ปทุมวัน	7	231,899	0.03	หนองแขม	0	34,015	0

ตารางที่ 4 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามเชื้อชาติและกลุ่มผู้ป่วย

เชื้อชาติ	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไทย	108	85.71	59	86.76	49	84.48
จีน	18	14.29	9	13.24	9	15.52
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 5 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสถานภาพสมรสก่อนติดยาเสพติดและ
กลุ่มผู้ป่วย

สถานภาพสมรส	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	103	81.75	54	79.41	49	84.48
สมรส	4	3.17	1	1.47	3	5.17
อยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียน	15	11.91	9	13.24	6	10.35
สมรสแต่แยกกันอยู่	1	0.79	1	1.47	-	-
หย่า	2	1.59	2	2.94	-	-
หม้าย	-	-	-	-	-	-
ไม่ระบุ	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 6 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสถานภาพสมรสหลังติดยาเสพติดและกลุ่มผู้ป่วย

สถานภาพสมรส	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โสด	79	62.70	42	61.77	37	63.79
สมรส	11	8.73	5	7.35	6	10.35
อยู่ร่วมกันโดยไม่จดทะเบียน	25	19.84	14	20.59	11	18.97
สมรสแต่แยกกันอยู่	2	1.59	1	1.47	1	1.72
หย่า	7	5.56	5	7.35	2	3.45
หม้าย	1	0.79	-	-	1	1.72
ไม่ระบุ	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 7 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามระดับการศึกษาและกลุ่มผู้ป่วย

ระดับการศึกษา	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้รับการศึกษา	4	3.17	2	2.94	2	3.45
ประถมศึกษาตอนต้น	24	19.05	12	17.65	12	20.69
ประถมศึกษาตอนปลาย	26	20.63	16	23.53	10	17.24
มัธยมศึกษาตอนต้น	49	38.89	26	38.24	23	39.66
มัธยมศึกษาตอนปลาย	6	4.76	3	4.41	3	5.17
อาชีวศึกษา	15	11.91	7	10.29	8	13.79
ปริญญาตรี	2	1.59	2	2.94	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 8 จำนวนผู้ป่วยเสพติคที่เรียนหนังสือ จำแนกตามปัญหาระหว่างเรียนและกลุ่มผู้ป่วย

ปัญหา	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มี	106	86.88	57	86.36	49	87.50
มี	15	12.30	9	13.64	6	10.71
- การเรียน	(2)	(13.33)	(1)	(11.11)	(1)	(16.67)
- ครู	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
- เพื่อน	(7)	(46.67)	(4)	(44.45)	(3)	(50.00)
- ครูและเพื่อน	(3)	(20.00)	(1)	(11.11)	(2)	(33.33)
- อื่น ๆ	(3)	(20.00)	(3)	(33.33)	(-)	(-)
ไม่ระบุ	1	0.82	-	-	1	1.79
รวม	122	100.00	66	100.00	56	100.00

ตารางที่ 9 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสาเหตุการหนีโรงเรียนเมื่อสมัยเรียนหนังสือ และกลุ่มผู้ป่วย

สาเหตุ	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคย หนีเรียน	32	26.23	20	30.30	12	21.43
เคย หนีเรียน	90	73.77	46	69.70	44	78.57
- เพื่อสูบบุหรี่	(16)	(17.78)	(11)	(23.91)	(5)	(11.36)
- เพื่อเรียน	(12)	(13.37)	(9)	(19.57)	(3)	(6.82)
- หนีเที่ยว	(55)	(61.11)	(20)	43.48	(35)	(79.55)
- อื่น ๆ	(7)	(7.78)	(6)	13.04	(1)	(2.27)
รวม	122	100.00	66	100.00	56	100.00

ตารางที่ 10 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามประเภทของเพื่อนสนิทและกลุ่มผู้ป่วย

ประเภทเพื่อนสนิท	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มี	41	32.54	21	30.88	20	34.48
มี	85	67.46	47	69.12	38	65.52
-เพื่อนนอกโรงเรียน	(58)	(68.24)	(31)	(65.96)	(27)	(71.05)
-เพื่อนในโรงเรียน	(17)	(20.00)	(7)	(14.89)	(10)	(26.32)
-ทั้งในและนอก โรงเรียน	(10)	(11.76)	(9)	(19.15)	(1)	(2.63)
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00



ตารางที่ 11. จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสถานภาพการศึกษาและกลุ่มผู้ป่วย

สถานภาพการศึกษา	รวม		กลุ่มออกไม่ได้		กลุ่มออกได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
กำลังศึกษา	5	3.97	3	4.41	2	3.45
ไม่ได้ศึกษา	121	96.03	65	95.59	56	96.55
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 12 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสาเหตุที่ออกจากโรงเรียนและกลุ่มผู้ป่วย

สาเหตุที่ออกจาก โรงเรียน	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	25	21.37	19	30.16	6	11.11
ไม่เกี่ยวข้องกับยา:สพ- ติด	91	77.78	44	69.84	47	57.04
ไม่ระบุ	1	0.85	-	-	1	1.85
รวม	117	100	63	100	54	100

ตารางที่ 13 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดาของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 12 ปี และกลุ่มผู้ป่วย

ความสัมพันธ์ของ บิดามารดา	รวม		กลุ่ม อดไม่ได้		กลุ่ม อดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อยู่ด้วยกัน	99	78.58	53	77.95	46	79.31
แยกกันอยู่	8	6.35	4	5.88	4	6.90
หย่า	1	0.79	1	1.47	-	-
บิดาตาย	9	7.15	5	7.35	4	6.90
มารดาตาย	6	4.76	4	5.88	2	3.45
บิดาและมารดาตาย	1	0.79	-	-	1	1.72
อื่น ๆ	1	0.79	-	-	1	1.72
ไม่ระบุ	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 14 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา
ของผู้ป่วยก่อนติดยาเสพติดและกลุ่มผู้ป่วย

ความสัมพันธ์ของ บิดามารดา	รวม		กลุ่ม ออกไม่ได้		กลุ่ม ออกได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
อยู่ด้วยกัน	93	73.81	50	73.54	43	74.14
แยกกันอยู่	7	5.56	3	4.41	4	6.90
หย่า	2	1.59	2	2.94	-	-
บิดาตาย	13	10.32	6	8.82	7	12.07
มารดาตาย	6	4.76	3	4.41	3	5.17
บิดาและมารดาตาย	3	2.38	2	2.94	1	1.72
อื่น ๆ	1	0.79	1	1.47	-	-
ไม่ระบุ	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00



ตารางที่ 15 จำนวนผู้ป๋วยศึดยาเสพติด จำแนกตามการอยู่ร่วมกันของบิดามารดา
ก่อนที่ผู้ป๋วยจะศึดยาเสพติดและกลุ่มผู้ป๋วย

การอยู่ร่วมกันของ บิดามารดา	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ราบรึน	80	86.02	42	84.00	38	88.37
ไม่ราบรึน	11	11.83	8	16.00	3	6.98
ไม่ระบุ	2	2.15	-	-	2	4.65
รวม	93	100.00	50	100.00	43	100.00

ตารางที่ 16 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	36	90.00	30	75.00	28	70.00	29	72.50
บิดา	2	5.00	2	5.00	2	5.00	2	5.00
มารดา	2	5.00	5	12.50	3	7.50	3	7.50
ญาติ	-	-	1	2.50	5	12.50	4	10.00
ภรรยา	-	-	1	2.50	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	1	2.50	1	2.50
อยู่คนเดียว	-	-	1	2.50	1	2.50	1	2.50
รวม	40	100.00	40	100.00	40	100.00	40	100.00

ตารางที่ 16.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ขอไม่ได้ที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	16	88.89	14	77.76	13	72.20	14	77.76
บิดา	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
มารดา	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
ญาติ	-	-	1	5.56	1	5.56	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	1	5.56	1	5.56
อยู่คนเดียว	-	-	1	5.56	1	5.56	1	5.56
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 16.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รอดได้ที่ได้รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	20	90.90	16	72.72	15	68.18	15	68.18
บิดา	1	4.55	1	4.55	1	4.55	1	4.55
มารดา	1	4.55	4	18.18	2	9.09	2	9.09
ญาติ	-	-	-	-	4	18.18	4	18.18
ภรรยา	-	-	1	4.55	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	22	100.00	22	100.00	22	100.00	22	100.00

ตารางที่ 17 จำนวนผู้ติดเชื้อเสียดทั้งหมดที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดเชื้อเสียด		ขณะติดเชื้อเสียด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	28	82.35	24	70.59	21	61.76	22	64.70	18	52.94
บิดา	1	2.94	1	2.94	1	2.94	1	2.94	1	2.94
มารดา	2	5.88	6	17.65	7	20.59	7	20.59	8	23.53
ญาติ	3	8.83	2	5.88	2	5.88	2	5.88	4	11.77
ภรรยา	-	-	-	-	1	2.94	1	2.94	1	2.94
เพื่อน	-	-	-	-	2	5.88	1	2.94	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	2.94	-	-	-	-	2	5.88
รวม	34	100.00	34	100.00	34	99.99	34	100.00	34	100.00

ตารางที่ 17.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	13	76.47	12	70.59	10	58.82	11	64.71	10	58.82
บิดา	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
มารดา	2	11.77	3	17.65	4	23.53	4	23.53	4	23.53
ญาติ	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88	2	11.77
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	1	5.88	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	17	100.00	17	100.00	17	99.99	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 17.2 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่อดใจที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนจิตเวชเสถียร		ขณะจิตเวชเสถียร		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	15	88.24	12	70.59	11	64.71	11	64.71	8	47.07
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	-	-	3	17.65	3	17.65	3	17.65	4	23.53
ญาติ	2	11.76	1	5.88	1	5.88	1	5.88	2	11.76
ภรรยา	-	-	-	-	1	5.88	1	5.88	1	5.88
เพื่อน	-	-	-	-	1	5.88	1	5.88	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	5.88	-	-	-	-	2	11.76
รวม	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 18 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่มารับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	11	61.11	8	44.44	8	44.44	8	44.44	8	44.44	8	44.44
บิดา	2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11
มารดา	2	11.11	4	22.22	4	22.22	4	22.22	4	22.22	4	22.22
ญาติ	3	16.67	3	16.67	3	16.67	3	16.67	3	16.67	3	16.67
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 18.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	6	54.55	5	45.46	5	45.46	5	45.46	5	45.46	5	45.46
บิดา	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09
มารดา	2	18.18	3	27.27	3	27.27	3	27.27	3	27.27	3	27.27
ญาติ	2	18.18	2	18.18	2	18.18	2	18.18	2	18.18	2	18.18
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00

ตารางที่ 18.2 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเสพติดที่รอดได้ที่ได้รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดเชื้อเสพติด		ขณะติดเชื้อเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	5	71.42	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86
บิดา	1	14.29	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
มารดา	-	-	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
ญาติ	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 19 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12ปี		ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2		หลังการรักษาครั้งที่ 3		หลังการรักษาครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	12	85.72	8	57.13	6	42.86	6	42.86	6	42.86	6	42.86	6	42.86
บิดา	1	7.14	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29
มารดา	-	-	2	14.29	3	21.42	3	21.42	3	21.42	3	21.42	3	21.42
ญาติ	1	7.14	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	1	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00

ตารางที่ 19.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	8	88.89	5	55.56	4	44.45	4	44.45	4	44.45	4	44.45	4	44.45
บิดา	1	11.11	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22
มารดา	-	-	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	1	11.11	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00

ตารางที่ 19.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดโคที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12ปีก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2		หลังการรักษาครั้งที่ 3		หลังการรักษาครั้งที่ 4			
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
บิดามารดา	4	80.00	3	60.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	-	-	-	-	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
ญาติ	1	20.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

ตารางที่ 20 จำนวนผู้เข้าศึกษาเสขศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่รับการตรวจ 6 ครั้งขึ้นไป จำนวนตามบุคคลที่อาศัยอยู่ ณ ช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนศึกษาเสขศึกษ		ขณะศึกษาเสขศึกษ		หลังการตรวจ ครั้งที่ 1		หลังการตรวจ ครั้งที่ 2		หลังการตรวจ ครั้งที่ 3		หลังการตรวจ ครั้งที่ 4		หลังการตรวจ ครั้งที่ 5	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	17	85.00	10	50.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00
บิดา	-	-	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
มารดา	3	15.00	7	35.00	7	35.00	7	35.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00
ญาติ	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
สหวิทยา	-	-	1	5.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	5.00	1	5.00	1	5.00	2	10.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
รวม	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00

ตารางที่ 20.1 จำนวนผู้ป่วยศึกษาเพศศึกษาที่ไม่ได้รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำนวนตามบุคคลที่อาศัยอยู่และช่วงเวลา

บุคคลที่อาศัยอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนศึกษาเพศศึกษา		ขณะศึกษาเพศศึกษา		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งที่ 5	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	12	92.31	7	53.85	6	46.15	6	46.15	6	46.15	6	46.15	6	46.15	6	46.15
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	1	7.69	4	30.77	4	30.78	4	30.78	3	23.08	3	23.08	3	23.08	3	23.08
ญาติ	-	-	-	-	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69
ภรรยา	-	-	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	2	15.39	2	15.39	2	15.39
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่คนเดียว	-	-	1	7.69	1	7.69	1	7.69	2	15.39	1	7.69	1	7.69	1	7.69
รวม	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00

ตารางที่ 20.2 จำนวนผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกที่เข้ารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำนวนความผิดปกติที่อาจมีอยู่และชั่วคราว

บุคคลที่อาจมีอยู่	อายุต่ำกว่า 12 ปี		ก่อนศัลยกรรมกระดูก		ขณะศัลยกรรมกระดูก		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งที่สุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
พิการทางตา	5	71.43	3	42.86	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57
บิดา	-	-	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
มารดา	2	28.57	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กรรมกร	-	-	-	-	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่กับเดียว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 21 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่ได้รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
 ที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับผู้ช่วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลา ส่วนใหญ่อยู่กับผู้ช่วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษารั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	2.50	2	5.00	2	5.00
บิดา	-	-	2	5.00	3	7.50
มารดา	3	7.50	4	10.00	3	7.50
ญาติ	1	2.50	1	2.50	2	5.00
ภรรยา	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	32	80.00	23	57.50	20	50.00
อยู่คนเดียว	3	7.50	8	20.00	10	25.00
รวม	40	100.00	40	100.00	40	100.00

ตารางที่ 21.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับผู้ช่วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่กับผู้ช่วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	1	5.56	1	5.56
บิดา	-	-	1	5.56	1	5.56
มารดา	2	11.11	2	11.11	2	11.11
ญาติ	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	14	77.78	9	50.00	8	44.44
อยู่คนเดียว	2	11.11	5	27.77	6	33.33
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 21.2 จำนวนผู้ติดยาเสพติดที่ขอได้ที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้ เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	4.55	1	4.55	1	4.55
บิดา	-	-	1	4.55	2	9.09
มารดา	1	4.55	2	9.09	1	4.55
ญาติ	1	4.55	1	4.55	2	9.09
ภรรยา	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	18	81.80	14	63.68	12	54.54
อยู่คนเดียว	1	4.55	3	13.63	4	18.18
รวม	22	100.00	22	100.00	22	100.00

ตารางที่ 22 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลา ส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	3	8.82	1	2.94	2	5.88	2	5.88
บิดา	4	11.77	4	11.77	5	14.72	4	11.77
มารดา	4	11.77	8	23.53	11	32.35	11	32.35
ญาติ	2	5.88	2	5.88	3	8.82	3	8.82
ภรรยา	-	-	1	2.94	1	2.94	1	2.94
เพื่อน	18	52.94	9	26.47	9	26.47	9	26.47
อยู่คนเดียว	3	8.82	9	26.47	3	8.82	4	11.77
รวม	34	100.00	34	100.00	34	100.00	34	100.00



ตารางที่ 22.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลา ส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
บิดา	3	17.65	3	17.65	4	23.53	3	17.65
มารดา	2	11.76	4	23.53	5	29.42	6	35.29
ญาติ	1	5.88	1	5.88	2	11.76	1	5.88
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	9	52.95	1	5.88	3	17.65	3	17.65
อยู่คนเดียว	1	5.88	7	41.18	2	11.76	3	17.65
รวม	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 22.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ออกได้ที่ได้รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลา ส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	2	11.76	-	-	1	5.88	1	5.88
บิดา	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
มารดา	2	11.76	4	23.53	6	35.30	5	29.42
ญาติ	1	5.88	1	5.88	1	5.88	2	11.76
ภรรยา	-	-	1	5.88	1	5.88	1	5.88
เพื่อน	9	52.96	8	47.07	6	35.30	6	35.30
อยู่คนเดียว	2	11.76	2	11.76	1	5.88	1	5.88
รวม	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 23 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2		หลังการรักษาครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	3	16.66	3	16.66	3	16.66	3	16.66	3	16.66
บิดา	-	-	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
มารดา	3	16.66	1	5.56	2	11.11	1	5.56	1	5.56
ญาติ	1	5.56	1	5.56	1	5.56	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	1	5.56	1	5.56
เพื่อน	10	55.56	9	50.00	8	44.45	9	50.00	9	50.00
อยู่คนเดียว	1	5.56	3	16.66	3	16.66	3	16.66	3	16.66
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 23.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำนวนตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่1		หลังการรักษาครั้งที่2		หลังการรักษาครั้งที่3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09
บิดา	-	-	1	9.09	1	9.09	1	9.09	1	9.09
มารดา	3	27.27	1	9.09	2	18.18	1	9.09	1	9.09
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	7	63.64	6	54.55	5	45.46	6	54.55	6	54.55
อยู่คนเดียว	-	-	2	18.18	2	18.18	2	18.18	2	18.18
รวม	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00

ตารางที่ 23.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รอดได้ที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่1		หลังการรักษาครั้งที่2		หลังการรักษาครั้งที่3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ญาติ	1	14.29	1	14.29	1	14.29	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	1	14.29	1	14.29
เพื่อน	3	42.85	3	42.85	3	42.85	3	42.85	3	42.85
อยู่คนเดียว	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 24 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่ได้รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	7.14	-	-	-	-	1	7.14	1	7.14	1	7.14
บิดา	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14
มารดา	4	28.58	1	7.14	1	7.14	3	21.43	3	21.43	3	21.43
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14
เพื่อน	7	50.00	7	50.00	8	57.15	6	42.86	5	35.72	5	35.72
อยู่คนเดียว	1	7.14	4	28.58	3	21.43	2	14.29	3	21.43	3	21.43
รวม	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00

ตารางที่ 24.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ขอไม่ได้ที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	11.11	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11	1	11.11
บิดา	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
มารดา	2	22.22	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
เพื่อน	4	44.45	4	44.45	5	55.56	4	44.45	3	33.34	3	33.34
อยู่คนเดียว	1	11.11	2	22.22	1	11.11	1	11.11	2	22.22	2	22.22
รวม	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00

ตารางที่ 24.2 จำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่อดไตที่ได้รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	2	40.00	-	-	-	-	2	40.00	2	40.00	2	40.00
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	3	60.00	3	60.00	3	60.00	2	40.00	2	40.00	2	40.00
อยู่คนเดียว	-	-	2	40.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
รวม	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

ตารางที่ 25 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	6	30.00	4	20.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00	6	30.00
ญาติ	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
ภรรยา	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
เพื่อน	10	50.00	12	60.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00	9	45.00
อยู่คนเดียว	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00
รวม	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00

ตารางที่ 25.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ
และช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับ	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	3	23.08	3	23.08	4	30.77	4	30.77	4	30.77	4	30.77	4	30.77
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	9	69.23	8	61.54	7	53.85	7	53.85	7	53.85	7	53.85	7	53.85
อยู่คนเดียว	-	-	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69
รวม	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00

ตารางที่ 25.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ออกได้ที่ได้รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วยและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ด้วย	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	3	42.85	1	14.29	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57
ญาติ	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
ภรรยา	-	-	-	-	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
เพื่อน	1	14.29	4	57.13	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57
อยู่คนเดียว	2	28.57	1	14.29	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 26 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	2.50	1	2.50	1	2.50
บิดา	3	7.50	2	5.00	2	5.00
มารดา	12	30.00	13	32.50	15	37.50
ญาติ	10	25.00	10	25.00	10	25.00
ภรรยา	1	2.50	2	5.00	1	2.50
เพื่อน	7	17.50	6	15.00	4	10.00
อื่น ๆ	1	2.50	1	2.50	1	2.50
ไม่มี	4	10.00	4	10.00	5	12.50
ไม่ระบุ	1	2.50	1	2.50	1	2.50
รวม	40	100.00	40	100.00	40	100.00

ตารางที่ 26.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ขอไม่ได้ที่มารับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตาม
บุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-
บิดา	2	11.11	1	5.56	1	5.56
มารดา	7	38.89	8	44.43	8	44.43
ญาติ	2	11.11	2	11.11	2	11.11
ภรรยา	-	-	2	11.11	1	5.56
เพื่อน	3	16.66	1	5.56	1	5.56
อื่น ๆ	1	5.56	1	5.56	1	5.56
ไม่มี	2	11.11	2	11.11	3	16.66
ไม่ระบุ	1	5.56	1	5.56	1	5.56
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 26.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้ที่ได้รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	4.55	1	4.55	1	4.55
บิดา	1	4.55	1	4.55	1	4.55
มารดา	5	22.73	5	22.73	7	31.82
ญาติ	8	36.36	8	36.36	8	36.36
ภรรยา	1	4.55	-	-	-	-
เพื่อน	4	18.18	5	22.73	3	13.64
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
ไม่มี	2	9.08	2	9.08	2	9.08
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-
รวม	22	100.00	22	100.00	22	100.00

ตารางที่ 27 จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	2.94	1	2.94	2	5.88	2	5.88
บิดา	3	8.82	3	8.82	5	14.71	4	11.77
มารดา	10	29.42	10	29.42	10	29.42	10	29.42
ญาติ	8	23.53	8	23.53	9	26.47	9	26.47
ภรรยา	1	2.94	1	2.94	1	2.94	1	2.94
เพื่อน	2	5.88	2	5.88	3	8.82	3	8.82
อื่น ๆ	7	20.59	7	20.59	2	5.88	3	8.82
ไม่มี	2	5.88	2	5.88	2	5.88	2	5.88
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34	100.00	34	100.00	34	100.00	34	100.00

ตารางที่ 27.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำนวนตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
บิดา	1	5.88	1	5.88	3	17.66	3	17.66
มารดา	6	35.29	6	35.29	5	29.41	6	35.29
ญาติ	4	23.53	4	23.53	5	29.41	4	23.53
ภรรยา	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
เพื่อน	1	5.88	1	5.88	1	5.88	1	5.88
อื่น ๆ	3	17.66	3	17.66	1	5.88	1	5.88
ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 27.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้ที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามบุคคล
ที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติด ยาเสพติด		ขณะติด ยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	1	5.89	1	5.89
บิดา	2	11.76	2	11.76	2	11.76	1	5.89
มารดา	4	23.53	4	23.53	5	29.41	4	23.53
ญาติ	4	23.53	4	23.53	4	23.53	5	29.41
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	1	5.89	1	5.89	2	11.76	2	11.76
อื่น ๆ	4	23.53	4	23.53	1	5.89	2	11.76
ไม่มี	2	11.76	2	11.76	2	11.76	2	11.76
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	17	100.00	17	100.00	17	100.00	17	100.00

ตารางที่ 28 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2		หลังการรักษาครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11	2	11.11
บิดา	1	5.56	-	-	-	-	1	5.56	1	5.56
มารดา	6	33.33	7	38.89	6	33.33	5	27.77	5	27.77
ญาติ	4	22.21	4	22.21	4	22.21	4	22.21	4	22.21
ภรรยา	1	5.56	1	5.56	3	16.67	3	16.67	3	16.67
เพื่อน	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
อื่น ๆ	2	11.11	2	11.11	1	5.56	1	5.56	1	5.56
ไม่มี	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56	1	5.56
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 28.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่1		หลังการรักษาครั้งที่2		หลังการรักษาครั้งที่3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	1	9.09	-	-	-	-	1	9.09	1	9.09
มารดา	6	54.55	7	63.64	6	54.55	5	45.46	5	45.46
ญาติ	4	36.36	4	36.36	4	36.36	4	36.36	4	36.36
ภรรยา	-	-	-	-	1	9.09	1	9.09	1	9.09
เพื่อน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00	11	100.00

ตารางที่ 28.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้ที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษาครั้งที่ 1		หลังการรักษาครั้งที่ 2		หลังการรักษาครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57	2	28.57
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ญาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภรรยา	1	14.29	1	14.29	2	28.56	2	28.56	2	28.56
เพื่อน	2	28.56	2	28.56	1	14.29	1	14.29	1	14.29
อื่น ๆ	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
ไม่มี	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 29 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำนวนตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	2	14.29	2	14.29	-	-	-	-
มารดา	6	42.86	4	28.57	4	28.56	4	28.56	5	35.70	5	35.70
ญาติ	3	21.43	3	21.43	1	7.14	1	7.14	2	14.29	2	14.29
ภรรยา	-	-	1	7.14	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29
เพื่อน	4	28.57	3	21.43	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29
อื่น ๆ	-	-	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29	2	14.29
ไม่มี	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14	1	7.14
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00	14	100.00

ตารางที่ 29.1 จำนวนผู้ศึกษาเพศผิดที่ตกไม่ได้ที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดเชื้อยาเสพติด		ขณะติดเชื้อยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	5	55.56	4	44.45	3	33.34	3	33.34	3	33.34	3	33.34
ญาติ	2	22.22	2	22.22	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
ภรรยา	-	-	1	11.11	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22
เพื่อน	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22	2	22.22
อื่น ๆ	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11	1	11.11	1	11.11
ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00	9	100.00

ตารางที่ 29.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ออกได้ที่ได้รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	2	40.00	2	40.00	-	-	-	-
มารดา	1	20.00	-	-	1	20.00	1	20.00	2	40.00	2	40.00
ญาติ	1	20.00	1	20.00	-	-	-	-	1	20.00	1	20.00
ภรรยา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เพื่อน	2	40.00	1	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ	-	-	2	40.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
ไม่มี	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00	1	20.00
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

ตารางที่ 30 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่ได้รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งที่สุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	10	50.00	9	45.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00	8	40.00
ญาติ	4	20.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00
ภรรยา	1	5.00	2	10.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00	3	15.00
เพื่อน	4	20.00	5	25.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00	4	20.00
อื่น ๆ	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
ไม่มี	-	-	-	-	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00	1	5.00
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00

ตารางที่ 30.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	6	46.15	6	46.15	5	38.47	5	38.47	5	38.47	5	38.47	5	38.47
ญาติ	3	23.08	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38
ภรรยา	1	7.69	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38
เพื่อน	3	23.08	3	23.08	3	23.08	3	23.08	3	23.08	3	23.08	3	23.08
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่มี	-	-	-	-	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69	1	7.69
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00

ตารางที่ 30.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่วัดได้ที่รับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยสนิทที่สุดและช่วงเวลา

บุคคลที่ผู้ป่วย สนิทที่สุด	ก่อนติดยาเสพติด		ขณะติดยาเสพติด		หลังการรักษา ครั้งที่ 1		หลังการรักษา ครั้งที่ 2		หลังการรักษา ครั้งที่ 3		หลังการรักษา ครั้งที่ 4		หลังการรักษา ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
บิดามารดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บิดา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มารดา	4	57.14	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86	3	42.86
ญาติ	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
ภรรยา	-	-	-	-	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29	1	14.29
เพื่อน	1	14.29	2	28.57	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
อื่น ๆ	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28	1	14.28
ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไม่ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 31 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามบุคคลที่ผู้ป่วยคิดว่าผู้ปกครองรักมากที่สุด และกลุ่มผู้ป่วย

บุคคลที่ผู้ป่วยคิดว่า ผู้ปกครองรักมากที่สุด	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ตัวผู้ป่วยเอง	54	42.86	32	47.06	22	37.93
บุคคลอื่น	34	26.98	14	20.59	20	34.47
รักเท่า ๆ กัน	19	15.08	10	14.71	9	15.52
ไม่ทราบ	17	13.49	11	16.17	6	10.34
ไม่ตอบ	2	1.59	1	1.47	1	1.72
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 32 จำนวนผู้ป่วยศึกษาเสพติด จำแนกตามสถานภาพการทำงานและกลุ่มผู้ป่วย

สถานภาพการทำงาน	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
นักเรียนนักศึกษา	5	3.97	3	4.41	2	3.45
ไม่มีงานทำ	49	38.89	30	44.12	19	32.76
มีงานทำ	72	57.14	35	51.47	37	63.79
- ข้าราชการ	(2)	(2.78)	(-)	(-)	(2)	(5.41)
- ลูกจ้าง	(42)	(58.33)	(23)	(65.71)	(19)	(51.35)
- ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว	(24)	(33.33)	(8)	(22.86)	(16)	(43.24)
- ไม่ระบุ	(4)	(5.56)	(4)	(11.43)	(-)	(-)
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 33 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามจำนวนวันที่ทำงานและกลุ่มผู้ป่วย

จำนวนวันที่ทำงาน	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่แน่นอน	13	18.05	8	22.86	5	13.51
ทำงานทุกวัน	37	51.39	17	48.57	20	54.05
ทำทุกวัน เว้นวัน อาทิตย์	12	16.67	6	17.14	6	16.22
ทำทุกวัน เว้นวัน เสาร์และอาทิตย์	10	13.89	4	11.43	6	16.22
รวม	72	100.00	35	100.00	37	100.00



ตารางที่ 34 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามรายได้ประจำต่อเดือนและกลุ่มผู้ป่วย

รายได้ประจำ (บาท)	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่แน่นอน	16	22.22	11	31.43	5	13.51
ต่ำกว่า 1001	7	9.72	3	8.57	4	10.81
1001 - 2000	28	38.89	11	31.43	17	45.95
2001 - 3000	10	13.89	3	8.57	7	18.91
มากกว่า 3000	10	13.89	6	17.14	4	10.82
ไม่ระบุ	1	1.39	1	2.86	-	-
รวม	72	100.00	35	100.00	37	100.00

ตารางที่ 35 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามแหล่งที่มาของรายได้พิเศษและกลุ่มผู้ป่วย

แหล่งที่มาของ รายได้พิเศษ	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ไม่มี	46	36.51	23	33.82	23	39.66
มี	80	63.49	45	66.18	35	60.34
-การประกอบอาชีพ สุจริต	(14)	(17.50)	(7)	(15.56)	(7)	(20.00)
-การประกอบอาชีพ ทุจริต	(5)	(6.25)	(4)	(8.89)	(1)	(2.86)
-บิดามารดา	(27)	(33.75)	(20)	(44.44)	(7)	(20.00)
-ญาติ	(5)	(6.25)	(2)	(4.45)	(3)	(8.57)
-ภรรยา	(1)	(1.25)	(-)	(-)	(1)	(2.86)
-บิดามารดาและ อื่น ๆ	(24)	(30.00)	(11)	(24.44)	(13)	(37.14)
-อื่น ๆ	(4)	(5.00)	(1)	(2.22)	(3)	(8.57)
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 36 จำนวนผู้ป่วยพิศยาเสพติด จำแนกตามอายุที่เริ่มใช้ยาเสพติดและกลุ่มผู้ป่วย

อายุ (ปี)	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 16	38	30.16	24	35.29	14	24.14
16 - 20	67	53.18	35	51.47	32	55.17
21 - 25	16	12.70	6	8.83	10	17.24
26 - 30	4	3.17	2	2.94	2	3.45
มากกว่า 30	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 37 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามอายุที่เริ่มติดยาเสพติดและกลุ่มผู้ป่วย

อายุ (ปี)	รวม		กลุ่มขอไม่ได้		กลุ่มขอได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 16	17	13.49	11	16.18	6	10.35
16 - 20	71	56.35	39	57.35	32	55.17
21 - 25	25	19.84	10	14.71	15	25.86
26 - 30	11	8.73	7	10.29	4	6.90
มากกว่า 30	2	1.59	1	1.47	1	1.72
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 38 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามชนิดของยาเสพติดชนิดแรกที่ใช้และกลุ่มผู้ป่วย

ชนิดยาเสพติด	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ฝิ่น	11	8.73	4	5.88	7	12.07
กัญชา	79	62.70	42	61.77	37	63.79
ยาระงับประสาท	3	2.38	3	4.41	-	-
มอร์ฟิน	-	-	-	-	-	-
เฮโรอีน	33	26.19	19	27.94	14	24.14
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 39 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามชนิดของยาเสพติดชนิดแรกที่ติดและ
กลุ่มผู้ป่วย

ชนิดยาเสพติด	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ฝิ่น	9	7.14	3	4.41	6	10.35
กัญชา	23	18.25	16	23.53	7	12.07
ยาระงับประสาท	1	0.79	1	1.47	-	-
มอร์ฟีน	1	0.79	-	-	1	1.72
เฮโรอีน	92	73.03	48	70.59	44	75.86
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 40 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามชนิดของยาเสพติดที่ผู้ป่วยใช้
30 วันก่อนเข้ารับการรักษาและกลุ่มผู้ป่วย

ชนิดยาเสพติด	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ฝิ่น	2	1.59	1	1.47	1	1.72
มอร์ฟีน	4	3.17	2	2.94	2	3.45
เฮโรอีน	113	89.68	61	89.71	52	89.66
เฮโรอีนและอื่น ๆ	7	5.56	4	5.88	3	5.17
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 41 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามชนิดของยาเสพติดและวิธีใช้ครั้งสุดท้าย

วิธีใช้	เฮโรอีนชนิดผงขาว		เฮโรอีนชนิดอื่น		ฝิ่น		กัญชา		มอร์ฟีน	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
สูบ	5	4.31	42	93.33	22	81.48	84	100.00	-	-
กิน	-	-	-	-	5	18.52	-	-	-	-
ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ	4	3.45	-	-	-	-	-	-	4	26.67
ฉีดเข้าเส้น	107	92.24	3	6.67	-	-	-	-	11	73.33
รวม	116	100.00	45	100.00	27	100.00	84	100.00	15	100.00

ตารางที่ 42 จำนวนผู้ป่วยติดเฮอร์ปส์ จำนวนตามปริมาณที่ใช้ต่อวันในช่วง 30 วันก่อน
เข้ารับการรักษาและกลุ่มผู้ป่วย

ปริมาณที่ใช้ต่อวัน (มิลลิกรัม)	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
น้อยกว่า 201	22	18.33	10	15.38	12	21.82
201 - 400	32	26.67	19	29.23	13	23.64
401 - 600	47	39.17	24	36.92	23	41.82
601 - 800	4	3.33	3	4.62	1	1.81
801 - 1,000	14	11.67	9	13.85	5	9.10
ไม่ระบุ	1	0.83	-	-	1	1.81
รวม	120	100.00	65	100.00	55	100.00

ตารางที่ 43 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดเฮโรอีน จำแนกตามปริมาณยาที่เข้ามาครั้งต่อครั้ง และกลุ่มผู้ป่วย

ปริมาณยาที่ใช้ต่อครั้ง (มิลลิกรัม)	รวม		กลุ่มของไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1 - 50	31	25.83	14	21.54	17	30.91
51 - 100	50	41.67	25	38.46	25	45.46
101 - 200	29	24.17	20	30.77	9	16.36
200 ขึ้นไป	7	5.83	4	6.15	3	5.46
ไม่แน่นอน	2	1.67	2	3.08	-	-
ไม่ระบุ	1	0.83	-	-	1	1.81
รวม	120	100.00	65	100.00	55	100.00

ตารางที่ 44 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตาม เวลาที่ได้รับ เฮโรอีน เป็นครั้งแรกและกลุ่มผู้ป่วย

เวลาที่ได้รับ	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ในขณะที่เรียนหนังสือ	35	28.69	22	33.33	13	23.21
ออกจากโรงเรียนแล้ว	87	71.31	44	66.67	43	76.79
รวม	122	100.00	66	100.00	56	100.00

ตารางที่ 45 จำนวนผู้ป่วยบิดยาเสพติด จำแนกตาม เวลาที่ได้รับยาเสพติดชนิดอื่นที่ไม่ใช่
เฮโรอีนเป็นครั้งแรกและกลุ่มผู้ป่วย

เวลาที่ได้รับยาเสพติด	รวม		กลุ่มออกไม่ได้		กลุ่มออกได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ในขณะที่เรียนหนังสือ	46	49.46	26	53.06	20	45.45
ออกจากโรงเรียนแล้ว	47	50.54	23	46.94	24	54.55
รวม	93	100.00	49	100.00	44	100.00

ตารางที่ 46 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามบุคคลที่ให้เฮโรอีนอื่นเป็นครั้งแรกและกลุ่มผู้ป่วย

บุคคลที่ให้ เฮโรอีน	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพื่อนร่วมโรงเรียน	31	25.41	20	30.30	11	19.64
เพื่อนนอกโรงเรียน	87	71.31	43	65.15	44	78.57
ตัวเอง	4	3.28	3	4.55	1	1.79
รวม	122	100.00	66	100.00	56	100.00

ตารางที่ 47 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามบุคคลที่ให้ยาเสพติดชนิดอื่นที่ไม่ใช่เฮโรอีน
เป็นครั้งแรกและกลุ่มผู้ป่วย

บุคคลที่ให้ยาเสพติด	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เพื่อนร่วมโรงเรียน	33	35.48	18	36.73	15	34.08
เพื่อนนอกโรงเรียน	56	60.22	31	63.27	25	56.82
ซื้อเอง	2	2.15	-	-	2	4.55
บุคคลอื่น	2	2.15	-	-	2	4.55
รวม	93	100.00	49	100.00	44	100.00



ตารางที่ 48 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามจำนวนเงินที่ใช้ในการเสพยาต่อวันและ
กลุ่มผู้ป่วย

จำนวนเงิน ที่ใช้ในการเสพยาต่อวัน	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ต่ำกว่า 20	2	1.59	2	2.94	-	-
20 - 39	28	22.22	12	17.65	16	27.59
40 - 59	37	29.37	20	29.42	17	29.31
60 - 79	36	28.56	19	27.94	17	29.31
80 - 99	7	5.56	4	5.88	3	5.18
100 - 119	7	5.56	5	7.35	2	3.45
120 - 139	6	4.76	5	7.35	1	1.72
140 ขึ้นไป	2	1.59	1	1.47	1	1.72
ไม่ระบุ	1	0.79	-	-	1	1.72
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 49 จำนวนผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก จำแนกตามการเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดและกลุ่มผู้ป่วย

การเป็นผู้จำหน่ายยา เสพติด	รวม		กลุ่มออกไม่ได้		กลุ่มออกได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เป็น	13	10.32	8	11.76	5	8.62
ไม่เป็น	113	89.68	60	88.24	53	91.38
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 50 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามจำนวนครั้งที่รับการรักษาและกลุ่มผู้ป่วย

จำนวนครั้ง * ที่รับการรักษา	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
2	40	31.75	18	26.47	22	37.93
3	34	26.98	17	25.00	17	29.31
4	18	14.29	11	16.17	7	12.07
5	14	11.11	9	13.24	5	8.62
6 ครั้งขึ้นไป	20	15.87	13	19.12	7	12.07
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

* จำนวนครั้งที่รับการรักษา รวมการรักษาในครั้งปัจจุบันด้วย

ตารางที่ 51 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติด จำแนกตามสถานที่ที่เคยรับการรักษาและกลุ่มผู้ป่วย

สถานที่ที่เคยรับการรักษา	รวม		กลุ่มอดไม่ได้		กลุ่มอดได้	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
โรงพยาบาลรัฐรักษา	96	76.19	50	73.53	46	79.31
โรงพยาบาลรัฐรักษา และอื่น ๆ	29	23.02	17	25.00	12	20.69
อื่น ๆ	1	0.79	1	1.47	-	-
รวม	126	100.00	68	100.00	58	100.00

ตารางที่ 52 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตาม
สาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มา รับการ รักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	5	12.50	8	20.00
พ่อแม่หรือญาติพามา	18	45.00	19	47.50
อยากเลิก	11	27.50	9	22.50
สุขภาพไม่ดี	1	2.50	-	-
อื่น ๆ	5	12.50	4	10.00
รวม	40	100.00	40	100.00

ตารางที่ 52.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำนวน
 ฟ้า้มสาเหตุที่มาารับการรักษาและช่วงเวลาย

สาเหตุที่มาารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	2	11.10	1	5.56
พ่อแม่หรือญาติพามา	10	55.56	12	66.67
อยากเลิก	5	27.78	4	22.22
สุขภาพไม่ดี	-	-	-	-
อื่น ๆ	1	5.56	1	5.56
รวม	18	100.00	18	100.00

ตารางที่ 52.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้ที่ได้รับการรักษา 2 ครั้ง
จำแนกตามสาเหตุที่มาได้รับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มาได้รับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	3	13.64	7	31.82
พ่อแม่หรือญาติพามา	8	36.36	7	31.82
อยากเลิก	6	27.27	5	22.72
สุขภาพไม่ดี	1	4.55	-	-
อื่น ๆ	4	18.18	3	13.64
รวม	22	100.00	22	100.00

ตารางที่ 53 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตาม
สาเหตุที่รับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	9	26.47	10	29.41	12	35.30
พ่อแม่เฝ้าดูยาติพามา	9	26.47	7	20.59	7	20.59
อยากเลิก	8	23.53	10	29.41	11	32.35
สุขภาพไม่ดี	5	14.71	4	11.77	1	2.94
อื่น ๆ	3	8.82	3	8.82	3	8.82
รวม	34	100.00	34	100.00	34	100.00

ตารางที่ 53.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนก
ตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	6	35.29	5	29.41	7	41.18
พ่อแม่หรือญาติพามา	4	23.53	2	11.77	1	5.88
อยากเลิก	3	17.65	4	23.53	5	29.41
สุขภาพไม่ดี	2	11.77	4	23.53	1	5.88
อื่น ๆ	2	11.77	2	11.77	3	17.65
รวม	17	100.01	17	100.01	17	100.00

ตารางที่ 53.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนก
ตามสาเหตุที่มาได้รับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มาได้รับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำ และเคยมาแล้ว	3	17.65	5	29.41	5	29.41
พ่อแม่หรือญาติพามา	5	29.41	5	29.41	6	35.29
อยากเลิก	5	29.41	6	35.29	6	35.29
สุขภาพไม่ดี	3	17.65	-	-	-	-
อื่น ๆ	1	5.88	1	5.88	-	-
รวม	17	100.00	17	99.99	17	99.99

ตารางที่ 54 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตาม
สาเหตุที่มาับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มาับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	4	22.22	5	27.78	8	44.44	8	44.44
พ่อแม่หรือญาติพามา	2	11.11	3	16.67	1	5.56	2	11.11
อยากเลิก	8	44.44	8	44.44	7	38.88	8	44.44
สุขภาพไม่ดี	3	16.67	2	11.11	1	5.56	--	-
อื่น ๆ	1	5.56	-	-	1	5.56	-	-
รวม	18	100.00	18	100.00	18	100.00	18	99.99

ตารางที่ 54.1 จำนวนผู้ป่วยศัลยกรรม เสพติดที่ออกไม่ได้ที่ได้รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนก
ตามสาเหตุที่มาได้รับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มาได้รับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	2	18.18	3	27.27	5	45.45	5	45.45
พ่อแม่หรือญาติพามา	2	18.18	2	18.18	1	9.10	2	18.18
อยากเลิก	3	27.27	4	36.37	3	27.27	4	36.37
สุขภาพไม่ดี	3	27.27	2	18.18	1	9.10	-	-
อื่น ๆ	1	9.10	-	-	1	9.10	-	-
รวม	11	100.00	11	100.00	11	100.02	11	100.00

ตารางที่ 54.2 จำนวนผู้ช่วยศัลยแพทย์ที่อดได้ที่ได้รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนก
ตามสาเหตุที่มาได้รับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มาได้รับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและ เคยมาแล้ว	2	28.57	2	28.57	3	42.86	3	42.86
พ่อแม่หรือญาติพามา	-	-	1	14.29	-	-	-	-
อยากเลิก	5	71.43	4	57.14	4	57.14	4	57.14
สุขภาพไม่ดี	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 55 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำนวนตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและเคยมาแล้ว	1	7.14	5	35.71	2	14.29	2	14.29	3	21.43
พ่อแม่หรือญาติพามา	4	28.57	3	21.43	3	21.43	2	14.29	4	28.57
อยากเลิก	4	28.57	5	35.71	4	28.57	6	42.85	4	28.57
สุขภาพไม่ดี	3	21.43	1	7.14	5	35.71	3	21.43	1	7.14
อื่น ๆ	2	14.29	-	-	-	-	1	7.14	2	14.29
รวม	14	100.00	14	99.99	14	100.00	14	100.00	14	100.00

ตารางที่ 55.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและเคยมาแล้ว	1	11.11	5	55.56	2	22.22	2	22.22	3	33.33
พ่อแม่หรือญาติพามา	3	33.33	3	33.33	3	33.33	2	22.22	3	33.33
อยากเลิก	1	11.11	1	11.11	1	11.11	2	22.22	2	22.22
สุขภาพไม่ดี	2	22.22	-	-	3	33.33	2	22.22	-	-
อื่น ๆ	2	22.22	-	-	-	-	1	11.11	1	11.11
รวม	9	99.99	9	100.00	9	99.99	9	99.99	9	99.99

ตารางที่ 55.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดได้ที่รับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำและเคยมาแล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พ่อแม่หรือญาติพามา	1	20.00	-	-	-	-	-	-	1	20.00
อยากเลิก	3	60.00	4	80.00	3	60.00	4	80.00	2	40.00
สุขภาพไม่ดี	1	20.00	1	20.00	2	40.00	1	20.00	1	20.00
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.00
รวม	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00	5	100.00

ตารางที่ 56 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดทั้งหมดที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มารับ การรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำ และเคยมาแล้ว	6	30.00	6	30.00	9	45.00	10	50.00	9	45.00	9	45.00
พ่อแม่หรือญาติพามา	4	20.00	3	15.00	2	10.00	3	15.00	2	10.00	2	10.00
อยากเลิก	6	30.00	5	25.00	7	35.00	5	25.00	7	35.00	7	35.00
สุขภาพไม่ดี	3	15.00	6	30.00	2	10.00	2	10.00	2	10.00	1	5.00
อื่น ๆ	1	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.00
รวม	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00	20	100.00

ตารางที่ 56.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่อดไม่ได้ที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุที่มารับการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มา รับการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำ และเคยมาแล้ว	1	7.69	2	15.38	3	23.08	4	30.77	3	23.08	3	23.08
พ่อแม่หรือญาติพามา	4	30.77	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38	2	15.38
อยากเลิก	5	38.47	4	30.77	6	46.16	5	38.47	6	46.16	6	46.16
สุขภาพไม่ดี	2	15.38	5	38.47	2	15.38	2	15.38	2	15.38	1	7.69
อื่น ๆ	1	7.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.69
รวม	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00	13	100.00

ตารางที่ 56.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่ออกได้ที่มาบริการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุที่มาบริการรักษาและช่วงเวลา

สาเหตุที่มา บริการรักษา	ครั้งที่ 1		ครั้งที่ 2		ครั้งที่ 3		ครั้งที่ 4		ครั้งที่ 5		ครั้งสุดท้าย	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
ได้รับการแนะนำ และ เคมมาแล้ว	5	71.42	4	57.13	6	85.71	6	85.71	6	85.71	6	85.71
พ่อแม่หรือญาติพามา	-	-	1	14.29	-	-	1	14.29	-	-	-	-
อยากเลิก	1	14.29	1	14.29	1	14.29	-	-	1	14.29	1	14.29
สุขภาพไม่ดี	1	14.29	1	14.29	-	-	-	-	-	-	-	-
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00	7	100.00

ตารางที่ 57.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รับการรักษา 2 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่
กลับมาเสพยาใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 1 และระยะเวลาที่อดได้หลังการ
รักษาครั้งที่ 1

สาเหตุที่ กลับมาเสพยาใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	10	25.00	1	5.56	4	50.00	5	35.71
สิ่งแวดล้อม	9	22.50	1	5.56	2	25.00	6	42.86
ยังไม่หายขาด	17	42.50	15	83.32	1	12.50	1	7.14
ช่วยในการทำงาน	1	2.50	1	5.56	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	3	7.50	-	-	1	12.50	2	14.29
รวม	40	100.00	18	100.00	8	100.00	14	100.00

ตารางที่ 58.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมาเสพใหม่ หลังการรักษาครั้งที่ 1 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 1

สาเหตุที่ กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	10	29.41	2	18.18	7	36.84	1	25.00
สิ่งแวดล้อม	10	29.41	-	-	8	42.11	2	50.00
ยังไม่หายขาด	13	38.24	9	81.82	3	15.79	1	25.00
ช่วยในการทำงาน	1	2.94	-	-	1	5.26	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34	100.00	11	100.00	19	100.00	4	100.00

ตารางที่ 58.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 3 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
เสพติดใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 2 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 2

สาเหตุที่ กลับมาเสพติดใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	9	26.47	1	5.88	3	37.50	5	55.56
สิ่งแวดล้อม	10	29.41	5	29.41	3	37.50	2	22.22
ยังไม่หายขาด	14	41.18	11	64.71	2	25.00	1	11.11
ช่วยในการทำงาน	1	2.94	-	-	-	-	1	11.11
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	34	100.00	17	100.00	8	100.00	9	100.00

ตารางที่ 59.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่รับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
เสพยาใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 1 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 1

สาเหตุที่ กลับมาเสพยาใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	3	16.67	3	20.00	-	-	-	-
สิ่งแวดล้อม	2	11.11	1	6.67	1	50.00	-	-
ยังไม่หายขาด	12	66.67	11	73.33	1	50.00	-	-
ช่วยในการทำงาน	1	5.55	-	-	-	-	1	100.00
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	18	100.00	15	100.00	2	100.00	1	100.00

ตารางที่ 59.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
 เสพใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 2 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ ๕

สาเหตุที่ กลับมา เสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	3	16.67	2	13.33	1	50.00	-	-
สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-	-
ยังไม่หายขาด	14	77.78	13	86.67	1	50.00	-	-
ช่วยในการทำงาน	1	5.55	-	-	-	-	1	100.00
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	18	100.00	15	100.00	2	100.00	1	100.00

ตารางที่ 59.3 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 4 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
เสพใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 3 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 3

สาเหตุที่ กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	4	22.22	2	18.18	2	50.00	-	-
สิ่งแวดล้อม	1	5.55	-	-	-	-	1	33.33
ยังไม่หายขาด	12	66.68	9	81.82	2	50.00	1	33.33
ช่วยในการทำงาน	1	5.55	-	-	-	-	1	33.33
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	18	100.00	11	100.00	4	100.00	3	99.99

ตารางที่ 60.1 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุ

ที่กลับมาเสพใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 1 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษา

ครั้งที่ 1

สาเหตุ ที่กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	2	14.29	1	16.67	-	-	1	100.00
สิ่งแวดล้อม	4	28.57	-	-	4	57.14	-	-
ยังไม่หายขาด	7	50.00	5	83.33	2	28.57	-	-
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	1	7.14	-	-	1	14.29	-	-
รวม	14	100.00	6	100.00	7	100.00	1	100.00



ตารางที่ 60.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
เสพยาใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 2 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 2

สาเหตุที่ กลับมาเสพยาใหม่	รวม		ต่ำกว่า					
			1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญญา	3	21.43	2	20.00	1	25.00	-	-
สิ่งแวดล้อม	3	21.43	3	30.00	-	-	-	-
ยังไม่หายขาด	7	50.00	5	50.00	2	50.00	-	-
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	1	7.14	-	-	1	25.00	-	-
รวม	14	100.00	10	100.00	4	100.00	-	-

ตารางที่ 60.3 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมาเสพติด
หลังการรักษาครั้งที่ 3 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 3

สาเหตุที่ กลับมาเสพติด	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	2	14.29	2	25.00	-	-	-	-
สิ่งแวดล้อม	4	28.57	2	25.00	-	-	2	50.00
ยังไม่หายขาด	7	50.00	4	50.00	1	50.00	2	50.00
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	1	7.14	-	-	1	50.00	-	-
รวม	14	100.00	8	100.00	2	100.00	4	100.00

ตารางที่ 60.4 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มาบริการรักษา 5 ครั้ง จำแนกตามสาเหตุที่กลับมา
 เสพใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 4 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 4

สาเหตุที่ กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	2	14.29	2	22.22	-	-	-	-
สิ่งแวดล้อม	4	28.57	1	11.11	1	100.00	2	50.00
ยังไม่หายขาด	7	50.00	6	66.67	-	-	1	25.00
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	1	7.14	-	-	-	-	1	25.00
รวม	14	100.00	9	100.00	1	100.00	4	100.00

ตารางที่ 61.1 จำนวนผู้ป่วยวิทยาเสพติดที่มาบริการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุที่กลับมาเสพติดหลังการรักษาครั้งที่ 1 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษาครั้งที่ 1

สาเหตุที่กลับมาเสพติดใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	7	35.00	4	28.57	-	-	3	60.00
สิ่งแวดล้อม	3	15.00	2	14.29	1	100.00	-	-
ยังไม่หายขาด	10	50.00	8	57.14	-	-	2	40.00
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	14	100.00	1	100.00	5	100.00

ตารางที่ 61.2 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุ
ที่กลับมาเสพ ใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 2 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษา
ครั้งที่ 2

สาเหตุที่ กลับมาเสพ ใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	7	35.00	4	28.57	-	-	3	60.00
สิ่งแวดล้อม	1	5.00	-	-	1	100.00	-	-
ยังไม่หายขาด	12	60.00	10	71.43	-	-	2	40.00
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	14	100.00	1	100.00	5	100.00

ตารางที่ 61.3 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตามสาเหตุ
ที่กลับมาเสพใหม่หลังการรักษาครั้งที่ 3 และระยะเวลาที่อดได้หลังการรักษา
ครั้งที่ 3

สาเหตุที่ กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	6	30.00	4	23.53	-	-	2	100.00
สิ่งแวดล้อม	2	10.00	2	11.77	-	-	-	-
ยังไม่หายขาด	11	55.00	10	58.82	1	100.00	-	-
ช่วยในการทำงาน	1	5.00	1	5.88	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	17	100.00	1	100.00	2	100.00

ตารางที่ 61.4 จำนวนผู้ป่วยหัตถการที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป

จำแนกตามสาเหตุที่กลับมาเสพใหม่ หลังการรักษาครั้งที่ 4

และระยะเวลาที่รอดได้หลังการรักษาครั้งที่ 4

สาเหตุที่ กลับมาเสพใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	5	25.00	3	21.43	-	-	2	66.67
สิ่งแวดล้อม	2	10.00	2	14.29	-	-	-	-
ยังไม่หายขาด	12	60.00	8	57.14	3	100.00	1	33.33
ช่วยในการทำงาน	1	5.00	1	7.14	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	14	100.00	3	100.00	3	100.00

ตารางที่ 61.5 จำนวนผู้ป่วยติดยาเสพติดที่มารับการรักษา 6 ครั้งขึ้นไป จำแนกตาม
สาเหตุที่กลับมาเสพติดใหม่ หลังการรักษาครั้งสุดท้ายและระยะเวลาที่รอดได้
หลังการรักษาครั้งสุดท้าย

สาเหตุที่ กลับมาเสพติดใหม่	รวม		ต่ำกว่า 1 เดือน		1 - 6 เดือน		6 เดือนขึ้นไป	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
มีปัญหา	5	25.00	2	15.39	1	33.33	2	50.00
สิ่งแวดล้อม	3	15.00	1	7.69	2	66.67	-	-
ยังไม่หายขาด	12	60.00	10	76.92	-	-	2	50.00
ช่วยในการทำงาน	-	-	-	-	-	-	-	-
บำบัดความเจ็บปวด	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	20	100.00	13	100.00	3	100.00	4	100.00

ภาคผนวก ข.

แบบสอบถามผู้ป่วยติดยาเสพติด
สถานที่สอบถามโรงพยาบาลธัญบุรี

ชื่อ.....นามสกุล.....เลขทะเบียน.....
สอบถามวันที่ เดือน พ.ศ.

ก. ข้อมูลพื้นฐาน

1. เกิด พ.ศ. อายุ (นับเต็มปี) ปี
2. สถานที่เกิดอำเภอ จังหวัด
3. ที่อยู่ก่อนรับการรักษา บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด
4. เชื้อชาติ สัญชาติ
5. สถานภาพสมรส

	ก่อนติดยา	หลังติดยา
5.1 โสด	()	()
5.2 สมรส	()	()
5.3 อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้จดทะเบียน	()	()
5.4 สมรสแต่แยกกันอยู่	()	()
5.5 หย่า	()	()
5.6 หม้าย	()	()

ข. ประวัติการศึกษาและสังคม

1. ปีการศึกษาสูงสุดที่สอบได้
2. ชื่อสถานศึกษา
 - 2.1 ระดับประถมศึกษา
 - 2.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 - 2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 - 2.4 ระดับอาชีวศึกษา
 - 2.5 ระดับปริญญาตรี
 - 2.6 อื่น ๆ
3. ระหว่างเรียนเคยมีปัญหาหรือไม่ () เคย () ไม่เคย
ถ้าเคยมีปัญหากเกี่ยวกับ

3.1 () ครู	3.3 () เพื่อน
3.2 () การเรียน	3.4 () อื่น ๆ (ระบุ)
4. เคยหนีโรงเรียนหรือไม่
 - 4.1 () เคย เพราะ
 - 4.2 () ไม่เคย
5. มีเพื่อนสนิทหรือไม่
 - 5.1 () มี
 - 5.2 () ไม่มี
6. เพื่อนสนิทเหล่านี้เป็น
 - 6.1 () เพื่อนร่วมโรงเรียน
 - 6.2 () เพื่อนนอกโรงเรียน
 - 6.3 () มีทั้งเพื่อนร่วมโรงเรียนและนอกโรงเรียน

7. ปัจจุบันยังเป็นนักเรียนนักศึกษา

7.1 () ใช่

7.2 () ไม่ใช่

8. ออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ ปี พ.ศ.

9. สาเหตุที่ออกจากโรงเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม่

9.1 () ใช่

9.2 () ไม่ใช่

ค. ประวัติครอบครัว

1. ความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา เมื่อผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 12 ปี

1.1 () อยู่ด้วยกัน

1.5 () มารดาตาย

1.2 () แยกกันอยู่

1.6 () บิดาและมารดาตาย

1.3 () หย่า

1.7 () อื่น ๆ (ระบุ)

1.4 () บิดาตาย

2. ก่อนติดยาเสพติดครั้งแรกบิดาและมารดาอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นหรือไม่

() ราบรื่น

() ไม่ราบรื่น

3. ผู้ป่วยอาศัยอยู่กับบุคคลใด

	บิดาและมารดา	บิดา	มารดา	บุคคลอื่น(ระบุ)
เมื่ออายุต่ำกว่า 12 ปี	()	()	()
ก่อนติดยาเสพติด (ครั้งแรก)	()	()	()
ในขณะที่ติดยาเสพติด (ครั้งแรก)	()	()	()
หลังจากการรักษาครั้งที่ 1	()	()	()
ครั้งที่ 2	()	()	()
ครั้งที่ 3	()	()	()
ครั้งที่ 4	()	()	()
ครั้งที่ 5	()	()	()

หมายเหตุ ครั้งที่ 5 หมายถึงครั้งสุดท้ายก่อนเข้ารับการรักษา

4. ผู้ป่วยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบุคคลใด

	บิดา	มารดา	เพื่อน	บุคคลอื่น (ระบุ)
ก่อนติดยาเสพติด	()	()	()
ในขณะติดยาเสพติด	()	()	()
หลังการรักษา ครั้งที่ 1	()	()	()
ครั้งที่ 2	()	()	()
ครั้งที่ 3	()	()	()
ครั้งที่ 4	()	()	()
ครั้งที่ 5	()	()	()

5. บุคคลที่รู้สึกว่าเป็นที่สนทที่สุด

	บิดา	มารดา	เพื่อน	บุคคลอื่น (ระบุ)
ก่อนติดยาเสพติด	()	()	()
ในขณะติดยาเสพติด	()	()	()
หลังการรักษา ครั้งที่ 1	()	()	()
ครั้งที่ 2	()	()	()
ครั้งที่ 3	()	()	()
ครั้งที่ 4	()	()	()
ครั้งที่ 5	()	()	()

6. ก่อนติดยาเสพติดคิดว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองรักใคร่มากที่สุด

.....

ง. การประกอบอาชีพ (30 วันก่อนเข้ารับการรักษา)

1. มีอาชีพที่กำลังประกอบอยู่หรือไม่ 1.1 () มี 1.2 () ไม่มี

2. ถ้ามีอาชีพหลัก คือ

2. ยาเสพติดทุกชนิดที่ใช้ 30 วันก่อนมารักษา

ชนิดยาเสพติด	จำนวนวันที่ใช้ต่อเดือน	ปริมาณต่อวัน	ปริมาณมากที่สุดต่อครั้ง

หมายเหตุ ถ้ายาเสพติดชนิดแรกที่ติดคือผงขาวหรือเฮโรอีนไม่ต้องตามข้อ 3 - 4

3. ได้รับยาเสพติดครั้งแรกเมื่อไร

3.1 () ในขณะเรียนหนังสือ 3.2 () ออกจากโรงเรียนแล้ว

4. ได้รับยาเสพติดครั้งแรกจาก

4.1 () เพื่อนในโรงเรียน 4.4 () ญาติพี่น้อง
4.2 () เพื่อนนอกโรงเรียน 4.5 () แพทย์
4.3 () บิดาหรือมารดา 4.6 () บุคคลอื่น (ระบุ)

5. ด้รับผงขาวหรือเฮโรอีนครั้งแรกเมื่อไร

5.1 () ในขณะเรียนหนังสือ 5.2 () ออกจากโรงเรียนแล้ว

6. ด้รับผงขาวหรือเฮโรอีนครั้งแรกจาก

6.1 () เพื่อนในโรงเรียน 6.4 () ญาติพี่น้อง
6.2 () เพื่อนนอกโรงเรียน 6.5 () แพทย์
6.3 () บิดาหรือมารดา 6.6 () บุคคลอื่น (ระบุ)

7. จำนวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อยาเสพติด.....บาท/วัน

8. เป็นผู้จำหน่ายยาเสพติดหรือไม่

10.1 () เป็น 10.2 () ไม่เป็น

ประวัติการศึกษา

ชื่อ นางสาว นารี วงศ์สิโรจน์กุล
วุฒิการศึกษา สถิติศาสตร์บัณฑิต แผนกวิชาสถิติ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อปีการศึกษา 2516
ที่ทำงาน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ

