

การศึกษาการโอบไต่ของแม่ *Leiolepis belliana belliana* ในเกาะเสมสารและเกาะข้างเคียง
จังหวัดชลบุรี



นางสาวชिरุณณ์ ปวงวัฒนา

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาพฤกษศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2544

ISBN 274-03-1279-9

ลิขสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

KARYOLOGICAL STUDIES OF LIZARD *Leiolepis belliana belliana* AT SA-MAE SARN
ISLAND AND NEARBY ISLANDS IN CHON BURI PROVINCE



Miss Vachiraya Puangwanttana

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science in Genetics

Department of Botany

Faculty of Science Chulalongkorn University

Academic Year 2001

ISBN 274-03-1279-9

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาการไอโทปีของแยะ *Leiolepis belliana belliana* ในเกาะ
 แสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี
โดย นางสาว วชิรญาณ์ ปวงวัฒนา
สาขาวิชา พันธุศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. วรุฒิ จุฬาลักษณ์านุกูล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี ปริญญานท์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

..... คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
(รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย โพธิ์พิจริต)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ สุมิตรา คงชื่นสิน)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. วรุฒิ จุฬาลักษณ์านุกูล)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี ปริญญานท์)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ. ญ. ดร. ดวงสมร สุวัฑฒน)

..... กรรมการ
(อาจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์)

นางสาว วชิรญาณ์ ปวงวัฒนา: การศึกษาการไอโทปีของแยะ *Leiolepis belliana belliana* ในเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จังหวัดชลบุรี (KARYOLOGICAL STUDIES OF LIZARD *Leiolepis belliana belliana* AT SA-MAE SARN ISLAND AND NEARBY ISLANDS IN CHONBURI PROVINCE) อ.ที่ปรึกษา : รศ.ดร. วรวิทย์ จุฬาลักษณ์านุกูล, อ.ที่ปรึกษาร่วม : ผศ.ศุสดี ปริยานนท์, 78 หน้า. ISBN 274-03-1279-9

แยะ *Leiolepis belliana belliana* (Gray) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบอยู่ทั่วไปบนเกาะในอ่าวไทยและทุกภาคประเทศไทย แยะมีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยาและเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาคาร์ไอโทปีของแยะ โดยใช้เทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว แล้วย้อมสีแบบธรรมดาและย้อมแถบสีแบบจี จากตัวอย่างของแยะที่พบบนเกาะในอ่าวไทย ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน และเกาะไผ่ อำเภอสัตหีบ และเขาเจ็พเขาชมพู่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จากการศึกษาพบว่าแยะทั้ง 5 ประชากรมีการไอโทปีจากการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาเหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n = 36$ ประกอบด้วยแมคโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1 – 5 มีรูปร่างเป็นเมทาเซนตริก ส่วนแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 6 มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนตริก นอกจากนี้ยังพบเซนตริคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมนั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถที่จะจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และเมื่อย้อมแถบสีแบบจี พบว่า แยะทั้ง 5 ประชากรมีรูปแบบของแถบสีไม่แตกต่างกัน ประโยชน์ของการศึกษาคาร์ไอโทปีของแยะที่ได้จากแหล่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถนำไปใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ในกลุ่มนี้จากแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป

ภาควิชาพฤกษศาสตร์	ลายมือชื่อนิสิต.....
สาขาวิชา พันธุศาสตร์	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา.....
ปีการศึกษา 2544	ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม.....

##4172420023 :MAJOR GENETICS

KEY WORD: *Leiolepis belliana belliana* / LIZARD / CHROMOSOME BANDING / CYTOGENETICS

VACHIRAYA PUANGWANTTANA : KARYOLOGICAL STUDIES OF LIZARD *Leiolepis belliana belliana* AT SA-MAE SARN ISLAND AND NEARBY ISLANDS IN CHON BURI PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASSOC. PROF. WARAWUT CHULALAKSANANUKUL, Ph.D. THESIS COADVISOR : ASSIST. PROF. PUTSATEE PARIYANONTH, 78 pp. ISBN 274-03-1279-9

The *Leiolepis belliana belliana* (Gray), a common reptile found in the all regions including the islands of Thailand, has a very important role in the ecosystem and serves as food resource for human beings. This research was therefore initiated. These animal samples were collected from Sa-maesarn Island, Khram Island, Rin Island and Phai Island at Sataheep District and some animal samples were collected from Khaokheaw and Khaochompoo Sriracha District, Chonburi Province. Chromosomes from lymphocyte cultures were studied by conventional staining and G-banding technique. The result showed that all of these animals have the same chromosome number $2n = 36$, relatively identical in shape and size. The chromosome complements of *L. b. belliana* composed of 12 macrochromosomes and 24 microchromosomes. Six pairs of macrochromosomes were classified as follows: five pairs were of metacentric-type and the other were of submetacentric-type. A secondary constriction was found on the long arm of the first chromosome pair. The microchromosomes were too small to be classified. According to the result obtained from G-banding technique, the specimens from four types of population have the same pattern. This karyotypic information will be useful for further genetic diversity study on the same lizard from other regions of Thailand.

Department of Botany	Student's signature.....
Field of study Genetics	Advisor's signature.....
Academic year 2001	Co-advisor's signature.....

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือของหลายๆ ท่านดังต่อไปนี้

กราบขอบพระคุณภาควิชาพฤกษศาสตร์ที่ให้โอกาสในการศึกษา

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ จุฬาลักษณ์านุกูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผุสดี ปริยานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ให้คำแนะนำ ข้อคิดเห็นและความช่วยเหลือต่างๆ ในการวิจัยด้วยดี

กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุมิตรา คงชื่นสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ. ดร.ดวงสมร สุวิฑฒน และอาจารย์ เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์ ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบและตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์

กราบขอบพระคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนับสนุนการเดินทางไปเก็บตัวอย่างสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

กราบขอบพระคุณหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ที่ให้ความช่วยเหลือในการเดินทางไปเก็บตัวอย่างสัตว์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้

กราบขอบพระคุณบัณฑิตวิทยาลัย ที่ให้ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนและ/หรือวิจัย

ผลงานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทยซึ่งร่วมจัดตั้งโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ รหัสโครงการ BRT 543032 จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพี่ๆ ที่สนับสนุนด้านการเงินและให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมาจนสำเร็จการศึกษา

ท้ายนี้ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ในงานวิจัย

สารบัญ


	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
บทที่ 2 ตรวจเอกสาร.....	3
1. ความสำคัญของแม่.....	3
2. การจัดลำดับทางอนันกรมวิธาน.....	3
3. การศึกษาทางสัณฐานวิทยา.....	4
4. สภาพพื้นที่.....	5
5. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์.....	7
6. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแม่.....	8
บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์และวิธีการศึกษา.....	10
สัตว์ทดลอง.....	10
วัสดุอุปกรณ์.....	10
สารเคมี.....	11
วิธีดำเนินการศึกษา.....	11
1. การเก็บตัวอย่างแม่.....	11
2. การแยกความแตกต่างระหว่างแฮคพศูและเพศเมีย.....	13
3. เตรียมโครโมโซมจากการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว.....	13
3. การย้อมสีแบบธรรมดา.....	13
4. การย้อมแถบสีแบบจี.....	14
5. การวิเคราะห์โครโมโซม.....	14
บทที่ 4 ผลการศึกษา.....	16
1. แ่จากเกาะแสมสาร.....	16

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
1.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	16
1.2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	17
1.3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	20
2. แ่จากเกาะคราม.....	24
2.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	24
2.2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	25
2.3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	28
3. แ่จากเกาะรีน.....	32
3.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	32
3.2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	33
3.3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	36
4. แ่จากเกาะไฝ.....	40
4.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	40
4.2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	41
4.3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	44
5. แ่จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู่.....	48
5.1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	48
5.2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	49
5.3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	52
6. การเปรียบเทียบคาริโอไทป์ของแ่ทั้ง 5 ประชากร.....	55
บทที่ 5 อภิปรายผลการศึษา.....	61
1. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา.....	61
2. การข้อมสึแบบธรรมดา.....	61
3. การข้อมแถบสึแบบจี.....	63
บทที่ 6 สรุปผลการศึษา.....	65
รายการอ้างอิง.....	66
ภาษาไทย.....	66

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ภาษาอังกฤษ.....	66
ภาคผนวก.....	69
ภาคผนวก ก.....	70
ภาคผนวก ข.....	72
ภาคผนวก ค.....	75
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์.....	78



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1. รูปร่างของโครโมโซมที่กำหนดจากค่า NVC.....	15
2. ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของเยื่อจากเกาะแสมสาร.....	17
3. ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของเยื่อจากเกาะคราม.....	25
4. ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของเยื่อจากเกาะรีน.....	33
5. ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของเยื่อจากเกาะไผ่.....	41
6. ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของเยื่อจากพื้นที่ป่า เขาเขียวและเขาชมพู.....	49
7. จำนวนโครโมโซมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จาก การเปรียบเทียบค่า RL ในโครโมโซมแต่ละคู่ของเยื่อ <i>L. b. belliana</i>	
8. จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่า เขาเขียวและเขาชมพู.....	57
9. จำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จาก การเปรียบเทียบค่า RL ในโครโมโซมแต่ละคู่ของเยื่อ <i>L. b. belliana</i>	
10. จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่า เขาเขียวและเขาชมพู.....	57
11. จำนวนโครโมโซมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จาก การเปรียบเทียบค่า NVC ในโครโมโซมแต่ละคู่ของเยื่อ <i>L. b. belliana</i>	
12. จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่า เขาเขียวและเขาชมพู.....	59
12. จำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จาก การเปรียบเทียบค่า RL ในโครโมโซมแต่ละคู่ของเยื่อ <i>L. b. belliana</i>	
13. จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่า เขาเขียวและเขาชมพู.....	59

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
1. แอ้ <i>L. b. belliana</i> (Gray).....	4
2. แผนที่แสดงอายุหิน.....	6
3. การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในช่วง 20,000 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน.....	6
4. สถานที่เก็บตัวอย่างแอ้ เกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรี้น และเกาะไผ่.....	12
5. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศผู้จากเกาะแสมสาร.....	16
6. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศเมียจากเกาะแสมสาร.....	16
7. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแอ้เพศผู้ จากเกาะแสมสาร.....	18
8. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแอ้เพศเมีย จากเกาะแสมสาร.....	19
9. อิติโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแอ้จากเกาะแสมสาร.....	20
10. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้เพศผู้ จากเกาะแสมสาร.....	21
11. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้เพศเมีย จากเกาะแสมสาร.....	22
12. อิติโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้จากเกาะแสมสาร.....	23
13. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศผู้จากเกาะคราม.....	24
14. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศเมียจากเกาะคราม.....	24
15. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแอ้เพศผู้ จากเกาะคราม.....	26
16. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแอ้เพศเมีย จากเกาะคราม.....	27
17. อิติโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแอ้จากเกาะคราม.....	28
18. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้เพศผู้ จากเกาะคราม.....	29
19. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้เพศเมีย จากเกาะคราม.....	30
20. อิติโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแอ้จากเกาะคราม.....	31
21. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศผู้จากเกาะรี้น.....	32
22. แอ้ <i>L. b. belliana</i> เพศเมียจากเกาะรี้น.....	32
23. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแอ้เพศผู้ จากเกาะรี้น.....	34

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
24. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศเมีย จากเกะรีน.....	35
25. อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแย์จากเกะรีน.....	36
26. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์เพศผู้ จากเกะรีน.....	37
27. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์เพศเมีย จากเกะรีน.....	38
28. อิดิโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์จากเกะรีน.....	39
29. แย์ <i>L. b. belliana</i> เพศผู้จากเกะไฝ.....	40
30. แย์ <i>L. b. belliana</i> เพศเมียจากเกะไฝ.....	40
31. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศผู้ จากเกะไฝ.....	42
32. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศเมีย จากเกะไฝ.....	43
33. อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแย์จากเกะไฝ.....	44
34. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์เพศผู้ จากเกะไฝ.....	45
35. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์เพศเมีย จากเกะไฝ.....	46
36. อิดิโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์จากเกะไฝ.....	47
37. แย์ <i>L. b. belliana</i> เพศผู้จากพื้นที่เขาเขียวและเขาชมพู.....	48
38. แย์ <i>L. b. belliana</i> เพศเมียจากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	48
39. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศผู้ จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	50
40. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศเมีย จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	51
41. อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแย์จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	52
42. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแย์เพศผู้ จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	53

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
43. โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ้เพศเมีย จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	54
44. อิติโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ้จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู.....	55
45. อิติโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแฉ้ <i>L. b. belliana</i> เปรียบเทียบค่า RL.....	56
46. อิติโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแฉ้ <i>L. b. belliana</i> เปรียบเทียบค่า NVC....	58
47. อิติโอแกรมจากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ้ <i>L. b. belliana</i>	60



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 1

บทนำ

การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานการศึกษาชนิดพันธุ์ การจัดกลุ่มเพื่อใช้จำแนกสิ่งมีชีวิตให้เป็นหมวดหมู่ การอนุรักษ์พันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์ (Gaedner, Simmons และ Snustad, 1991) เนื่องจากการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์นั้นเป็นการศึกษาเกี่ยวกับจำนวน โครงสร้างและหน้าที่การทำงานของโครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Henriques-Gil, Parker และ Puertas, 1997) โดยการนำภาพของโครโมโซมในระยะเมทาเฟส (metaphase) มาจัดทำคาริโอไทป์ (karyotype) จากประโยชน์ของการศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงได้นำความรู้ทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์มาศึกษาคาริโอไทป์ของแยะ (butterfly lizard, butterfly Agamar) ซึ่งเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในรู พบทั่วไปในสภาพพื้นที่ที่เป็นดินทราย มีลักษณะแห้ง โลงงเดียน และน้ำท่วมไม่ถึง (โรจน์ชัย ศัตรวาทา และไพรัช ทาบสีแพร, 2525) รวมทั้งพื้นที่เกาะต่างๆ ของประเทศไทยด้วยก็พบว่ามีแยะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน แยะนอกจากจะมีประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหารต่อมนุษย์แล้วยังมีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารที่ทำหน้าที่ในการหมุนเวียนถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศที่ทำให้เกิดความสมดุลย์ในธรรมชาติเนื่องจากแยะกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร แม้ว่าแยะจะมีคุณสมบัติดังกล่าวแต่ในปัจจุบันพบว่าปริมาณของแยะที่พบในประเทศไทยมีจำนวนลดลงไปมาก เนื่องจากถูกดักจับมาเป็นอาหารและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมีปริมาณลดลงไปเนื่องจากถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของมนุษย์

แยะที่พบทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ *Leiolepis belliana*, *L. boehmei*, *L. guentherpetersi*, *L. guttata*, *L. peguensis*, *L. reevesii* และ *L. triploid* (Uetz, Etzold และ Chenna, 2000) แต่การจัดลำดับทางอนุกรมวิธานของแยะในระดับวงศ์ (family) ยังไม่ชัดเจนนัก คือ Joger (1991) และ Honda และคณะ (2000) จัดแยะอยู่ในวงศ์ Agamidae ส่วน Macey และคณะ (2000) นั้นจัดแยะแยกออกจากวงศ์ Agamidae ให้อยู่ในวงศ์ Uromastycidae โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษา mitochondrial DNA รวมทั้งชนิดของแยะในประเทศไทยก็ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกัน ดังรายงานของ Taylor (1963) ที่จัดจำแนกแยะที่พบในประเทศไทยออกเป็นทั้งหมด 3 ชนิดย่อย ได้แก่ *L. b. belliana* (Gray), *L. b. rubritaeniata* (Mertens), และ *L. b. guttatus* (Gunther) ส่วน Cox และคณะ (1998) Darevsky และ Kupriyanova (1993),

และ Manthey และ Grossmann (1997) ได้รายงานว่าพบแ้ในประเทศไทยทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ *L. belliana*, *L. reevesii*, *L. triploida* และ *L. boehmei*

สำหรับการศึกษาด้านเซลล์พันธุศาสตร์ของแ้ในประเทศไทยยังมีการศึกษากันน้อยมาก พบว่ามีการศึกษาเพียงชนิดเดียว คือ *L. b. rubritaeniata* (Mertens) โดย โรจน์ชัย ศัตราหา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์ (2532) ส่วนการศึกษาการิโอไทป์ของแ้ *L. belliana* (Gray) ตามรายงานของ Hall (1970 อ้างโดย โรจน์ชัย ศัตราหา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์, 2532) นั้นเป็นที่น่าสังเกตว่าแ้ที่ใช้ศึกษานั้นยังไม่ทราบชนิดและแหล่งอาศัยที่แน่นอน เพียงแต่สันนิษฐานว่าเป็นแ้ที่พ่อค้าสัตว์ป่าเก็บรวบรวมได้จากภาคเหนือของประเทศมาเลเซียหรือชายแดนติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทย นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาโดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาเท่านั้น ยังไม่พบว่ามีรายงานการศึกษาการิโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจี ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาการิโอไทป์ของแ้ *L. b. belliana* (Gray) โดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อมแถบสีแบบจี เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการิโอไทป์ของแ้ชนิดย่อยนี้จาก 5 ประชากร ได้แก่ เกาะเสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ซึ่งเป็นแ้ที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ศึกษาและเปรียบเทียบการิโอไทป์ ของแ้ *L. b. belliana* (Gray) โดยใช้เทคนิคการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดแล้วย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดาและการย้อมแถบสีแบบจี จากเกาะเสมสาร และเกาะช้างเคียง จังหวัดชลบุรี

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยนี้

เป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดกลุ่มประชากรของแ้ *L. b. belliana* (Gray) ในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่บนเกาะเสมสารและเกาะช้างเคียง และเป็นข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์ในกลุ่มนี้จากแหล่งอื่นๆ ในประเทศไทยต่อไป

บทที่ 2

ตรวจเอกสาร

1. ความสำคัญของแยะ

แยะเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่นับว่ามีประโยชน์ด้านคุณค่าทางอาหารต่อมนุษย์ นอกจากนี้แยะยังมีความสำคัญในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารที่ทำหน้าที่ในการหมุนเวียนถ่ายเทพลังงานในระบบนิเวศที่ทำให้เกิดความสมดุลย์ในธรรมชาติเนื่องจากแยะกินแมลงศัตรูพืชเป็นอาหาร จากการศึกษาของ โรจน์ชัย ศัตราหา และไพรัช ทาบสีแพร (2525) พบว่าแยะอาศัยอยู่ทั่วไปในสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นดินทราย มีลักษณะแห้ง โลงเตียน และน้ำท่วมไม่ถึง โดยเฉพาะตามเกาะต่างๆ ในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันก็พบว่ามีแยะอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพบว่าปริมาณของแยะที่พบในประเทศไทยมีจำนวนลดลงไปมาก เนื่องจากถูกดักจับมาเป็นอาหารและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมีปริมาณลดลงไปเนื่องจากถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของมนุษย์

2. การจัดลำดับทางอนุกรมวิธาน

แยะจัดอยู่ในชั้น Reptilia อันดับ Sauria วงศ์ Agamidae (Uromastycidae) สกุล *Leiolepis* พบทั่วไปในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ *Leiolepis belliana*, *L. boehmei*, *L. guentherpetersi*, *L. guttata*, *L. peguensis*, *L. reevesii* และ *L. triploid* โดยเฉพาะแยะ *L. belliana* ยังแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย ได้แก่ *L. b. belliana*, *L. b. rubritaeniata* และ *L. b. ocellata* (Uetz, Etzold และ Chenna, 2000) สำหรับการจัดลำดับทางอนุกรมวิธานของแยะ จากรายงาน Joger (1991) และ Honda และคณะ (2000) นั้นจัดแยะอยู่ในวงศ์ Agamidae ส่วน Macey และคณะ (2000) เมื่อได้ศึกษา mitochondrial DNA ของสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Sauria แล้วจึงจัดแยะแยกออกจากวงศ์ Agamidae ให้อยู่ในวงศ์ Uromastycidae จากรายงานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการจำแนกชนิดของแยะยังไม่ชัดเจนนัก รวมทั้งชนิดของแยะที่พบในประเทศไทยก็เช่นกัน ดังรายงานของ Taylor (1963) ที่จัดจำแนกชนิดของแยะในประเทศไทยออกเป็นทั้งหมด 3 ชนิดย่อย ได้แก่ *L. b. belliana* (Gray), *L. b. rubritaeniata* (Mertens), และ *L. b. guttatus* (Gunther) ส่วน Cox และคณะ (1998), Darevsky และ Kupriyanova (1993), และ Manthey และ Grossmann (1997) รายงานว่าพบแยะในประเทศไทยทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ *L. belliana* พบกระจายอยู่ทั่วไป

(1997) รายงานว่าพบแยะในประเทศไทยทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ *L. belliana* พบกระจายอยู่ทั่วไปทั่วทุกภาคของประเทศ, *L. reevesii* พบกระจายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, *L. triploida* พบกระจายอยู่ทางภาคใต้จนถึงเขตประเทศมาเลเซีย และ *L. boehmei* พบกระจายอยู่ทั่วไปทางภาคใต้ของประเทศ

3. การศึกษาทางสัตววิทยา


จากการศึกษาทางสัตววิทยาของ Taylor (1963) และ Cox และคณะ (1998) พบว่า แยะ *L. b. belliana* (Gray) มีชื่อท้องถิ่นว่า แยะใต้ มีลักษณะสัตววิทยาคือ มีหลอดลมบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านหลังของน่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางน่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณสี่ข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำขวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสี่ข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองหลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโคจรอบโคนขาหลัง (รูปที่ 1) พบกระจายทั่วทุกภาคของประเทศและอาจกระจายลงไปจนถึงพื้นที่บางส่วนของประเทศมาเลเซีย แยะชนิดย่อยนี้จะพบอาศัยอยู่ตามพื้นที่โล่งเตียนและบริเวณชายหาด



รูปที่ 1 แยะใต้ *L. b. belliana* (Gray)


4. สภาพพื้นที่

พื้นที่ทำการศึกษา คือ เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง ได้แก่ เกาะคราม เกาะรีน และ เกาะไผ่ สำหรับเกาะแสมสารเป็นเกาะขนาดเล็กตั้งอยู่ในอ่าวไทยตอนบนที่ละติจูดที่ 13 องศา 34 ลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 100 องศา 82 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร (ธนัญญา ทรพพนันท์, 2538) เป็นหนึ่งในพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อยู่ในการดูแลของกองทัพเรือ จากข้อมูลทางธรณีวิทยาที่ศึกษาอายุหิน พบว่า หินที่พบบนเกาะที่ใช้ศึกษาการโอไทป์ของแยะในครั้งนี้ ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะคราม และเกาะไผ่ รวมทั้งพื้นที่บนผืนแผ่นดินใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทย (พื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู่) จังหวัดชลบุรีเป็นหินที่เกิดในยุคเดียวกัน คือ ยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน มีอายุ 245-360 ล้านปี และเป็นผืนแผ่นดินเดียวกันมาก่อน (รูปที่ 2) แต่สาเหตุที่พื้นที่เหล่านี้แยกกันเป็นเกาะต่างๆ เนื่องจากเมื่อประมาณ 1-2 ล้านปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยุคน้ำแข็ง มีน้ำแข็งปกคลุมโลก 75% ในยุคนั้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น (รูปที่ 3) ดังนั้นน้ำทะเลจึงไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณอ่าวไทยซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม บางส่วนที่มีพื้นสูงก็จะเกิดเป็นเกาะต่างๆ จึงเกิดเป็นทะเลอ่าวไทยในปัจจุบัน และ (Tarbuck และ Lutgens, 1999) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งก่อนยุคน้ำแข็งบริเวณอ่าวไทยทั้งหมดเคยเป็นพื้นดินมาก่อน โดยมีหลักฐานจากการขุดเจาะน้ำมัน พบว่าแร่ที่ขุดพบใต้ท้องทะเลอ่าวไทยนั้นเป็นแร่ชนิดที่เกิดจากการทับถมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก ซึ่งก็สามารถพบแร่เหล่านี้ได้ในบริเวณที่เป็นพื้นดินในปัจจุบันด้วย (Burri, 1989) ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าแยะที่ใช้ศึกษานี้เป็นแยะ *L. b. belliana* (Gray) เนื่องจากมีลักษณะฐานวิทยาเหมือนกับแยะที่ Taylor (1963) และ Cox และคณะ (1998) ที่ทำการศึกษาซึ่งก็พบว่าแยะชนิดนี้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทยด้วยเช่นกัน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีลักษณะที่สอดคล้องกับการศึกษาเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกดังกล่าวที่เป็นสาเหตุที่ทำให้พื้นดินแยกออกจากกัน ทำให้แยะที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ แยกออกจากกัน กลายเป็นกลุ่มประชากรที่แยกออกจากกัน โดยสิ้นเชิงโดยมีน้ำทะเลเป็นตัวขวางกั้น



รูปที่ 2 พื้นที่ที่ทำการศึกษา

พื้นที่สี่เหลี่ยมแสดงชนิดของหินที่เกิดขึ้นในยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอเมียน



รูปที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในช่วง 20,000 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

5. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ (Cytogenetics)

การศึกษาทางเซลล์พันธุศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับ จำนวน โครงสร้างและหน้าที่ การทำงานของโครโมโซม โดยจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่าง ลักษณะ และ พฤติกรรมของโครโมโซมภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Henriques-Gil, Parker และ Puertas, 1997) นอกจากนี้การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์สามารถใช้จำแนกชนิดของสิ่งมีชีวิต ใช้ในการศึกษา ความสัมพันธ์และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ของ สิ่งมีชีวิต และยังสามารถใช้ในการศึกษาโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของ โครโมโซมหรือใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนที่ยีนบนโครโมโซม (Gaedner, Simmons และ Snustad, 1991)

การจัดทำคาริโอไทป์ สามารถทำได้โดยการย้อมสีโครโมโซม ในระยะเมทาเฟส นำมา ถ่ายรูปแล้วนำภาพที่ได้มาจัดทำคาริโอไทป์ โดยนำเอาโครโมโซมแต่ละแท่งจากเซลล์ในระยะ เมทาเฟสมาเรียงเป็นคู่โฮโมโลกัส (homologous) ตามลำดับ จากโครโมโซมขนาดใหญ่ไป จนถึงขนาดเล็ก การวางโครโมโซมจะวางโดยให้แขนข้างสั้นตั้งขึ้น และนิยมวางโครโมโซม เพศอยู่ที่มุมล่างขวาสุดของภาพ (อมรา คัมภีรานนท์, 2540)

วิธีการย้อมสีโครโมโซม สามารถทำได้หลายแบบ ตั้งแต่การย้อมสีแบบธรรมดา และการย้อมแถบสีโครโมโซม (chromosome banding) ซึ่งนิยมทำกันหลายเทคนิคด้วยกัน เช่น การ ย้อมแถบสีแบบจี และการย้อมแถบสีแบบซี (C-banding) เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการ ย้อมสีโครโมโซมที่นำมาใช้เฉพาะในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น คือ การย้อมสีแบบธรรมดา และ การย้อมแถบสีแบบจี

1. การย้อมสีแบบธรรมดา เป็นการย้อมสีโครโมโซมที่ใช้สีประเภทย้อมติดกรด นิวคลีอิก (nucleic acid) เช่น สีจิมซา (giemsa) ลักษณะโครโมโซมจะติดสีเข้มตลอดทั้งแท่ง จากการย้อมสีเช่นนี้สามารถบอกจำนวนและชนิดของโครโมโซมประจำสปีชีส์นั้นๆ ได้ และ อาจบอกลักษณะพิเศษบางอย่างของโครโมโซมได้ เช่น รอยคอดแห่งที่หนึ่ง (primary constriction) รอยคอดแห่งที่สอง (secondary constriction) และ แซเทิลไลท์ (satellite) อย่างไรก็ตามการติดสีของโครโมโซมดังกล่าว บางครั้งอาจพบว่าการติดสีที่ไม่เท่ากัน เช่น ในขณะที่ โครโมโซมผ่านเข้าสู่วัฏจักรของเซลล์ (cell cycle) จะมีการยึดหดตัวไม่เท่ากัน ระยะใดที่หด มากจะติดสีเข้มมาก แต่ถ้าหดตัวน้อยจะติดสีจางกว่า อีกทั้งภายในแท่งโครโมโซมเดียวกันยัง

ติดสีไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของเฮเทอโรโครมาทิน (heterochromatin) และ ยูโครมาทิน (euchromatin) ดังนั้นการย้อมด้วยสีธรรมดาและโดยเฉพาะใช้สีเจ็องแล้วบางครั้งอาจตรวจพบการติดสีชนิดเข้มและจางบนโครโมโซมได้ (อมรา คัมภีรานนท์, 2540)

2. การย้อมแถบสีโครโมโซมแบบจี เป็นวิธีการที่ทำให้เกิดแถบเข้มและแถบจางบนโครโมโซม ในส่วนของยูโครมาทินและเฮเทอโรโครมาทิน โดยส่วนที่ติดสีเข้มเป็นส่วนของเฮเทอโรโครมาทิน ซึ่งเป็นส่วนที่ดีเอ็นเอมีการขดตัวกันแน่น และส่วนที่ติดสีจางเป็นส่วนของยูโครมาทิน ซึ่งเป็นส่วนที่ดีเอ็นเอขดตัวแบบหลวมๆ (Sumner, 1990) จากการย้อมแถบสีโครโมโซมแบบนี้จะช่วยทำให้สามารถศึกษาโครโมโซมได้ละเอียดและถูกต้องมากขึ้นกว่าการย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา

6. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของแย้

จากการตรวจเอกสารพบว่ามียารงานการศึกษาการไอโทปีของแย้น้อยมาก แย้ (*L. belliana*) จะมีลักษณะของโครโมโซมแตกต่างจากสัตว์อื่นๆ ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะของโครโมโซมได้เป็น 2 แบบ คือ

1. แมคโครโครโมโซม (macrochromosome) เป็นโครโมโซมในระยะเมทาเฟสที่สามารถมองเห็นรูปร่างได้ชัดเจน (Sambamurthy, 1999)
2. ไมโครโครโมโซม (microchromosome) เป็นโครโมโซมที่มีขนาดเล็กมาก ในระยะเมทาเฟสจะเห็นรูปร่างเป็นจุด ส่วนใหญ่เป็นเฮเทอโรโครมาทิน มีความแตกต่างกันไปในแต่ละชนิดและประชากรที่เป็นชนิดเดียวกัน (Green, 1991)

Hall (1970 อ้างโดย โรจน์ชัย ศัตราหา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์, 2532) ศึกษาการไอโทปีจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแย้ *L. belliana* พบว่า มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ ประกอบด้วย แมคโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง นอกจากนี้ยังพบว่าเฉพาะในแย้เพศเมียเท่านั้น ที่มีจำนวนโครโมโซมเป็นแบบทริพลอยด์ (triploid) $3n=54$ ประกอบด้วย แมคโครโครโมโซม 18 แท่ง และไมโครโครโมโซม 36 แท่ง อย่างไรก็ตามจากรายงานนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าแย้ที่ใช้ศึกษานั้นยังไม่ทราบชนิดและแหล่งอาศัยที่แน่นอน เพียงแต่สันนิษฐานว่าเป็นแย้ที่พ่อค้าสัตว์ป่าเก็บรวบรวมได้จากภาคเหนือของประเทศไทยชายแดนติดต่อกับภาคใต้ของประเทศไทย

โรจน์ชัย ศัตรวาทา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์ (2532) ได้ทำการศึกษาคาร์ิโอไทป์จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแฮ่ *L. b. rubritaeniata* (Mertens) พบว่ามีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ ประกอบด้วย เมทาเซนตริกแมคโครโครโมโซม 10 แท่ง สับเมทาเซนตริกแมคโครโครโมโซม 2 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการศึกษาด้านเซลล์พันธุศาสตร์ของแฮ่ *L. b. rubritaeniata* (Mertens) เพียงชนิดเดียว ส่วนแฮ่ *L. b. belliana* (Gray) ตามรายงานของ Hall (1970 อ้างโดย โรจน์ชัย ศัตรวาทา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์, 2532) นั้นยังไม่ให้ข้อสรุปที่ชัดเจน เกี่ยวกับชนิดที่แท้จริงของแฮ่ที่ศึกษาซึ่งเชื่อว่าเป็นชนิด *L. belliana* โรจน์ชัย ศัตรวาทา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์ (2532) นอกจากนี้การศึกษาดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาโดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดา ยังไม่พบว่ามีรายงานการศึกษาคาร์ิโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจี

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาคาร์ิโอไทป์ของแฮ่ *L. b. belliana* (Gray) เพื่อเปรียบเทียบคาร์ิโอไทป์ของแฮ่ โดยใช้เทคนิคการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อมแถบสีแบบจี แล้วนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของขนาดโครโมโซมที่ได้จากการย้อมสีแบบธรรมดาและรูปแบบของแถบสีแบบจีของแฮ่ *L. b. belliana* (Gray) ทั้ง 5 ประชากร ได้แก่ เกาะเสมสาร เกาะคราม เกาะรีน และเกาะไผ่ รวมทั้งพื้นที่บนผืนแผ่นดินใหญ่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทย (พื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู) จังหวัดชลบุรี แล้ววิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี t-test จากโปรแกรม SPSS

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 3

วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา

1. วัสดุอุปกรณ์

1.1 สัตว์ทดลอง

เชื้อ *L. b. belliana* (Gray) จากเกาะเสม็ดสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขา เขียวเขาชมพู่ จำนวนประชากรละ 10 ตัว เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว

1.2 อุปกรณ์

1. Centrifuge
2. incubater
3. Laminar Flow
4. Water Bath
5. ก่อตั้งจุลทรรศน์
6. กล้องถ่ายรูป และฟิล์ม
7. เข็มเจาะเลือด
8. หลอดหยด (Pasture Pipete)
9. ขวดเลี้ยงเลือด
10. หลอด Centrifuge
11. Micropipete
12. JAR สำหรับย้อมสไลด์
13. สไลด์และแผ่นแก้วปิดสไลด์
14. Steride Membrane Filter 0.45 μm
15. เครื่องกรองสูญญากาศ
16. กระจกกรอง

17. เครื่องมือผ่าตัด

1.3 สารเคมี

1. RPMI 1640 (Seromed)
2. Penicillin-Streptomycin
3. Fetal Bovine Serum
4. Pokeweed Mitogen (Gibco)
5. Potassium Chloride (KCl)
6. Colchicine
7. Acetic Acid Glacial
8. Methanol
9. Ether
10. Ethanol
11. Potassium Dihydrogen Phosphate (KH_2PO_4)
12. Disodium Hydrogen Phosphate (Na_2HPO_4)
13. Giemsa
14. 0.25 % Trypsin (Gibco)
15. Sodium Hydrogen Carbonate (NaHCO_3)

วิธีดำเนินการศึกษา

1. สถานที่เก็บตัวอย่าง

เก็บตัวอย่างแยะจาก 5 ประชากร ได้แก่ เกาะแสตมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู โดยแต่ละพื้นที่ที่เก็บตัวอย่างมีสภาพเป็นพื้นที่ที่เป็นดินทราย มีลักษณะแห้ง โลงเตียน และน้ำท่วมไม่ถึง จำนวนประชากรละ 10 ตัว เพศผู้ 5 ตัว และเพศเมีย 5 ตัว (รูปที่ 4)

2. เตรียมโครโมโซมเยื่อจากการเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือด

- 2.1 ให้ยาสลบเยื่อ แล้วใช้เข็มฉีดยาเจาะเลือดจากหัวใจประมาณ 0.1 - 0.2 มิลลิลิตร
- 2.2 หยดเลือดประมาณ 0.1-0.2 มิลลิลิตร ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์ (RPMI-1640) ปริมาณ 5 มิลลิลิตร ในขวดที่ปลอดเชื้อ ปิดขวดแล้วนำเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง
- 2.3 หลังจากอบเลือดได้ 72 ชั่วโมง แล้วจึงหยดสารละลาย colcecline ที่ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จำนวน 0.1 มิลลิลิตร เป็นเวลา 40 นาที
- 2.4 แยกเอาเลือดออกจากอาหารเลี้ยงโดยนำไปปั่นที่ 1,300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง
- 2.5 หยด 0.075 M KCL จำนวน 10 มิลลิลิตร ทิ้งไว้เป็นเวลา 25 นาที แล้วนำไปปั่นที่ 1,300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ดูดส่วนใสทิ้ง
- 2.6 หยดสารละลาย Fixative ที่เตรียมใหม่และแช่เย็นที่ละลายอย่างช้าๆ พร้อมทั้งเขย่าตลอดเวลา ประมาณ 10 มิลลิลิตร แล้วนำไปปั่นที่ 1,300 รอบต่อนาที เป็นเวลา 10 นาที ทำซ้ำ 5-6 ครั้ง
- 2.7 หยดสารละลายเซลล์จากข้อ 2.6 ลงบนสไลด์แล้วปล่อยให้แห้งในอากาศ เพื่อนำไปย้อมสีต่อไป

3. การย้อมสีโครโมโซมแบบธรรมดา

- ใช้สไลด์ที่หยดเซลล์ไว้แล้วเป็นเวลา 1-3 วัน
- 3.1 นำสไลด์ที่เตรียมจากข้อ 2.7 มาย้อมด้วย 10 % Giemsa เป็นเวลา 15-20 นาที แล้วล้างสไลด์ด้วยน้ำกลั่นปล่อยให้แห้งในอากาศ
 - 3.2 ตรวจสอบโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย X100 แล้วจึงถ่ายรูป

4. การย้อมแถบสีแบบจี

- ใช้สไลด์ที่หยดเซลล์ไว้แล้วเป็นเวลา 7-9 วัน
- 4.1 นำสไลด์จากข้อ 2.7 มาจุ่มในสารละลาย 0.025 % trypsin เป็นเวลา 60 วินาที
 - 4.2 จุ่มสไลด์ลงในสารละลาย 10 % FCS เพื่อหยุดปฏิกิริยาของ trypsin
 - 4.3 ล้างสไลด์ด้วยน้ำกลั่น ตามด้วย 50 % methanal

4.4. ย้อมด้วย 10 % Giemsa เป็นเวลา 15-20 นาที แล้วล้างสไลด์ด้วยน้ำกลั่นปล่อยให้แห้งในอากาศ

4.5 ตรวจสอบโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่กำลังขยาย X100 แล้วจึงถ่ายรูป

5. การวิเคราะห์โครโมโซม

5.1 หลังจากที่ได้ตรวจสอบโครโมโซมด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้ว ทำการถ่ายรูปด้วยฟิล์มขาวดำ จากเซลล์ที่มีการกระจายตัวของโครโมโซมดีในระยะเมทาเฟส อัดขยายภาพเพื่อนำมาจัดคาริโอไทป์ โดยใช้เซลล์มากกว่า 70 เซลล์ขึ้นไป

5.2 นำภาพที่อัดขยายแล้วมาจับคู่โครโมโซมเพื่อจัดคาริโอไทป์ โดยการวัดความยาวแขนข้างสั้น (Ls) และแขนข้างยาวของโครโมโซม (Ll) แล้วนำมาคำนวณค่า Relative Length (RL) และ Numerical Value Centromere (NVC) ตามวิธีการของ Nishioka และคณะ (1994) ดังนี้

$$RL = \frac{\text{ความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง (LT)}}{\text{ความยาวของโครโมโซมทั้งหมด } (\sum LT)}$$

$$NVC = \frac{\text{ความยาวแขนข้างสั้นของโครโมโซม (Ls) x 100}}{\text{ความยาวของโครโมโซมแต่ละแท่ง (LT)}}$$

ซึ่งค่า RL จะช่วยในการจัดคู่โครโมโซม โดยที่ โครโมโซมที่เป็น โฮโมโลกัสกัน จะมีค่า RL เท่ากัน หรือใกล้เคียงกันมาก ส่วนค่า NVC จะช่วยในการบอกชนิดของโครโมโซม ดังตารางที่ 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1 แสดงรูปร่างของโครโมโซมแบบต่างๆ ที่กำหนดจากค่า NVC

ชนิดของโครโมโซม	อักษรย่อ	NVC
Metacentric	m	50.00-37.50
Submetacentric	sm	37.40-25.00
Subtelocentric	st	24.09-12.50
Telocentric	t	12.40-0.00

5.3 จัดการไโอโทป์โดยจัดตามชนิดของโครโมโซม คือ เมทาเซนตริก สับเมทาเซนตริก อะโครเซนตริกหรือสับทีโลเซนตริก และทีโลเซนตริก แล้วจึงเรียงลำดับโครโมโซมจากขนาดใหญ่ที่สุดไปยังขนาดเล็กที่สุด (Hassan, 1996 และ Volobouev และ Aniskin, 2000)

5.4 สำหรับการจัดคู่ของโครโมโซมที่ได้จากการย้อมแถบสีแบบจิ้นนั้นจะยึดรูปแบบของแถบสีเพื่อช่วยในการจัดคู่ของโครโมโซม ส่วนการเรียงลำดับจะยึดตามรูปแบบการจัดการไโอโทป์ที่ได้จากการย้อมสีแบบปกติ

5.5 เปรียบเทียบการไโอโทป์ของแม่ *L. b. belliana* (Gray) ทั้ง 5 ประชากร โดยการเขียนอิดิโอแกรม (idiogram)

5.6 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของขนาดโครโมโซมที่ได้จากการย้อมสีแบบธรรมดาและรูปแบบของแถบสีแบบจิ้นของแม่ *L. b. belliana* (Gray) ทั้ง 5 ประชากร ได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะริน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่ ซึ่งใช้เป็นตัวแทนการไโอโทป์ของแม่ *L. b. belliana* จากแผ่นดินใหญ่ โดยวิเคราะห์ทางสถิติ t-test จากโปรแกรม SPSS

บทที่ 4

ผลการศึกษา

1. แยกแยะแอมพลิจูด

1.1. ลักษณะสัญญาณวิทยา

แยกแยะแอมพลิจูดและเฟสมีลักษณะทั่วไป คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของร่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางร่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณซี่ข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับซี่ข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโดยรอบโคนขาหลัง ดังแสดงในรูปที่ 5 และ 6 ซึ่งเหมือนในรายงานของ (Taylor, 1963 และ Cox และคณะ, 1998)



รูปที่ 5 แอ้ (*L. b. belliana*) เพศผู้ จากเกาะแสมสาร



รูปที่ 6 แอ้ (*L. b. belliana*) เพศเมีย จากเกาะแสมสาร

1.2. การย้อมสีแบบธรรมดา


ผลการย้อมสีแบบธรรมดาของโครโมโซมแท้จากเกาะแสมสาร พบว่า ทั้งแท้เพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ มีค่า RL และ NVC เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถจัดเป็นคาริโอไทป์ดังแสดงในรูปที่ 7-8 โครโมโซมทั้ง 18 คู่ ประกอบด้วยแมโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 จัดอยู่ในกลุ่ม A มีรูปร่างเป็นเมทาเซนทริก ส่วนแมโครโครโมโซมคู่ที่ 6 จัดอยู่ในกลุ่ม B มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซ็กซ์โครโมโซมชนิด X และ Y ขนาดเล็กมากจึงไม่สะดวกที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และจากคาริโอไทป์ที่ได้สามารถนำมาเขียนเป็นอิดิโอแกรมได้ดังแสดงในรูปที่ 9

ตารางที่ 2 ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแท้จากเกาะแสมสาร


จำนวนโครโมโซม	RL \pm SD	NVC \pm SD	ขนาดและรูปร่าง
1	12.46 \pm 0.82	47.56 \pm 1.24	m
2	8.77 \pm 0.58	48.33 \pm 1.34	m
3	7.65 \pm 0.55	49.00 \pm 1.38	m
4	6.27 \pm 0.50	48.68 \pm 1.20	m
5	4.04 \pm 0.49	48.33 \pm 1.49	m
6	10.69 \pm 0.70	35.71 \pm 1.03	sm

m = เมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม


sm = สับเมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม



รูปที่ 7 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของไข้เพศผู้จากภาวะแสมสาร



รูปที่ 8 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของตั๊กแตนจากเกาะแสมสาร




รูปที่ 9 อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของไข่จากเกาะเสมสาร


1.3. การย้อมแถบสีแบบจี

รูปแบบการย้อมแถบสีแบบจีของโครโมโซมไข่จากเกาะเสมสาร จัดเป็นคาริโอไทป์ได้ดังรูปที่ 10 และ 11 ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 12


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 10 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ้เพศผู้จาก
เกาะเสมสาร



รูปที่ 11 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการข้ามแถบสีแบบจีของแฮพสเมีย จาก
เกาะแสมสาร



รูปที่ 12 อิดิโอแกรมจากการเชื่อมแถบสีแบบจีของไข่จากเกาะเสมสาร

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. แย้จากเกาะคราม

2.1. ลักษณะสัณฐานวิทยา

แย้เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะทั่วไป คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของท้องมีเกล็ดขวางอยู่กลางท้องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณสีข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำขวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสีข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโดยรอบโคนขาหลัง ดังแสดงในรูปที่ 13 และ 14 ซึ่งเหมือนในรายงานของ (Taylor, 1963 และ Cox และคณะ, 1998)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 13 แย้ (*L. b. belliana*) เพศผู้ จากเกาะคราม



รูปที่ 14 แย้ (*L. b. belliana*) เพศเมีย จากเกาะคราม

2.2. การย้อมสีแบบธรรมดา


ผลการย้อมสีแบบธรรมดาของโครโมโซมแ่จากเกาะคราม พบว่า ทั้งแ่เพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ มีค่า RL และ NVC เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถจัดเป็นคาริโอไทป์ดังแสดงในรูปที่ 15 และ 16 โครโมโซมทั้ง 18 คู่ประกอบด้วยแมคโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 จัดอยู่ในกลุ่ม A มีรูปร่างเป็นเมทาเซนทริก ส่วนแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 6 จัดอยู่ในกลุ่ม B มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซคันดารีคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมที่จัดอยู่ในกลุ่ม C นั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สะดวกที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และจากคาริโอไทป์ที่ได้สามารถนำมาเขียนเป็นอิดิโอแกรมได้ดังแสดงในรูปที่ 17

ตารางที่ 3 ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแ่จากเกาะคราม


จำนวนโครโมโซม	RL \pm SD	NVC \pm SD	ขนาดและรูปร่าง
1	12.46 \pm 0.66	47.00 \pm 1.48	m
2	8.95 \pm 1.36	48.33 \pm 3.08	m
3	7.65 \pm 0.41	47.69 \pm 1.77	m
4	6.28 \pm 0.35	48.12 \pm 1.64	m
5	4.01 \pm 0.30	48.44 \pm 1.48	m
6	10.66 \pm 0.59	35.33 \pm 1.35	sm

m = เมทาเซนทริกแมคโครโครโมโซม


sm = สับเมทาเซนทริกแมคโครโครโมโซม



รูปที่ 15 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของไข้เพศผู้ จากเกาะคราม



รูปที่ 16 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแย์เพศเมีย จากเกาะคราม




รูปที่ 17 อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของไข่จากเกาะคราม


2.3. การย้อมแถบสีแบบจี

รูปแบบการย้อมแถบสีแบบจีของโครโมโซมไข่จากเกาะคราม จัดเป็นคาริโอไทป์ได้ ดังรูปที่ 18 และ 19 ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 20


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 18 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการเชื่อมแถบสีแบบจีของแชนเพสผู้จาก
เกาะคราม



รูปที่ 19 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ่เพศเมีย จาก
เกาะคราม



รูปที่ 20 อิดิโอแกรมจากการเชื่อมแถบสีแบบจีของเข้จากเกาะคราม

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. แยกเกะรีน

3.1. ลักษณะสัณฐานวิทยา

แยกเกะรีนและเพสเมียมีลักษณะทั่วไป คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของน่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางน่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณสีข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำขวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสีข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโดยรอบโคนขาหลัง ดังแสดงในรูปที่ 21 และ 22 ซึ่งเหมือนในรายงานของ (Taylor, 1963 และ Cox และคณะ, 1998)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 21 แม้ (*L. b. belliana*) เพศผู้ จากเกาะรีน



รูปที่ 22 แม้ (*L. b. belliana*) เพศเมีย จากเกาะรีน

3.2. การย้อมสีแบบธรรมดา


ผลการย้อมสีแบบธรรมดาของโครโมโซมแ่จากเกาะรีน พบว่า ทั้งแ่เพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ มีค่า RL และ NVC เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถจัดเป็นคาริโอไทป์ดังแสดงในรูปที่ 23 และ 24 โครโมโซมทั้ง 18 คู่ประกอบด้วยแมโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 จัดอยู่ในกลุ่ม A มีรูปร่างเป็นเมทาเซนทริก ส่วนแมโครโครโมโซมคู่ที่ 6 จัดอยู่ในกลุ่ม B มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซคันดารีคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมที่จัดอยู่ในกลุ่ม C นั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สะดวกที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และจากคาริโอไทป์ที่ได้สามารถนำมาเขียนเป็นอิดิโอแกรมได้ดังแสดงในรูปที่ 25

ตารางที่ 4 ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแ่จากเกาะรีน


จำนวนโครโมโซม	RL \pm SD	NVC \pm SD	ขนาดและรูปร่าง
1	12.52 \pm 0.48	47.29 \pm 1.33	m
2	8.96 \pm 0.30	48.61 \pm 1.48	M
3	7.80 \pm 0.27	48.97 \pm 1.34	m
4	6.20 \pm 0.30	48.83 \pm 1.34	m
5	3.86 \pm 0.41	48.18 \pm 1.99	m
6	10.66 \pm 0.53	35.23 \pm 1.22	sm

m = เมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม


sm = สับเมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม



รูปที่ 23 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของเย็บศพผู้ จากเกาะรีน



รูปที่ 24 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแีเพศเมีย จากเกาะรีน




รูปที่ 25 อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของไข่จากเกาะรีน


3.3. การย้อมแถบสีแบบจี

รูปแบบการย้อมแถบสีแบบจีของโครโมโซมไข่จากเกาะรีน จัดเป็นคาริโอไทป์ได้ดังรูปที่ 26 และ 27 ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 28


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 26 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการข้อมแถบสีแบบจีของไข่เพศผู้จาก
เกาะรีน



รูปที่ 27 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแซ่เพศเมีย จาก
เกาะริน



รูปที่ 28 อิดิโแกรมจากการเชื่อมแถบสีแบบจีของแยะจากเกาะรีน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. แอ้จากเกาะไผ่

4.1. ลักษณะสัณฐานวิทยา

แอ้เพศผู้และเพศเมียมีลักษณะทั่วไป คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของน่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางน่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณสีข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำขวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสีข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโดยรอบโคนขาหลัง ดังแสดงในรูปที่ 29 และ 30 ซึ่งเหมือนในรายงานของ (Taylor, 1963 และ Cox และคณะ, 1998)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 29 แย้ (*L. b. belliana*) เพศผู้ จากเกาะไผ่



รูปที่ 30 แย้ (*L. b. belliana*) เพศเมีย จากเกาะไผ่

4.2. การย้อมสีแบบธรรมดา


ผลการย้อมสีแบบธรรมดาของโครโมโซมแ่จากเกาะไข่ พบว่า ทั้งแ่เพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ มีค่า RL และ NVC เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถจัดเป็นคาริโอไทป์ดังแสดงในรูปที่ 31 และ 32 โครโมโซมทั้ง 18 คู่ ประกอบด้วยแมโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 จัดอยู่ในกลุ่ม A มีรูปร่างเป็นเมทาเซนทริก ส่วนแมโครโครโมโซมคู่ที่ 6 จัดอยู่ในกลุ่ม B มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซคันดารีคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมที่จัดอยู่ในกลุ่ม C นั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สะดวกที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และจากคาริโอไทป์ที่ได้สามารถนำมาเขียนเป็นอิดิโอแกรมได้ดังแสดงในรูปที่ 33

ตารางที่ 5 ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแ่จากเกาะไข่


จำนวนโครโมโซม	RL \pm SD	NVC \pm SD	ขนาดและรูปร่าง
1	12.27 \pm 0.57	47.27 \pm 1.33	m
2	8.84 \pm 0.34	48.57 \pm 1.41	m
3	7.81 \pm 0.30	48.97 \pm 1.37	m
4	6.33 \pm 0.31	49.02 \pm 1.29	m
5	4.11 \pm 0.33	48.43 \pm 1.50	m
6	10.59 \pm 0.48	35.31 \pm 1.47	sm

m = เมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม


sm = สับเมทาเซนทริกแมโครโครโมโซม



รูปที่ 31 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของแะเพศผู้ จากเกาะไต้หวัน



รูปที่ 32 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของเข้เพศเมีย จากเกาะไผ่




รูปที่ 33 อิดิโอแกรมจากการเชื่อมสีแบบธรรมดาของไข่จากเกาะไต้หวัน


4.3. การเชื่อมแถบสีแบบจี

รูปแบบการเชื่อมแถบสีแบบจีของโครโมโซมไข่จากเกาะไต้หวัน จัดเป็นคาริโอไทป์ได้ดังรูปที่ 34 และ 35 ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 36


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 34 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการเชื่อมแถบสีแบบจีของแท้เพศผู้จาก
เกาะไผ่



รูปที่ 35 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการซ้อมแถบสีแบบจีของแอสเมีย จาก
เกาะไผ่



รูปที่ 36 อิดิโอแกรมจากการเชื่อมแถบสีแบบจีของเข้จากเกาะไฝ

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. แยกพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่

5.1. ลักษณะฐานวิทยา

แยกพื้นที่และเขตมีลักษณะทั่วไป คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของน่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางน่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน บริเวณสีข้างทั้งสองของลำตัวมีแถบสีแสดหรือสีเหลืองสลับกับแถบสีดำขวางกับลำตัวตลอดจนโคนขาหน้าจนถึงโคนขาหลัง แถบสีดำส่วนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสีข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลืองขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้มโดยรอบโคนขาหลัง ดังแสดงในรูปที่ 37 และ 38 ซึ่งเหมือนในรายงานของ (Taylor, 1963 และ Cox และคณะ, 1998)



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 37 แมย์ (*L. b. belliana*) เพศผู้ จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมภู



รูปที่ 38 แมย์ (*L. b. belliana*) เพศเมีย จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมภู

5.2. การย้อมสีแบบธรรมดา


ผลการย้อมสีแบบธรรมดาของโครโมโซมแยกจากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพูน พบว่า ทั้งเยื่อเพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ มีค่า RL และ NVC เฉลี่ยดังแสดงในตารางที่ 2 และสามารถจัดเป็นคาริโอไทป์ดังแสดงในรูปที่ 39 และ 40 โครโมโซมทั้ง 18 คู่ ประกอบด้วยแมคโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 จัดอยู่ในกลุ่ม A มีรูปร่างเป็นเมทาเซนตริก ส่วนแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 6 จัดอยู่ในกลุ่ม B มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนตริก นอกจากนี้ยังพบเซนตริคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมที่จัดอยู่ในกลุ่ม C นั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สะดวกที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม และจากคาริโอไทป์ที่ได้สามารถนำมาเขียนเป็นอิดิโอแกรมได้ดังแสดงในรูปที่ 41

ตารางที่ 6 ค่า RL และ NVC จากการย้อมสีแบบธรรมดาของแยกจากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพูน



จำนวนโครโมโซม	RL \pm SD	NVC \pm SD	ขนาดและรูปร่าง
1	12.24 \pm 0.48	47.97 \pm 1.13	m
2	8.89 \pm 0.48	48.78 \pm 1.22	m
3	7.70 \pm 0.31	49.16 \pm 1.09	m
4	6.26 \pm 0.30	49.24 \pm 0.97	m
5	4.13 \pm 0.32	48.51 \pm 1.89	m
6	10.65 \pm 0.62	35.41 \pm 1.22	sm

m = เมทาเซนตริกแมคโครโครโมโซม


sm = สับเมทาเซนตริกแมคโครโครโมโซม



รูปที่ 39 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของเซลล์
จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่



รูปที่ 40 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์ของไข่เพศเมีย
จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่




รูปที่ 41 อิดิโอแกรมจากการย้อมสีแบบธรรมดาของแ่จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู่


5.3. การย้อมแถบสีแบบจี

รูปแบบการย้อมแถบสีแบบจีของโครโมโซมแ่จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู่ จัดเป็นคาริโอไทป์ได้ดังรูปที่ 42 และ 43 ตามลำดับ สามารถเขียนเป็นอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 44


สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 42 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจีของแฉ่เพศผู้
จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่




รูปที่ 43 โครโมโซมระยะเมทาเฟสและคาริโอไทป์จากการข้อมแถบสีแบบจีของไข่เพศเมีย
จากพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู



รูปที่ 44 อิดิโอแกรมจากการข้อมแถบสีแบบจีของแหย่จากพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่

6. การเปรียบเทียบคาริโอไทป์ของแหย่ทั้ง 5 ประชากร

สามารถเปรียบเทียบคาริโอไทป์ของแหย่จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขามพู่ ได้จากอิดิโอแกรมจากการข้อมสีแบบธรรมดาและการข้อมแถบสีแบบจีของแต่ละประชากร โดยการเปรียบเทียบอิดิโอแกรมจากการข้อมสีแบบธรรมดานั้นสามารถเปรียบเทียบจากค่า RL และ NVC ซึ่งพบว่า แหย่ทั้ง 5 ประชากรมีคาริโอไทป์เหมือนกัน (รูปที่ 45 และ 46) และเมื่อเปรียบเทียบรูปแบบของแถบสีแบบจีจากอิดิโอแกรมนั้น พบว่า แหย่ทั้ง 5 ประชากร มีรูปแบบของแถบสีแบบจีเหมือนกัน (รูปที่ 47) และนอกจากนี้ยังสามารถเปรียบเทียบขนาดของโครโมโซมของแต่ละประชากรโดยใช้ค่าทางสถิติ t-test ซึ่งก็สามารถเปรียบเทียบค่า RL และ NVC ได้เช่นกัน พบว่า แหย่ทั้ง 5 ประชากร มีขนาดของโครโมโซมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 (ตารางที่ 7 ถึง 10)




รูปที่ 45: อิติโอแกรมจากการเชื่อมโยงโครโมโซมแบบธรรมดาของเห็บ (*L. b. belliana*) เปรียบเทียบค่า RL

ตารางที่ 7 จำนวนโครโมโซมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า RL ในโครโมโซมแต่ละคู่ของแฮ่ *L. b. belliana* จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู

พื้นที่ศึกษา	เกาะแสมสาร	เกาะคราม	เกาะรีน	เกาะไผ่
	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่
เกาะคราม	1, 2, 4, 5, 6	-	-	-
เกาะรีน	1, 2, 3, 4, 6	1, 5, 6	-	-
เกาะไผ่	1, 2, 3, 4, 5, 6	2, 4, 5, 6	2, 3, 6	-
เขาเขียว	1, 2, 3, 4, 5, 6	3, 4, 6	2, 3, 4, 6	1, 2, 4, 5, 6

ตารางที่ 8 จำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า RL ในโครโมโซมแต่ละคู่ของแฮ่ *L. b. belliana* จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู

พื้นที่ศึกษา	เกาะแสมสาร	เกาะคราม	เกาะรีน	เกาะไผ่
	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่
เกาะคราม	3	-	-	-
เกาะรีน	5	2, 3, 4	-	-
เกาะไผ่	0	1, 3	1, 2, 5	-
เขาเขียว	0	1, 2, 5	1, 5	3



รูปที่ 46 เปรียบเทียบอิดิโอแกรมจากการเชื่อมโยงโครโมโซมแบบธรรมดาของแฮ่ (*L. b. belliana*) เปรียบเทียบค่า NVC


ตารางที่ 9 แสดงจำนวนโครโมโซมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า NVC ในโครโมโซมแต่ละคู่ของแฮ่ *L. b. belliana* จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู

พื้นที่ศึกษา	เกาะแสมสาร	เกาะคราม	เกาะรีน	เกาะไผ่
	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่
เกาะคราม	1, 5, 6	-	-	-
เกาะรีน	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 5, 6	-	-
เกาะไผ่	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 2, 5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6	-
เขาเขียว	2, 3, 5, 6	5, 6	1, 2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6

ตารางที่ 10 แสดงจำนวนโครโมโซมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 จากการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า NVC ในโครโมโซมแต่ละคู่ของแฮ่ *L. b. belliana* จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู

พื้นที่ศึกษา	เกาะแสมสาร	เกาะคราม	เกาะรีน	เกาะไผ่
	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่	โครโมโซมคู่ที่
เกาะคราม	2, 3, 4	-	-	-
เกาะรีน	0	2, 3, 4	-	-
เกาะไผ่	0	3, 4	0	-
เขาเขียว	1, 4	1, 2, 3, 4	0	1

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



รูปที่ 47 เปรียบเทียบชนิดดีไอแกรมจากการเชื่อมแถมดีไอแรมจีของแม่ (*L. b. belliana*)

บทที่ 5

อภิปรายผลการศึกษา

1. การศึกษาลักษณะพื้นฐานวิทยา

จากการศึกษาลักษณะพื้นฐานวิทยาของแย้จากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู พบว่า แย้จากทั้ง 5 ประชากรมีลักษณะพื้นฐานวิทยาเหมือนกัน คือ มีลวดลายบนหลังมีลักษณะเป็นจุดเรียงกันเป็นแถวหรือเป็นเส้น บริเวณตรงกลางด้านล่างของน่องมีเกล็ดขวางอยู่กลางน่องประมาณ 7-9 เกล็ด เกล็ดบริเวณด้านล่างมีขนาดโตเกือบเป็น 3-4 เท่าของเกล็ดด้านบน แถบสีดำบนบนที่ติดกับหลังมีขนาดค่อนข้างกว้างกว่าส่วนล่างที่ติดกับท้อง คอมีสีดำเป็นร่างแหสลับกับสีครีม บริเวณอกและท้องมีสีเหลือง และมีเส้นสีเทาเข้มเป็นตาข่ายรอบๆ บริเวณใกล้กับสีข้าง ส่วนตรงกลางของท้องเส้นสีเทาจะมีน้อยหรือหายไปเลย บริเวณโคนหางมีสีเขียวมะกอกอมเหลืองลายจุด ใต้โคนหางมีสีค่อนข้างเหลือง ขามีแถบสีเหลืองเป็นประกายและมีสีเข้ม โดยรอบ โคนขาหลัง ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Taylor (1963) และ Cox และคณะ (1998)

2. การย้อมสีแบบธรรมดา

จากการย้อมสีแบบธรรมดา พบว่า แย้ *L. b. belliana* ทั้ง 5 ประชากร มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ และมีโครโมโซมเป็นแบบซอร์โอมอร์ฟิกโครโมโซม (homomorphic chromosome) เช่นเดียวกับรายงานของ Hall (1970 อ้างโดย โรจน์ชัย ศัตราหา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์, 2532) ที่พบว่าแย้ *L. belliana* มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ จากผลการศึกษาที่ได้พบว่าโครโมโซมคู่ที่ 2 และ 3 มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกันมาก อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดในการจัดคู่ได้ อีกทั้งในโครโมโซมเขี่ยยังประกอบไปด้วยไมโครโครโมโซม ซึ่งเป็นโครโมโซมขนาดเล็กมาก ทำให้มีความยากต่อการนับจำนวนโครโมโซมและจัดทำคาริโอไทป์เป็นอย่างมาก เนื่องจากไมโครโครโมโซมมักถูกทับโดยเมคโครโครโมโซม ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เซลล์ในการศึกษาจำนวนมาก เพื่อให้ได้ผลที่ถูกต้องที่สุด

การศึกษาการไอโทปีจากการย้อมสีแบบธรรมดาในจะบอกเพียงจำนวนและชนิดของโครโมโซมเท่านั้น ซึ่งโดยปกติแล้วในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะมีการไอโทปีที่เหมือนกัน แต่ในสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดอาจพบความแตกต่างของการไอโทปีระหว่างประชากรในชนิดเดียวกันได้ โดยที่แต่ละประชากรอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะภายนอกของแต่ละประชากรเหมือนกัน ดังเช่นในรายงานของ Lambrot และ Eaton (1992) ที่ศึกษาในอีการ์น่า *Liolaemus monticola* 2 ประชากร ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคที่แตกต่างกันและมีเทือกเขาขวางกั้น พบว่า แต่ละประชากรมีจำนวนโครโมโซมแตกต่างกัน คือ ประชากรหนึ่งมีจำนวนโครโมโซม $2n=34$ ส่วนอีกประชากรหนึ่งมีความหลากหลายของจำนวนโครโมโซม $2n=28$ ถึง $2n=40$ และจากรายงานของ Odierna และคณะ (1994) ที่ศึกษาโครโมโซมในจิ้งจก *Tarentola mauritanica* 2 ประชากร พบว่า จิ้งจกทั้ง 2 ประชากรมีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน ($2n=42$) แต่มีขนาดของแขนข้างสั้นของโครโมโซมทุกคู่ไม่เท่ากัน คือ จิ้งจกที่ได้จากประเทศแอฟริกา มีขนาดของแขนข้างสั้นยาวกว่าจิ้งจกจากประเทศอิตาลี เมื่อทำการย้อมแถบสีแบบจี จึงพบว่าขนาดที่แตกต่างกันนั้นเกิดจากเพอริเซนทริกอินเวอร์ชัน (pericentric inversion) อย่างไรก็ตามยังมีสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดที่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีภูมิภาคแตกต่างกันและไม่สามารถติดต่อกันได้ก็ตามแต่ก็ยังมีการไอโทปีที่เหมือนกัน เช่น การศึกษาของ Odierna และคณะ (1996) ซึ่งศึกษาในกิ้งก่า 3 ชนิด คือ *Lacerta aureliol*, *L. bonnali aranica*, *L. b.bonnali* โดยที่แต่ละชนิดศึกษาหลายประชากร พบว่า ในชนิดเดียวกันมีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ เท่ากันทุกประชากร ซึ่งก็เป็นไปเช่นเดียวกับผลของการศึกษาครั้งนี้ คือ แยกจากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวเขาชมพู มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน คือ $2n=36$ และเมื่อนำข้อมูลที่ได้มาเขียนอิดิโอแกรมแล้วเปรียบเทียบรูปแบบของการไอโทปี พบว่า แยกจากทั้ง 5 ประชากร มีรูปแบบของการไอโทปีที่เหมือนกัน ดังรูปที่ 35 และ 36

นอกจากนี้เมื่อนำข้อมูลขนาดของโครโมโซมที่ได้จากการย้อมสีแบบธรรมดาในแต่ละประชากร มาเปรียบเทียบค่า RL และ NVC ระหว่างประชากร ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test โดยใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการศึกษาความแตกต่างของขนาดของโครโมโซมในกบบราวน์ฟร็อก (Brown Frogs) ซึ่งพบว่าขนาดของโครโมโซมไม่มีความแตกต่างกัน (Nishioka, Okumoto, และ Ryuzaki, 1987) ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาในจิ้งจก ที่พบว่ามีขนาดของแขนข้างสั้นไม่เท่ากันใน 2 ประชากร (Odierna และคณะ, 1994) จากการเปรียบเทียบค่า RL และ NVC ของโครโมโซมแต่ละคู่ในตารางที่ 7-10 พบว่า โครโมโซมบางคู่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกัน ในขณะที่บางคู่แตกต่างกัน จึงสามารถสรุปได้ว่า แยกจากเกาะแสมสารและเกาะไผ่มีขนาดและรูปร่างของโครโมโซมเหมือนกันมากที่สุด และแยกจากเกาะครามและพื้นที่

ป่าเขาเขียวเขาชมพู่มีขนาดและรูปร่างของโครโมโซมแตกต่างกันมากที่สุด แต่ยั้ง 5 ประชากรมีขนาดและรูปร่างของโครโมโซมไม่แตกต่างกัน

3. การย้อมแถบสีแบบจี

การย้อมแถบสีแบบจีจะช่วยในการจัดคู่ของโครโมโซมได้ถูกต้องมากขึ้น เนื่องจากโครโมโซมจะติดสีเข้มที่บริเวณเฮเทอโรโครมาทิน เกิดเป็นแถบสีเข้มจางสลับกันตลอดความยาวของโครโมโซม (Summer, 1991) จากผลการศึกษาสามารถเห็นรูปแบบของแถบสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงสามารถใช้ช่วยในการจัดคู่ของโครโมโซมคู่ที่ 2 และ 3 ได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

การศึกษาคาร์ิโอไทป์จากการย้อมแถบสีแบบจี สามารถใช้ในศึกษาความแตกต่างกันหรือความเหมือนกันของรูปแบบของแถบสีที่ปรากฏในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันได้ ดังเช่นรายงานของ Kasahara, Yonenaga-Yassuda และ Rodrigues (1987) ที่สามารถจัดกลุ่มประชากรของอีการ์วัน่า *Tropidurus hispidus* ตามรูปแบบที่แตกต่างกันของแถบสีแบบจี แบบซี และ NOR ได้ 3 แบบ โดยที่ทั้ง 3 แบบ มีจำนวนโครโมโซมเท่ากัน ซึ่งแตกต่างจากการศึกษารั้วนี้คือ แยกจากเกาะแสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู่ มีรูปแบบของแถบสีแบบจีไม่แตกต่างกัน โดยสามารถเปรียบเทียบรูปแบบของแถบสีแบบจีนี้ได้จากอิดิโอแกรมดังแสดงในรูปที่ 37

นอกจากนี้ผลการย้อมสีแบบธรรมดาและการย้อมแถบสีแบบจี พบว่า ยั้ง 5 ประชากร มีคาร์ิโอไทป์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถนำข้อมูลทางธรณีวิทยามาสนับสนุนผลการศึกษารั้วนี้ได้ คือ เมื่อประมาณ 1-2 ล้านปีที่ผ่านมานี้ ซึ่งเป็นยุคน้ำแข็ง มีน้ำแข็งปกคลุมโลก 75% ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทยทั้งหมดไม่ได้เป็นทะเลอย่างเช่นในปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากในยุคน้ำแข็งสภาพภูมิอากาศแปรปรวน โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ดังนั้นน้ำทะเลจึงไหลทะลักเข้าท่วมอ่าวไทยซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่ราบลุ่มบางส่วนที่มีพื้นสูงก็จะเกิดเป็นเกาะต่างๆ จึงเกิดเป็นทะเลอ่าวไทยในปัจจุบัน (Tarbuck และ Lutgens, 1999) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่สนับสนุนว่า ครั้งหนึ่งก่อนยุคน้ำแข็งบริเวณอ่าวไทยทั้งหมดเคยเป็นพื้นดินมาก่อนโดยมีหลักฐานจากการขุดเจาะน้ำมัน พบว่าแร่ที่ขุดพบใต้ท้องทะเลอ่าวไทยนั้นเป็นแร่ชนิดที่เกิดจากการทับถมของพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนบก ซึ่งก็สามารถพบแร่เหล่านี้ได้ในบริเวณที่เป็นพื้นดินในปัจจุบันด้วย (Burri, 1989) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ยั้ง 5 ประชากร เป็นชนิดเดียวกันและอาจเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาก่อน

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเกาะที่แยกออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งจากการแยกออกจากกันของประชากรในพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ก็อาจจะมีระยะเวลาไม่นานพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นได้

อย่างไรก็ตามความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างประชากรของแฮ้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงเช่นนี้ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะมีการศึกษาแถบสีโครโมโซมแบบอื่นๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้จากผลการศึกษาไม่พบโครโมโซมเพศของแฮ้ จึงน่าจะมีการศึกษาถึงการกำหนดเพศของแฮ้เพิ่มเติมด้วย



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทที่ 6

สรุปผลการศึกษา

1. ศึกษาการข้อมสียแบบธรรมดาของโครโมโซมแท้ พบว่า ทั้งแฉ้เพศผู้และเพศเมียมีคาริโอไทป์เหมือนกัน คือ มีจำนวนโครโมโซม $2n=36$ ประกอบด้วย แมคโครโครโมโซม 12 แท่ง และไมโครโครโมโซม 24 แท่ง โดยแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1-5 มีรูปร่างเป็นเมทาเซนทริก ส่วนแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 6 มีรูปร่างเป็นสับเมทาเซนทริก นอกจากนี้ยังพบเซกันดารีคอนสทริกชัน บริเวณแขนข้างยาวของแมคโครโครโมโซมคู่ที่ 1 สำหรับไมโครโครโมโซมนั้นมีขนาดเล็กมากจึงไม่สามารถที่จะวัดขนาดและจำแนกชนิดและรูปร่างของโครโมโซม
2. ศึกษาเปรียบเทียบคาริโอไทป์จากการข้อมสียแบบธรรมดาของแฉ้จากเกาะเสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู พบว่าไม่มีความแตกต่างกันของจำนวนขนาด และรูปร่างของโครโมโซม
3. ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของแถบสีแบบจีของแฉ้จากเกาะเสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู พบว่ามีรูปแบบของแถบไม่แตกต่างกัน
4. จากการศึกษาเปรียบเทียบคาริโอไทป์ จากการข้อมสียแบบธรรมดาและรูปแบบของแถบสีแบบจี ของแฉ้ จากเกาะเสมสาร เกาะคราม เกาะรีน เกาะไผ่ และพื้นที่ป่าเขาเขียวและเขาชมพู พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าแฉ้ทั้ง 5 ประชากร เป็นชนิดเดียวกันและอาจเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันมาก่อน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้จะมีลักษณะเป็นเกาะที่แยกออกจากผืนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งจากการแยกออกจากกันของประชากรในพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมึระยะเวลาไม่นานพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมเกิดขึ้นได้

รายการอ้างอิง

ภาษาไทย

- ธนินฐา ทรพรพันธ์. 2538. การสำรวจนิเวศวิทยาของหอยนมสาวบริเวณอ่าวสัต์หีบ. **วารสารการประมง**. 48(2): 57-65.
- โรจน์ชัย ศัตตราหา และไพรัช ทาบสีแพร. 2525. รายงานการวิจัยเรื่องนิเวศวิทยาและวงชีพของแยะ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). **วารสารวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น**. 27 หน้า.
- โรจน์ชัย ศัตตราหา และสุวคนธ์ พลกนิษฐ์. 2532. รายงานการวิจัยเรื่องโครโมโซมและกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของแยะ *Leiolepis belliana rubritaeniata* (Mertens). **วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น**. 152-156.
- อมรา คัมภีรานนท์. 2540. **พันธุศาสตร์ของเซลล์**. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ภาษาอังกฤษ

- Burri, P. 1989. Hydrocarbon potential of tertiary intermontane basins in Thailand. **Proceeding of the international symposium on ontermontane bansina: geology & resources**. 3-12.
- Cox, M. J., Peter Paul, V. D., Nabhitabhata, J. and Kumthorn, T. 1998. **A photographic guide to snakes and other reptiles of peninsular Malaysia, Singapore and Thailand**. Ralph Curtis Publishing.
- Darevsky, I. S. and Kupriyanova, L. A. 1993. Two new all-female lizard species of the genus *Leiolepis* CUVIER, 1829 from Thailand and Vietnam. **Herpetozoa**. 6(1-2): 3-20.
- Gaedner, E. J., Simmons, M. J., and Snustad, D. P. 1991. **Principles of Genetics**. 8th ed. New York: John Willey & Sons.

- Green, D. M. 1988. Cytogenetics of the endemic New Zealand frog, *Leiopelma hochstetteri*: extraordinary supernumerary chromosome variation and a unique sex-chromosome system. **Chromosoma**. 97: 55-70.
- Hall, W. P. 1970. Three probable cases of parthenogenesis in lizards (Agamidae, Chamaeleontidae, Gekkonidae). **Experimanta**. 26: 1271-1273.
- Henriques-Gil, N., Parker, J. S., and Puertas, M. J. 1997. **Chromosomes Today Volume 12**. London: Chapman & Hall.
- Honda, M., et al. 2000. Phylogenetic relationships of the family Agamidae (Reptilia: Iguania) inferred from mitochondrial DNA sequences. **Zoological Science**. 17: 527-537.
- Joger, U. 1991. A molecular phylogeny of agamid lizards. **Copeia**. 3: 616-622.
- Kasahara, S., Yonenaga-Yassuda, T., and Rodrigues, M. T. 1987. Geographical karyotypic variations and chromosome banding patterns in *Tropidurus hispidus* (Suaria, Iguanidae) from Brazil. **Caryologia**. 40(1-2): 43-57.
- Lambrot, M., and Eaton, L. C. 1992. Concurrence of morphological variation and chromosomal races in *Liolaemus monticola* (Tropiduridae) separated by riverine barriers in the Andes. **Z. Zool. Syst. Evolution storsch**. 30(3): 189-200.
- Macey, J. R., and Schulte II, J. A. and Larson, A. 2000. Evolution and phylogenetic information content of mitochondrial genomic structural features illustrated with acrodont lizards. **Syst. Biol**. 49: 257-277.
- Manthey, U. and Grossmann, W. 1997. **Amphibien and Reptilien Südasiens**. NTV Verlag, Münster.
- Nishioka, M., Hanada, H., Miura, I., and Ryuzaki, M. 1994. Four kinds of sex chromosomes in *Rana rugosa*. **Sci.Rep.Lab.Amphibian Biol., Hiroshima Univ**. 13: 1-34.
- Nishioka, M., Okumoto, H., and Ryuzaki, M. 1987. A comparative study on the karyotypes of pond frogs distributed in Japan, Korea, Taiwan, Europe and North America. **Sci. Rep. Lab. Amphibian Biol., Hiroshima Univ**. 9: 135-163.
- Odierna, G., Aprea, G., Arribas, O. J., Capriglione, T., Caputo, V., and Olmo, E. 1996. The karyotype of the Iberian rock lizards. **Herpetologica**. 52(4): 542-550.

- Odierna, G., Aprea, G., Capriglione, T., Vincenzo, C., and Olmo, E. 1994. Chromosomal diversification in the gekkonid *Tarentola mauritanica* (Reptilia, Gekkonidae). **Boll. Zool.** 61: 325-330.
- Sambamurty, A. V. S. S. 1999. **Genetics**. New Delhi: Narosa Publishing House.
- Sumner, A. T. 1990. **Chromosome banding**. London: Uniwin Hyman.
- Tarbut, E. J. and Lutgens, K. F. 1999. **Earth an introduction to physical geology**. 6th. USA: Prentice-Hall.
- Taylor, E. H. 1963. **The lizards of Thailand**. **The Univ of Kansas, Sci. Bull.** 44(4): 904-910.
- Uetz, P., Etzold, T. and Chenna, R. 2000. **The EMBL reptile database—iNet**: http://www.embl-heidelberg.de/~uetz/Living_Reptiles.html.



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ภาคผนวก

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

วิธีการเตรียมสารเคมี

อาหารเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาว RPMI 1640

1. ละลาย RPMI 1640 ชนิดผง (Seromed: Cat.No.T121-01) ในน้ำที่อบฆ่าเชื้อแล้ว 1000 มิลลิลิตร
2. เติม NaHCO_3 2 กรัม
3. ปรับ pH ให้ได้ 6.8 โดยใช้ 1 HCl และ 1 N NaOH
4. กรองด้วย sterile membrane filters ขนาด 0.45 ไมโครเมตร เก็บที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส

อาหารสำหรับเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวประกอบด้วย

- | | |
|--|--------------|
| 1. RPMI 1640 | 60 มิลลิลิตร |
| 2. fetal bovine serum | 20 มิลลิลิตร |
| 3. น้ำกลั่นที่อบฆ่าเชื้อแล้ว | 20 มิลลิลิตร |
| 4. phytohemagglutinin (PHA) M Form (Gibco) | 3 มิลลิลิตร |
| 5. penicillin-Streptomycin | 1 มิลลิลิตร |
- ผสมให้เข้ากันโดยวิธีปลอดเชื้อ เก็บที่ -20 องศาเซลเซียส

0.075 M KCl

- ชั่ง KCl 0.5588 กรัม ละลายในน้ำ 100 มิลลิลิตร
เก็บที่อุณหภูมิห้อง

colchicine ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร

- ชั่ง colchicine 0.002 กรัม ละลายในน้ำ 10 มิลลิลิตร
เก็บที่ 2 – 8 องศาเซลเซียส

fixative

ผสม acetic acid glacial 1 ส่วนและ methanol 3 ส่วนให้เข้ากัน
เตรียมใหม่และแช่เย็นทุกครั้ง ใช้ภายใน 24 ชั่วโมง

sorenson phosphate buffer

- solution A : KH_2PO_4 9.1 กรัม ละลายน้ำ 1000 มิลลิลิตร
 - solution B : Na_2HPO_4 9.5 กรัม ละลายน้ำ 1000 มิลลิลิตร
- walking solution : solution A 50.8 มิลลิลิตร + solution B 49.2 มิลลิลิตร
เก็บที่อุณหภูมิห้อง

giemsa 10 %

giemsa 5 มิลลิลิตร ผสมกับ sorenson phosphate buffer 45 มิลลิลิตร
ใช้ภายในวันเดียวกัน

0.025 % trypsin/EDTA

สารละลาย 0.25 % trypsin/EDTA 5 มิลลิลิตร ละลายน้ำ 45 มิลลิลิตร
ใช้ภายในวันเดียวกัน



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ข.

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า RL

ประชากรของแย์	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะเสม็ดสารและเกาะคราม	1	0.018	0.986
	2	0.393	0.695
	3	1.984	0.049
	4	0.881	0.380
	5	1.742	0.084
	6	0.288	0.774
เกาะเสม็ดสารและเกาะริน	1	0.246	0.806
	2	1.184	0.239
	3	0.021	0.984
	4	1.857	0.066
	5	3.202	0.002
	6	0.295	0.768
เกาะเสม็ดสารและเกาะไผ่	1	1.729	0.086
	2	0.592	0.555
	3	0.153	0.879
	4	0.115	0.908
	5	0.667	0.506
	6	0.836	0.405

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า RL (ต่อ)

ประชากรของแย์	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะเสม็ดและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	1.937	0.055
	2	1.460	0.147
	3	1.984	0.049
	4	1.099	0.274
	5	0.021	0.983
	6	0.247	0.805
เกาะครามและเกาะวิน	1	0.272	0.786
	2	2.006	0.047
	3	2.611	0.010
	4	1.332	0.185
	5	2.310	0.023
	6	0.059	0.953
เกาะครามและเกาะไผ่	1	2.019	0.045
	2	0.383	0.702
	3	2.478	0.014
	4	1.080	0.282
	5	1.505	0.134
	6	0.776	0.439
เกาะครามและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	2.317	0.022
	2	2.235	0.027
	3	1.124	0.263
	4	0.258	0.797
	5	2.298	0.023
	6	0.056	0.955

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า RL (ต่อ)

ประชากรของแย์	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะรินและเกาะไผ่	1	2.477	0.015
	2	1.830	0.069
	3	0.237	0.813
	4	2.591	0.011
	5	3.529	0.001
	6	0.683	0.496
เกาะรินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	2.956	0.004
	2	0.517	0.606
	3	1.825	0.070
	4	1.175	0.242
	5	1.045	0.000
	6	0.112	0.911
เกาะไผ่และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	0.308	0.758
	2	2.113	0.036
	3	1.521	0.131
	4	1.436	0.153
	5	0.804	0.423
	6	0.764	0.446

หมายเหตุ ค่า Sig (2-tailed) ใช้เปรียบเทียบกับค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.05 ถ้ามีค่ามากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐาน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ค.

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า NVC

ประชากรของแยะ	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะเสม็ดสารและเกาะคราม	1	1.754	0.082
	2	3.450	0.001
	3	4.115	0.000
	4	2.124	0.036
	5	0.674	0.501
	6	1.222	0.224
เกาะเสม็ดสารและเกาะริน	1	0.189	0.850
	2	0.504	0.615
	3	0.627	0.532
	4	0.801	0.425
	5	1.771	0.079
	6	1.665	0.099
เกาะเสม็ดสารและเกาะไผ่	1	0.667	0.605
	2	0.701	0.484
	3	0.654	0.514
	4	1.771	0.079
	5	0.702	0.484
	6	1.246	0.215

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า NVC (ต่อ)

ประชากรของแย์	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะเสม็ดและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	2.674	0.008
	2	1.664	0.099
	3	1.565	0.120
	4	2.985	0.003
	5	0.603	0.760
	6	0.847	0.399
เกาะครามและเกาะหิน	1	1.550	0.124
	2	3.512	0.001
	3	4.580	0.000
	4	2.577	0.011
	5	1.126	0.263
	6	0.086	0.931
เกาะครามและเกาะไผ่	1	1.174	0.242
	2	0.812	0.418
	3	4.908	0.000
	4	3.673	0.000
	5	0.015	0.988
	6	0.063	0.950
เกาะครามและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	4.366	0.000
	2	4.955	0.000
	3	5.713	0.000
	4	4.630	0.000
	5	0.276	0.783
	6	0.386	0.700

ตารางค่า t แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของค่า NVC (ต่อ)

ประชากรของแย์	โครโมโซม คู่ที่	t	Sig (2-tailed)
เกาะรินและเกาะไผ่	1	0.716	0.475
	2	0.823	0.412
	3	0.025	0.980
	4	0.799	0.426
	5	1.129	0.262
	6	0.022	0.982
เกาะรินและสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	1.793	0.076
	2	0.961	0.338
	3	0.832	0.407
	4	1.820	0.079
	5	1.244	0.216
	6	0.477	0.634
เกาะไผ่และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	1	3.422	0.001
	2	1.277	0.204
	3	0.907	0.366
	4	1.042	0.299
	5	0.294	0.770
	6	0.441	0.660

หมายเหตุ ค่า Sig (2-tailed) ใช้เปรียบเทียบกับค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.05 ถ้ามีค่ามากกว่า 0.05 สรุปได้ว่ายอมรับสมมติฐาน

สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

นางสาวชिरฎาณ์ ปวงวัฒนา เกิดวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร ในปีการศึกษา 2540 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน ประจำปีการศึกษา 2542 จากบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากโครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย



สถาบันวิทยบริการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย